

تربيمين

أقراص

التركيب:

كل قرص يحتوى:

ثiamine HCl (Vitamin B₁) 100 mg

Pyridoxine HCl (Vitamin B₆) 250 mg

Cyanocobalamin (Vitamin B₁₂) 250 mcg

سيانوكوبالامين (فيتامين بـ ٢٤) ٢٥٠ مكغ

المواد غير الفعالة - انظر الفقرة ٦.

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل استخدامك للدواء.

تحتوي هذه النشرة معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أستهلاك إضافية، راجع الطبيب أو

الصيدلي.

الدواء غير مخصص لاطفال دون عمر ٦ سنوات. عليك بطبعه بشكل صحيح. إستشر الصيدلي إذا احتجت

معلومات إضافية.

(١) لأي غرض مخصص الدواء؟

* الدواء مخصص لإضافة فيتامينات من مجموعة B.

* الملاج الألام المضدية والإمساكيات الإسقلابية حسب توصية الطبيب.

الفصيلة العلاجية: مزيج لفيتامينات من مجموعة B (B₁, B₆, B₁₂)

(٢) قبل استخدام الدواء

لا يجوز استخدام الدواء إذا:

* علت بوجود حساسية لأحد مركبات الدواء.

* كنت تعاني من مرض ليلير (ضمور وراثي لعصب الرؤية).

تحذيرات خاصة تتعلق بالاستعمال الدوائي:

لا يجوز استخدام هذا الدواء في أوقات متقدمة أو فترة طويلة بدون استشارة الطبيب.

* إذا كنت محسساً لأي طعام أو أي دواء، عليك إبلاغ الطبيب عن ذلك قبل تناول الدواء.

* إن استعمال جرعة دوائية زائدة قد تسبب أضراراً في الجهاز الهضمي.

* قبل العلاج بتربيمين إلخي الطبيب إذا كنت في فترة الحمل أو الرضاعة.

إذا كنت تناول، أو إذا تناولت مؤخراً، دوحة أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، أخذ للطبيب أو الصيدلي عن ذلك. يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي خاصة إذا كنت تتناول:

* لفودري (الدرغز باراكيسون).

(٣) العمل والرياضة:

يجب إستشارة الطبيب قبل تناول الدواء إذا كنت في فترة الحمل أو الرضاعة.

(٤) كمية استعمال الدواء؟

عليك الاستئصال من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكون واثقاً

جرعة الدوائية الاعتيادية عادة هي:

٢-٤ أقراص في اليوم.

- طريقة التناول - يبلغ الدواء مع الماء، يُسمح بسوق الأقراص وبطءها حالاً إذا دعت المسوورة.
- إذا ثابتت حرجية دوائية مفرطة أو إذا بلغ طفل بالخطأ من الدواء، توجه حالاً للطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر عليه العلاج بالدواء دون استشارة الطبيب أو الصيدلي، حتى ولو طرأ تحسن على حالة صحية.
- لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء دون استشارة الطبيب أو الصيدلي، حتى ولو طرأ تحسن على حالة صحية.
- لا تتناول الأدوية في المتعة؛ يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء، ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.
- إذا توفرت لديك أسلحة إضافية حول إستعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

- (٤) الأعراض الجانبية**
- كما يكُن دواء، إن إستعمال تربيعين قد يسبب أعراض جانبية عند بعض المستعملين. لا تندهى من قائمة الأعراض الجانبية، من الجائز الاعتنى بها.
- يجب التوقف عن الاستعمال ومراجعة الطبيب حالاً في حال ظهور تقيح أو طفح في الجلد، إذا ثافتت إحدى الأعراض الجانبية، أو عندما تعانى من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك استشارة الطبيب.

- التالي عن أعراض جانبية
- بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط «تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي» الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov). الذي يوجه إلى الموقع المنشور التالي عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:
- https://forms.gov/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=Adv_ersEffectMedic@moh.gov.il

- (٥) كيفية تخزين الدواء؟**
- * تجنب التسمم يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال و/or الرضع، وذلك للقاضي إصابتهم بالتسوس.
- * لا يجوز إستعمال الدواء بعد انتهاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- * شروط التخزين: يجب التخزين بدرجة حرارة تقل عن ٢٥ درجة مئوية (درجة حرارة الغرفة).

- (٦) معلومات إضافية:**
- يحظى الدواء بالإشارة للمواد الفعالة أيضًا:
- Povidone, Microcrystalline Cellulose, Magnesium Stearate, Colloidal Silicon Dioxide, Eudragit L, Titanium Dioxide, Red Lake No. 3, Polyethylene Glycol 6000, Polysorbate 80, Dibutyl Sebacate
- كيف يبدو الدواء وما يحتوى العلبة - عبوة لوحية تحتوى على أقراص بلون زمردي.
- المنتج وصاحب الإمتياز وعنوان: سام - أون م. ض، شارع هايفا ٢٥ باد - يام.
- أقرت وزارة الصحة صيغة هذه النشرة ومحظواً مُحصن ورخص في تاريخ: آب ٢٠١٤.
- رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: ٤٠-٣٩-٢٢٨٧٦.
- من أجل سهولة وتوسيع القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكرة، على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.