

أبرول اقراص

تم تحديد هذه النشرة في وزارة الصحة ومحتواها فُحص وصودق
نشرة مصادق عليها في 09/2013

التركيب:

يحتوي كل قرص باراسيتامول 500 ملغ - Paracetamol 500 mg

لقائمة المواد غير الفعالة في المستحضر انظر

الفقرة 6 - معلومات اضافية

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايته قبل استعمالك الدواء؛ تحوي هذه النشرة معلومات موجزة عن الدواء. اذا كانت لديك اسئلة اخرى، توجه الى الطبيب او الصيدلي.

يُعطى هذا الدواء بنون وصفة طبيب وهو مخصص للكبار والأولاد من جيل 12 سنة فما فوق.

يجب عليك تناول الدواء بصورة صحيحة. استشر الصيدلي اذا كنت بحاجة الى معلومات اضافية.

يجب التوجه الى الطبيب اذا استمرت الحمى لاكثر من 3 ايام أو اذا لم تخففي الاعراض خلال 5 ايام رغم استعمال الدواء.

1. لماذا هذا الدواء؟

هذا الدواء مخصص لتسكين الآلام وتخفف الحرارة.

المجموعة العلاجية: مسكن للآلام ومخفض للحرارة.

2. قبل استعمال الدواء:

يُمنع استعمال الدواء اذا كنت:

اذا كانت لديك حساسية للباراسيتامول او ل احد المركبات الاخرى التي يحتويها الدواء.

تحذيرات خاصة تخص استعمال الدواء:

إذا كنت تعرضت لآثار جانبية جلدية في الماضي بسبب تناول مستحضرات تحوي الباراسيتامول وذلك كي لا يتسبب مرة اخرى باعراض جانبية خطيرة.

يحتوي المستحضر باراسيتامول الذي قد يؤدي الى تضرر الكبد عندما:

- يُعطى بجرعة زائدة عن الموصى بها او لفترة متواصلة.

- في فترة العلاج تتناول مشروبات روحية.

- تتناول ادوية اخرى تؤثر على فعالية الكبد.

يُمنع تناول الدواء لفترات متواصلة بدون استشارة الطبيب. يُمنع تناول ادوية اخرى لتخفيض الحرارة وتسكين الآلام او ادوية للرشح بدون استشارة الطبيب او الصيدلي لتجنب جرعة زائدة او تسمم باراسيتامول.

يُمنع تناول ادوية من "الفصيلة" و/او مستحضرات اخرى تحوي باراسيتامول.

يُمنع تناول جرعة عالية (في حدود الموصى به) لهذا الدواء في فترة الصوم.

اذا كانت لديك حساسية لطعام معين او لدواء معين، فعليك اعلام الطبيب قبل تناول الدواء.

يجب استشارة الطبيب قبل البداية بالعلاج اذا كنت تعاني او عانيت في الماضي من:

مرض كبدي أو خلل في وظيفة الكبد.

خلل في وظيفة الكلى.

ادمان الكحول.

يرقان.

اذا كنت حاملا او مرضعة.

اذا كنت تتناول، او اذا تناولت مؤخرا، ادوية اخرى بما في ذلك ادوية بنون وصفة طبيب ومضافات الغذاء، اخبر بذلك الطبيب أو الصيدلي. خاصة يجب اعلام الطبيب او الصيدلي اذا كنت تتناول ادوية من المجموعات التالية او اذا انهيت مؤخرا تناول ادوية:

ادوية مضادة لتخثر الدم خاصة اوارافيرين.

مستحضرات تحفز إنتاج انزيمات الكبد (مثل: ريفامبسين، باربيتورات).

أدوية الصرع - الفينيتوين، كاربامازيبين.

مستحضرات مضادة للالتهابات غير منشطة.

ميثوكلوبراميد او دومبيريدون (المستخدمة في علاج الغثيان والقيء ومشاكل في الجهاز الهضمي الأخرى).

كلورامفينيكول (مضادات حيوية).

بروبيسيدي (معالجة القرص).

كولسترامين (لخفض الدهون في الدم)

في حالات استعمال الأدوية الأخرى للألم أو الحمى أو المضادة للالتهابات (مع الاستعمال لفترة طويلة).

الكحول.

لا تتناول هذا الدواء مع مستحضرات أخرى تحتوي على باراسيتامول. تأكد من التركيب مع طبيبك أو الصيدلي.

استعمال البراسيتامول والكحول:

يُمنع تناول الكحول في فترة العلاج بالبراسيتامول بسبب ازدياد خطر تضرر الكبد.

الحمل والرضاعة:

يُمنع الاستعمال اذا كنت حاملا أو مرضعة الا اذا نصح الطبيب بذلك.

معلومات مهمة على بعض مركبات أبرول اقراص:

يحتوي كل قرص: 0,36 ملغرام صوديوم.

الاستعمال مع الأولاد:

هذا الدواء مخصص للبالغين والأولاد فوق سن ال 12 عاما، انظر الفصل 3.

يجب على الآباء إبلاغ الطبيب عن أي آثار جانبية فضلا عن أي دواء آخر يُعطى للولد.

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب عليك استشارة الطبيب او الصيدلي اذا لم تكن متأكدًا.

الجرعة الموصى بها في حال عدم وجود تعليمات اخرى

من الطبيب:

للکبار والأولاد فوق سن 12:

1-2 اقراص كل 4-6 ساعات حسب الحاجة.

يُمنع تجاوز جرعة من 8 اقراص لليوم.

يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

يجب التوجه الى الطبيب اذا استمرت الحمى لاكثر من 3 ايام أو اذا لم تخفني الاعراض خلال 5 ايام رغم استعمال الدواء.

طريقة الاستعمال:

ليس للمضغ! يمكن قسم القرص عند الحاجة.

ابلع الدواء مع قليل من الماء.

اذا تناولت جرعة زائدة او اذا بلع ولد بالخطأ من الدواء، توجه فوراً للطبيب او للطوارئ في المستشفى واحضر عبوة الدواء معك. يُمنع تسبب التقيؤ بدون تعليمات واضحة من الطبيب! حتى اذا كان شعورك جيد، علاج فوري مفيد جداً. بسبب الخطر من تطور ضرر كبير للكبد، علامات محتملة قد تكون الدوار والتقيؤ.

الغثيان، اسهال، فقدان الشهية، الام بطن، تورم، تعرق زائد، الم او حساسية في الجزء العلوي من البطن كذلك قد لا تدل على درجة ضرر الكبد.

يُمنع تناول ادوية في الظلام! افحص العبوة والجرعة في كل مرة تتناول فيها الدواء. ضع اي نظارات اذا كنت بحاجة اليها.

4. أعراض جانبية:

كما الحال في كل دواء، استخدام ابرول اقراص قد يؤدي لعراض جانبية لدى مثل الدوار لدى بعض المستخدمين. لا داعي للذعر من قائمة الاعراض الجانبية. قد لا تعاني من اي عرض منها.

اعراض جانبية خطيرة:

يجب التوقف على العلاج والتوجه الى الطبيب فوراً:

إذا كان هناك حساسية شديدة مثل الطفح الجلدي والحكة، تورم في الوجه والشفتين واللسان والحلق و / أو الأطراف التي قد تسبب صعوبة في التنفس أو البلع.

قد يسبب البراسيتامول في حالات نادرة، لظهور أمراض جلدية شديدة على تكون علاماتها: احمرار، طفح جلدي، بثور، إصابة جلدية في نطاق واسع.

قد تظهر اعراض جانبية جلدية شديدة حتى لو كنت قد تناولت في الماضي مستحضرات تحوي المادة الفعالة البراسيتامول بدون مشاكل. إذا ظهرت اعراض جانبية جلدية فيجب التوقف عن العلاج وتوجه للطبيب فوراً.

إذا كنت ترى علامات على تغيرات في الجهاز الدموي، مثل نزيف، كدمات، تطور التهابات بسهولة.

اذا تفاقم احد الاعراض الجانبية، او اذا كنت تعاني من اعراض جانبية لم تذكر في هذه النشرة فيجب عليك مراجعة الطبيب فوراً.

5. كيف تخزن الدواء؟

امنع/ي التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول ايدي الاطفال و/او الرضع وهكذا تمنع التسمم. لا تتسبب بالتقيؤ بدون تعليمات واضحة من الطبيب.

يُمنع استعمال الدواء بعد انقضاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على ظهر العبوة/ تاريخ انقضاء الصلاحية يُظهر اليوم الاخير لنفس الشهر.

يجب حفظ الدواء في مكان جاف ومظلم تحت درجة حرارة 25°C.

6. معلومات اخرى:

بالاضافة الى المادة الفعالة يحتوي هذا الدواء كذلك على:

Talc, Magnesium Stearate, Starch, Aerosil, C.M.C Sodium, Ac-Di-Sol (croscarmellose sodium), Povidone.

كيف يببو الدواء وماذا يوجد بداخل العبوة:

قرص ابيض مع كتابة ريكاح بالجهة الاولى ونظيف بالجهة الثانية.

صاحب الامتياز والمنتج:

ريكاح للصناعة النوائية م.ض. شارع هاميلاخا 30 حولون، اسرائيل.

فُحصت هذه النشرة وصودقت بواسطة وزارة الصحة في تاريخ 2013/9.

رقم تسجيل هذا الدواء في قائمة الأدوية في وزارة الصحة: 028 47 21955 00

من اجل التخفيف وتسهيل القراءة، كتبت هذه

النشرة بصيغة الذكر. بالرغم من ذلك، هذا

الدواء مخصص للجنسين.