

## أبرول اقراص

تم تحديد هذه النشرة في وزارة الصحة ومحتها فحص وصودق  
نشرة مصادق عليها في 09/2013

التركيب:

يحتوي كل قرص باراسيتامول 500 ملغم - Paracetamol 500 mg  
للقائمة المواد غير الفعالة في المستحضر انظر

الفقرة 6 - معلومات اضافية

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل استعمالك النوع: تحوى  
هذه النشرة معلومات موجزة عن النوع. إذا كانت لديك استئنة

أخرى، توجه إلى الطبيب أو الصيدلي.

يُعطي هذا النوع بدون وصفة طبيب وهو مخصص للكبار  
والآباء من جيل 12 سنة فما فوق.

يجب عليك تناول النوع بصورة صحيحة. استشر الصيدلي

إذا كنت بحاجة إلى معلومات اضافية.

يجب التوجه إلى الطبيب إذا استمرت الحمى لأكثر من 3 أيام

وإذا لم تختفي الأعراض خلال 5 أيام رغم استعمال النوع.

1. لماذا هذا النوع؟

هذا النوع مخصص لتسكين الآلام وخفض الحرارة.

المجموعة العلاجية: مسكن للألم وخفض للحرارة.

2. قبل استعمال النوع: إذا كنت:

يُمنع استعمال النوع إذا كنت:

إذا كانت لديك حساسية للباراسيتامول أو لأحد المركبات  
الآخر التي يحتويها الدواء.

تحذيرات خاصة تخص استعمال النوع:

إذا كنت تعرضت لأثار جانبية جلدية في الماضي بسبب تناول  
مستحضرات تحوى الباراسيتامول وذلك كي لا يتسبب مرة

أخرى بعراض جانبية ظهرية.

يحتوي المستحضر باراسيتامول الذي قد يؤدي إلى تضرر  
الكبد عندما:

- يُعطي بجرعة زائدة عن الموصى بها او لفترة متواصلة.

- في فترة العلاج تتناول مشروبات روحية.

- تناول ادوية أخرى تؤثر على تغذية الكبد.

يمُنع تناول الدواء لفترات متواصلة بدون استشارة الطبيب.

يمُنع تناول ادوية أخرى لتخفيض الحرارة وتسكين الآلام او

ادوية للرشح بدون استشارة الطبيب او الصيدلي لتجنب جرعة

زائدة او تسمم باراسيتامول.

يمُنع تناول جرعة عالية (في حدود الموصى به) لهذا الدواء

في فترة الصوم.

إذا كانت لديك حساسية لطعام معين او دواء معين، فعليك

اعلام الطبيب قبل تناول الدواء.

يجب استشارة الطبيب قبل البداية بالعلاج إذا كنت تعاني

وأعانيت في الماضي من:

مرض كبدى او خلل في وظيفة الكبد.

خلل في وظيفة الكلى.

ادمان الكحول.

يرقان.

إذا كنت حاملاً او مرضعة.

إذا كنت تتناول، او إذا تتناول مؤخراً، ادوية اخرى بما في

ذلك ادوية بدون وصفة طبيب ومضافات الغذاء، اخبر بذلك  
الطبيب او الصيدلي. خاصة يجب اعلام الطبيب او الصيدلي

إذا كنت تتناول ادوية من المجموعات التالية او اذا انهيت

مؤخراً تناول ادوية:

ادوية مضادة لتخثر الدم خاصة وارافيرين.

مستحضرات تحفز إنتاج انزيمات الكبد (مثل: ريفامبيسين،

باربیتورات).

ادوية الصرع - الفينيتوين، كاربامازيبين.

مستحضرات مضادة للالتهابات غير منشطة.

ميتوكلوبراميد او دوموبيریدون (المستخدمة في علاج الغثيان

والقيء ومشاكل في الجهاز الهضمي الآخر).

كلورامفينيكول (مضادات حيوية).

بروبينيسيد (معالجة القرص).

كولسترولamine (انخفاض الدهون في الدم)

في حالات استخدام الأدوية الأخرى للألم أو الحمى أو المضادة

للتباشيرات (مع الاستعمال لفترة طويلة).

الكحول.

لا تتناول هذا الدواء مع مستحضرات أخرى تحتوي على  
باراسيتامول. تأكد من التركيب مع طبيبك أو الصيدلي.

استعمال البراسيتامول والكحول:

يمُنع تناول الكحول في فترة العلاج بالبراسيتامول بسبب ازدياد

خطر تضرر الكبد.

الحمل والرضاعة:

يمُنع الاستعمال اذا كنت حاملاً او مرضعة الا اذا نصح

الطبيب بذلك.

معلومات مهمة على بعض مركبات أبرول اقراص:

يحتوي كل قرص: 0,36 ملغرام صوديوم.

الاستعمال مع الاولاد:

هذا الدواء مخصوص للبالغين والآباء فوق سن ال 12 عاما.

اظهر الفصل 3

يجب على الآباء إبلاغ الطبيب عن أي آثار جانبية فضلاً عن أي دواء آخر يعطى للولد.

### 3. كيف تستعمل النوع؟

يجب عليك استشارة الطبيب او الصيدلي اذا لم تكن متاكداً.  
الجرعة الموصى بها في حال عدم وجود تعليمات أخرى

من الطبيب:  
للكبار والآباء فوق سن 12:

2- اقراص كل 6-4 ساعات حسب الحاجة.

يُمنع تجلوز الجرعة من 8 اقراص للليوم.

يجب التوجه إلى الطبيب اذا استمرت الحمى لأكثر من 3 أيام

او اذا لم تختفي الأعراض خلال 5 أيام رغم استعمال النوع.

طريقة الاستعمال:

ليس للرضع يمكن قسم القرص عند الحاجة.

ابلع الدواء مع قليل من الماء.

إذا تناولت جرعة زائدة او اذا بلع ولد بالخطأ من النوع، توجه

فوراً للطبيب او الطوارئ في المستشفى واحضر عبوة الدواء

مجدداً، يُمنع تسبب التقطيع بدون تعليمات واضحة من الطبيب! حتى

إذا كان شعورك جيد، علاج فوري مفيد جداً، بسبب الخطأ من

تطور ضرر كبير للقلب. علامات مختلطة قد تكون الدوار والتقطيع،

الغثيان، اسهال، فقدان الشهية، الام بطن، تورم، تعرق زائد، الم

او حساسية في الجزء العلوي من البطن كذلك قد لا تدل على

درجة ضرر القلب.

يُمنع تناول ادوية في الظلام! افحص العبوة والجرعة في كل

مرة تناول فيها الدواء. ضع اي نظارات اذا كنت بحاجة اليها.

4. اعراض جانبية:

كما الحال في كل دواء، استخدام أبرول اقراص قد يؤدي لاعراض

جانبية لدى مثل الدوار لدى بعض المستخدمين. لا داعي للذعر

من قائمة الاعراض الجانبية. قد لا تتعانى من اي عرض منها.

أعراض جانبية خطيرة:

يجب التوقف على العلاج والتوجه إلى الطبيب فوراً:

إذا كان هناك حساسية شديدة مثل الطفح الجلدي والحكة، تورم

في الوجه والشفتين واللسان والحلق و / او الأطراف التي قد

تسبب صعوبة في التنفس او البلع.

قد تظهر اعراض جانبية جلدية شديدة حتى لو كنت قد تناولت

في الماضي مستحضرات تحوى المادة الفعالة البراسيتامول

بدون مشاكل. إذا ظهرت اعراض جانبية جلدية فيجب التوقف عن

العلاج وتوجه للطبيب فوراً.

إذا كنت ترى علامات على تغيرات في الجهاز الدموي، مثل نزيف،

كمادات، تطور التهابات بسهولة.

إذا تفاقم احد الاعراض الجانبية، او اذا كنت تعاني من

اعراض جانبية لم تذكر في هذه النشرة فيجب عليك مراعاة

الطبيب فوراً.

5. كيف تخزن النوع؟

امتنى اي التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان

مغلق بعيداً عن تناول ايدي الاطفال و / او الرضع وهكذا تمنع

التسمم. لا تتسرب بالتققط دون تعليمات واضحة من الطبيب.

يُمنع استعمال الدواء بعد انقضاء الصلاحية (exp. date).

الظاهر على ظهر العبوة / تاريخ انقضاء الصلاحية يُظهر اليوم

الأخير لنفس الشهر.

يجب حفظ الدواء في مكان جاف ومظلم تحت درجة حرارة 25°C.

6. معلومات اخرى:

بالاضافة الى المادة الفعالة يحتوي هذا الدواء كذلك على:

Talc, Magnesium Stearate, Starch, Aerosil, C.M.C

Sodium, Ac-Di-Sol (croscarmellose sodium), Povidone.

كيف يبيو النوع وماذا يوجد بداخل العبوة:

قرص أبيض مع كتابة R1K4H بالجهة الاولى وتنظيف بالجهة

الثانية.

صاحب الامتياز والمنتج:

ريكيو للصناعة الوائية مرض. شارع هاميلاخا 30 حولون،

اسرائيل.

فُحصت هذه النشرة وصودقت بواسطة وزارة الصحة في

تاريخ 9/2013.

رقم تسجيل هذا الدواء في قائمة الأدوية في وزارة الصحة:

028 47 21955 00

من أجل التخفيف وتسهيل القراءة، كتب هذه

النشرة بصيغة المذكر. بالرغم من ذلك، هذا

الدواء مخصص للجنسين.