

אברולט פתילות

הרכב:

כל פתילה מכילה:

פראצטמול 150 מ"ג - Paracetamol 150 mg

לרשימת החומרים הבדלי פעילים בתכשיר ראה טעיף 6 - "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו ניתנת ללא צורך במרשם רופא והיא מיועדת לילדים מגיל 3 שנים עד 6 שנים להורדת חום ושיכוך כאבים.

עליך לפנות לרופא אם החום נמשך יותר מ-3 ימים או אם התסמינים אינם חולפים תוך 1-2 ימים למרות השימוש בתרופה. יש לתת את התרופה בצורה נכונה. היוועץ ברוקח אם הינך זקוק למידע נוסף.

1. למה מיועדת התרופה?

התרופה מיועדת לשיכוך כאבים ולהורדת חום.

קבוצה תרופוטי: משכך כאבים ומוריד חום.

2. לפני שימוש בתרופה:

אין להשתמש בתרופה זו:

- אם ידועה רגישות לפראצטמול או לאחד ממרכיביה האחרים של התרופה.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

- אם הילד פיתח בעבר תופעות לוואי עוריות כתוצאה מנטילת תכשירים המכילים פראצטמול, אין לתת לו תכשירים המכילים פראצטמול, כדי שלא יגרמו שוב תופעות עוריות חמורות.
- התכשיר מניח פראצטמול העלול לגרום לנזק בכבד כאשר:
 - ניתן במינון גבוה מהמומלץ או לתקופה ממושכת.
 - כאשר בזמן הטיפול שותים משקאות אלכוהוליים.
 - כשנטילים תרופות נוספות המשפיעות על פעילות הכבד.
- אין לתת תרופה זו לעיתים קרובות, בלי להיוועץ ברופא.
- אין לטילול תרופות נוספות להורדת חום ושיכוך כאבים או תרופות להצטננות ללא התייעצות עם רופא או רוקח למניעת מינון יתר או הרעה של פראצטמול.
- אין לטילול תכשירים נוספים המכילים פראצטמול.
- יש להימנע מלקיחת מינון גבוה (בגבול המומלץ) של תרופה זו בזמן יום.
- אם הילד רגיש לזמן כלשהו או לתרופה כלשהי, עליך להודיע על כך לרופא לפני מתן התרופה.
- התרופה מכילה שמן סויה. אם הינך רגיש לסויה או בוטנים, אין להשתמש בתרופה.

יש להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול אם אתה סובל או סבלת בעבר מ:

- מחלת כבד או ליקוי בתפקוד הכבד.
- ליקוי בתפקוד הכליה.
- אלכוהוליזם.
- צהבת.
- אם את בהריון או מניקה.

אם אתה לוקח, או אם נטלת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי מזון וויטמינים, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד יש ליידע את הרופא או הרוקח אם הינך נוטל תרופה מלהקבוצות הבאות או אם גמרת זה עתה הטיפול בתרופה:

- תרופות נגד קרישת דם במיוחד וורפין.
- תכשירים הממריצים יצור אנזימים בכבד (לדוגמה: ריפמפיצין, ברביטורטים).
- תרופות לאפילפסיה - פניטואין, קרבמזפין.
- תכשירים נוגדי דלקת שאינם סטרואידים.
- מטולורפמיד או דומפרידון (לטיפול בבחילה), הקאה ובעיות עיכול נוספות).
- כלורמפניקול (אנטיביוטיקה).
- פרובנצייד (לטיפול בשגדון).
- כולסטרילמיין (להפחתת יתר שומני הדם).
- אין לקחת תרופה זו ביחד עם תכשירים אחרים המכילים פראצטמול. יש לוודא את הרכב התרופה עם הרופא או הרוקח.

שימוש בפראצטמול וצריכת אלכוהול:

בזמן הטיפול בפראצטמול אין לצרוך אלכוהול בגלל הגדלת הסיכון לנזק לכבד.

הריון והנקה:

אם הינך בהריון או מניקה יש להיוועץ ברופא לפני התחלת השימוש בתרופה.

שימוש בילדים:

על ההורים לדווח לרופא המטפל על כל תופעות הלוואי וכן על כל תרופה נוספת הניתנת לילד.

אין לתת לילד אלכוהול או תרופות המכילות אלכוהול, בזמן הטיפול בתרופה זו.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח.

מינון מקובל בהעדר הוראה אחרת מהרופא:

ילדים עד גיל 3 שנים: בהתאם להוראת הרופא.

ילדים בגיל 3-4 שנים: 1 פתילה, 4-5 פעמים ביום.

ילדים בגיל 4-6 שנים: 1-2 פתילות, 4-5 פעמים ביום.

תרופה זו אינה מיועדת בדרך כלל לילדים ותינוקות מתחת לגיל

שנתיים, עבורם יש להשתמש בתכשיר נזול.

יש להמתין לפחות 4 שעות לפני מתן מנה נוספת.

עליך לפנות לרופא אם החום נמשך יותר מ-3 ימים או אם התסמינים אינם חולפים תוך 5 ימים למרות השימוש בתרופה. אין לעבור על המינון המומלץ.

אם בטעות קיבל הילד מנה כפולה, יש להתייעץ מיידית עם הרופא או לפנות לחדר מיון.

לא לבלוע! תרופה זו מיועדת לשימוש רקטלי בלבד.

אין להתרוץ לחצות את הפתילה.

אופן השימוש

הערה: אם הפתילה רכה מכדי לאפשר את החדרתה, ניתן לצננה על ידי אחסונה במקרר במשך כ-30 דקות, או על ידי החזקתה תחת זרם מים קרים לפני הסרת העטיפה.

1. כיצד להחדיר את הפתילה: ראשית, שטוף היטב את ידיך.
2. הפרד פתילה אחת מסרט הפתילות. להסרת העטיפה, יש להפריד הלשוניות בחלק השטוח של העטיפה.
3. השכב את הילד על צידו, והחדר את הפתילה בעדינות עמוק לתוך פי הטבעת בעזרת האצבע.
4. שטוף את ידיך היטב לאחר החדרת הפתילה.

אם נטלת בטעות מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה,

יש לפנות מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים ולהביא את אריזת התרופה איתך. אל תגרום למסרט הפתילות. להסרת העטיפה, יש מהרופא! גם אם הרגשתך טובה, טיפול מיידית הוא חיוני, בגלל הסיכון להתפתחות נזק חמור לכבד. תופעות לוואי יכולות להיות בחילה והקאה, שלשול, אובדן תאבון, כאבי בטן, נפיחות, הזעה מוגברת, כאב או רגישות בבטן העליונה וייתכן שהן לא משקפות את חומרת הנזק לכבד.

אין לטילול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם

4. תופעות לוואי:

כמו לכל תרופה, השימוש באברולט פתילות עלול לגרום לתופעות לוואי כגון אדמומית או כאב באזור פי הטבעת בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

תופעות לוואי חמורות:

יש להפסיק את הטיפול ולפנות לרופא מיד:

- אם מופיעות תגובות אלרגיות חריפות כגון פריחה וגרד, התנפחות של הפנים, השפתיים, הלשון, הגרון ו/או הגפיים אשר עלולים לגרום לקשיי נשימה או בליעה.
- אם פראצטמול עלול לגרום במקרים נדירים, להופעת מחלות עור חריפות שסימנים שלהם יכולים להיות: אודם, פריחה, שלפוחיות, פגיעה עורית נרחבת.
- תופעות לוואי עוריות חריפות עלולות להופיע גם אם בעבר נטלת תכשירים המכילים את המרכיב הפעיל פראצטמול ללא בעיה.
- אם מופיעות תופעות לוואי עוריות, יש להפסיק הטיפול ולפנות לרופא באופן מידי.
- אם מופיעים סימנים של שינויים במערכת הדם כגון: דימומים, חבורות, התפתחות דלקות ביתר קלות.

אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או אם הינך סובל מתופעות לוואי שלא הזכרנו בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא מיד.

5. איך לאחסן את התרופה?

מנע הרעה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מוחץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של החודש.
- יש לאחסן מתחת ל-25°C.

6. מידע נוסף

נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:

Hard Fat, Soya Oil, Methylparaben, Propylparaben, BHT, BHA.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה: פתילות לבנות ארזות בסרט PE-ALUMINIUM, בקופסא של 12 פתילות ו-500 פתילות.

הבריאות: 027 21 24032 00

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

בעל הרישום והיצרן:

רקח תעשיית תרופות בע"מ, רחי המלאכה 30, חולון, ישראל.

עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות בנובמבר 2013.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 027 21 24032 00

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.