

نشرة طبية للمستهلك بموجب انظمة الصيادلة (مستحضرات) ١٩٨٦

اقرأ /ي النشرة بإمعان حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء

حددت هذه النشرة من قبل وزارة الصحة وفحص محتواها وصودقت في ٧/٢٠١١

# ساليكارين مرهم

التركيز : Salicylic Acid 3%  
المواد الغير فعالة :

Paraffin liquid, Hard Paraffin, Propylene Glycol, Vaseline, Olive Oil, Lanolin, Hard Fat, Sodium EDTA.

**الاستطباب:** هذا المستحضر معد لازالة مادة الكراتين المفرطة في الجسم، مثل قشرة الرأس، مادة الكراتين في كف القدم واليد، وفي حالات مرض الصدفية - مادة الكراتين من فروة الرأس، وفي مفاصل اليد والارجل.

**المجموعة العلاجية:** الكرتوليتى من مجموعة السليكتسيلات.

**متى لا يجوز لك استعمال المستحضر ؟**

لا يجوز لك استعمال هذا المستحضر اذا وجدت لديك حساسية لأحد مركباته.

**لا يجوز لك استعمال هذا الدواء قبل مراجعة الطبيب مقدماً :**

عندما تكونين حاملاً أو مرضعة .

اذا كنت تعاني / ن او اذا عانيت في الماضي من خلل في وظيفة جهاز الدم او مرض السكري .

اذا كان في منطقة العلاج التهاب، حكة او تلوث .

**تحذيرات:** يُمنع استعمال هذا الدواء لفترات متقاربة او لفترة مستمرة بدون استشارة الطبيب .

يُمنع الاستعمال على جروح مفتوحة او متشقة. يُمنع الاستعمال على مساحة واسعة من الجلد دون استشارة الطبيب .

يجب ابلاغ الطبيب عن اي حساسية لديك ل الطعام او عقاقير قبل استعمالك للدواء .  
تجنب ملامسة الاعين، الانف، الفم او اغشية مخاطية اخرى، اذا حدث تماس كهذا يجب الغسل مع كمية كبيرة من الماء .

يُمنع استعمال ضمادات الا في حالة تعليمات بذلك من الطبيب .

يُمنع الاستعمال على بقع، البثور جراء الولادة والوحمات مع الشعر .

**التفاعلات بين الأدوية:** اذا كنت تتعاطى / ن دواء إضافياً او إذا أنهيت العلاج الآن بدواء آخر، فيجب اعلام الطبيب المعالج ، وذلك لتفادي الأخطار أو عدم النجاعة الناتجة عن التفاعلات بين العقاقير .

لا تستخدم هذا الدواء على نفس المنطقة في الوقت ذاته مع عقاقير لتقويم الجلد التي تحوي: تريتينوين، حمض الريبيتينويك، رزوراتسين، بنزوئيل بروكسيد، الكبريت، وما شابه .

استعمال هذا الدواء في نفس الوقت مع دواء الذي يحوي حمض السليسيل قد يؤدي إلى حكة واحمرار في الموضع المعالج. يجب دهن نوع واحد فقط من المراهم.

**الأعراض الجانبية:** إضافة إلى التأثيرات الطبية المرغوبة للدواء، فقد تظهر أثناء فترة استعماله بعض الأعراض الجانبية مثل: طفح جلدي ، حكة، حرق، تقشير، قرحة، التهابات موضعية، في هذه الحالات توقف عن العلاج وتوجه للطبيب. اذا احسست بدوخة او تقيؤ فيجب مراجعة الطبيب فوراً.

اما اذا ظهرت لديك اعراض جانبية لم تذكر في هذه النشرة، او اذا طرأ أي تغيير على شعورك العام نتيجة استعمالك لهذا الدواء، عليك عندئذ مراجعة الطبيب حالا .

**الجرعة:** هذا الدواء غير معد عادة لاولاد ورضع تحت سن سنتين من العمر. في بداية العلاج يجب استعمال هذا الدواء على منطقة صغيرة او الدهن مرة واحدة في اليوم حتى تتأكد من عدم حدوث تهيج للجلد.

**انتبه / ي:** هذا الدواء ليس للبلع! هذا الدواء مخصص للاستعمال الخارجي فقط. **ارشادات الاستعمال:** يجب غسل الايدي بالصابون قبل بداية العلاج. خفف بماء دافئ الجلد المصاب وجفف، بمساعدة أصابعك ضع كمية كافية من المرهم لتغطية المنطقة المرغوبة. افرك بلطف، في بداية العلاج يجب استعمال هذا الدواء على منطقة صغيرة او الدهن مرة واحدة في اليوم حتى تتأكد من عدم حدوث تهيج للجلد. بعد عدة ايام يمكن تكرار هذه العملية مرتين أو ثلاثة مرات في اليوم. إذا كان العلاج في موضع غير اليدين فيجب غسل اليدين جيداً بعد كل استعمال. اذا لم يحدث تحسن خلال ستة اسابيع او اذا تواجد تفاقم للوضع، فيجب استشارة الطبيب.

**تجنب / ي التسمم :** يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال و/أو الرضع ، وذلك لتفادي اصابتهم بالتسمم. اذا اف्रطت في استعمال المقادير الدوائية او اذا بله الطفل /ة خطأ من هذا الدواء ، عليك التوجة الى المستشفى حالاً مصطحبها عبوة الدواء. لا تسبب / ي التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب. لا تتناول / ي الدواء في الظلام: يجب تشخيص طابع الدواء والتتأكد من المقادير الدوائية في كل مرة تتناول / ين فيها دواء. ضع / ي النظارات الطبية اذا لزم الأمر ذلك .

**التخزين:** يُحفظ في مكان مظلم وبدرجة حرارة تحت ٢٥°C درجة مئوية. حتى عند مراعاة تعليمات التعبئة / التخزين، تبقى الأدوية صالحة لفترات محدودة فقط. الرجاء ملاحظة تاريخ انتهاء صلاحية المستحضر المدونة على العبوة. في حالة الشك! عليك استشارة الصيدلي الذي صرف لك هذا الدواء. لا يجوز خزن أدوية مختلفة في نفس العبوة.

**رقم سجل الدواء :** ٤٧٠٠٤٣٨٣٠٠

**المنتج :** ريكح للصناعة الدوائية م.ض. شارع هاميلاخا ٣٠ ، حولون .