

(مستحضرات) ١٩٨٦

إقرا/ي النشرة بامعان حتى نهايتها
قبل استعمالك للدواء

أقرت وزارة الصحة صيغة هذه النشرة ومحتواها
فحص ورخص من قبلها في نيسان ٢٠١١

ستر بيسيليس® عديم السكر

ليمون

أقراص للمص

التكوين

كل قرص للمص يحتوي على:

2.4-Dichlorobenzyl alcohol

0.6 mg Amylmetacresol

المواد غير الفعالة:

Flav P Lemon Flavor 74940-74, Sodium Saccharin,
Tartaric Acid, Maltitol liquid, Isomalt, Quinoline
Yellow (E104 CI 47005), Water Purified.

الفصيلة العلاجية

مطهر.

دواعي الإستعمال

مستحضر مطهر عديم السكر. يستعمل للتخفيف من آلام

الحنجرة لدى الأطفال والكبار.

متى لا يجوز لك إستعمال المستحضر؟

لا يجوز إستعمال هذا الدواء إذا وجدت حساسية لأحد

مركباته.

تحذيرات

لا يجوز إستعمال هذا الدواء في فترات مقاربة أو لفترة طويلة

بدون إستشارة الطبيب.

يجب إبلاغ الطبيب عن أي حساسية لديك لطعام أو عقاقير قبل

إستعمالك للدواء.

التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تتعاطى/ن دواء إضافياً أو إذا نهيت العلاج الآن بدواء

آخر، فيجب إعلام الطبيب المعالج، وذلك لتقادي الخطار أو

عدم التجاعة الناتجة عن التفاعلات بين العقاقير.

الأعراض الجانبية

إضافة إلى التأثيرات الطبية المعروفة للدواء، فقد تظهر أثناء

فترة إستعماله بعض الأعراض الجانبية.

الأعراض التي تقتضي إهتماماً خاصاً

تتبع، طلع جلدي أو التهاب موضعي (لم تكن موجودة قبل

إستعمال المستحضر) (نادراً): توقف/ي عن العلاج

وراجع/ي الطبيب.

أما إذا ظهرت لديك أعراض جانبية لم تذكر في هذه النشرة، أو

إذا طرا أي تغيير على شعورك العام، عليك عندئذ مراجعة

الطبيب.

الأعراض الجانبية والتفاعلات بين الأدوية عند الأطفال

على الوالدين إبلاغ الطبيب المعالج عن كل تأثير جانبي يبدو

لدى الطفل/ة وعن أي دواء آخر يتم تناوله!

راجع/ي الفقرات المتعلقة بالأعراض الجانبية الخاصة

بالمذكورة أعلاه.

الجرعة اليومية الإعتيادية في حالة عدم وجود تعليمات

أخرى من الطبيب

للأطفال والأطفال: قرص واحد للمص كل ٢ - ٣ ساعات.

لا تتجاوز/ي الجرعة الموصى بها.

هذا الدواء غير مخصص عادة للأطفال والرضع دون عمر

٦ سنين.

يجب مراجعة الطبيب إذا لم يطرأ تحسن على حالتك الصحية

خلال عدة أيام.

يجب مراجعة الطبيب حالاً في حالات وجود آلام شديدة أو

متواصلة في الحنجرة أو إذا رافقتها السخونة، الصداغ أو

الغثيان والتقيؤات.

إرشادات الإستعمال

يجب أن يذاب الدواء في الفم بواسطة المص.

لا يجوز مضغ أو كسر قرص المص.

يجب مص قرص المص ببطء.

تحجب/ي التسليم!

يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء في مكان مغلق بعيداً عن

متناول أيدي الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتقادي إصابتهم

بالتسمم.

إذا أقرطت في تناول الجرعة الدوائية أو إذا بلغ الطفل/ة خطأ

من هذا الدواء، عليك التوجه إلى المستشفى حالاً مصطحباً/ة

عبوة الدواء.

لا تسلب/ي التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب!

لا تتناول/ي الدواء في العتمة!

يجب تخصيص طابع الدواء والتأكد من الجرعة الدوائية في

كل مرة تتناول/ين فيها دواء.

ضع/ي النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

التخزين

يجب حفظ هذا الدواء دون ٢٥ درجة مئوية.

تبقى الأدوية صالحة لفترة محدودة فقط، حتى ولو ظلت في

عبئتها الأصلية، وتم حفظها بموجب تعليمات الخزن. الرجاء

ملاحظة تاريخ انتهاء صلاحية المستحضر المدونة على العبوة.

في حالة الغثاء، عليك إستشارة الصيدلي الذي صرف لك هذا

الدواء.

لا يجوز تخزين أدوية مختلفة في نفس العبوة.

رقم سجل الدواء: ٠٠ ٢٤٩١٧ ٥٢ ٥٢.

المنتج:

ريكيت بيكتوزير هيلث كير. إينتر ناسيونال م.ض.

تو تجم. إنكلترا.

صاحب الإمتياز:

ريكيت بيكتوزير (نبر ايسيت) م.ض.

شارع هانا جاري ٦، هود هشارون ٥٢٤٠

٤٥٢٤٠