

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ В СООТВЕТСТВИИ С ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМИ ПОЛОЖЕНИЯМИ (ПРЕПАРАТЫ) – 1986

Внимательно и полностью прочитайте инструкцию перед приемом препарата

Формат настоящей инструкции установлен Министерством здравоохранения, содержание его проверено и утверждено им в Апреле 2011

СТРЕПСИЛС® БЕЗСАХАРА

ЛИМОН

Таблетки для рассасывания

Состав

Каждая таблетка для рассасывания содержит:

2,4-Dichlorobenzyl alcohol 1.2 mg

Amymetacresol 0.6 mg

Вспомогательные вещества:

Flav P Lemon Flavor 7,4940-74, Sodium Saccharin, Tartaric Acid, Maltitol liquid, Isomalt, Quinoline Yellow (E104-C147005), Water Purified.

Фармакотерапевтическая группа

Антисептическое средство.

Предназначение

Не содержащий сахара антисептический препарат для облегчения боли в горле у детей и взрослых.

Противопоказания к применению

Противопоказано применение препарата при повышенной чувствительности к одному из компонентов препарата.

Предостережения

Не применяйте препарат часто или в течение продолжительного срока без консультации врача. До начала приема препарата следует сообщить врачу о повышенной чувствительности к каким-либо продуктам питания или лекарственным препаратам.

Взаимодействие препаратов

Если Вы принимаете другой лекарственный препарат или только что закончили лечение другим препаратом, сообщите об этом лечащему врачу в целях предотвращения опасности или неэффективности лечения, связанных с взаимодействием препаратов.

Побочные эффекты

Во время курса лечения, наряду с желаемым действием препарата, могут возникнуть побочные эффекты.

Побочные эффекты, требующие особого внимания

Местные воспаления или сыпь, раздражение (отсутствовавшие до приема препарата) (редко) - прекратите лечение и обратитесь к лечащему врачу.

В случае, если Вы заметили побочные эффекты, не упомянутые в инструкции, или произошло изменение в общем самочувствии - обратитесь к лечащему врачу.

Побочные реакции и взаимодействие препаратов

У детей

Родители должны сообщить лечащему врачу о каждом побочном эффекте, равно как и о любом другом препарате, принимаемом ребенком!

См. особые побочные эффекты, описанные выше.

Рекомендуемая доза при отсутствии других

указаний врача

Взрослые и дети: рассасывать по одной таблетке каждые 2-3 часа.

Не превышайте рекомендуемую дозу.

Этот препарат обычно не предназначен для детей и младенцев младше 6 лет.

Если в течение нескольких дней не произошло улучшения в самочувствии – обратитесь к врачу.

Сильная или продолжительная боль в горле, или боль в горле, сопровождаемая жаром, головной болью, тошнотой или рвотой, требуют немедленного обращения к врачу.

Указания к применению

Препарат должен раствориться во рту.

Не разжевывайте и не разламывать таблетку.

Таблетку нужно рассасывать медленно.

Избегайте отравления!

Этот препарат, как и любой другой, надлежит хранить в закрытом, недоступном для детей и/или младенцев месте, во избежание отравления.

Если Вы приняли избыточную дозу, или ребенок по ошибке проглотил этот препарат - немедленно обратитесь в приемное отделение больницы, захватив с собой упаковку препарата.

Не вызывайте рвоту без получения точных указаний врача!

Лекарства нельзя принимать в темноте! Проверяйте надписи и дозу каждый раз перед приемом препарата. При необходимости пользуйтесь очками.

Хранение

Храните препарат при температуре ниже 25°C.

Даже при хранении в рекомендуемой упаковке/рекомендуемых условиях препараты имеют ограниченный срок годности. Обратите внимание на срок годности препарата! В случае сомнения – проконсультируйтесь с фармацевтом, выдавшим препарат.

Не храните разные препараты в одной упаковке.

Регистрационный номер препарата: 052-52-24917-00

Производитель:
Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.,
Nottingham, England.

Владелец лицензии:
Reckitt Benckiser (Near East) Ltd.,
6 Hanagar St., Hod Hasharon 45240.