

بوليسبيت غسل المهبل

التركيب: Povidone Iodine 10%

لقائمة المواد الغير فعالة في المستحضر انظر فقرة 6 - معلومات اضافية.

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل استعمالك الدواء. تحوي هذه النشرة معلومات موجزة عن الدواء. اذا كانت لديك اسئلة اخرى، توجه الى الطبيب او الصيدلي.

يُعطى هذا الدواء بدون وصفة طبيب وهي مخصصة للكبار. عليك تناول الدواء بالشكل الصحيح. استشر الصيدلي اذا كنت بحاجة لمعلومات اخرى.

يجب التوجه للطبيب اذا لم تخففي الاعراض خلال 5 ايام
إغم استعمال الدواء.

1. لماذا هذا الدواء؟

هذا الدواء مخصص لغسل مطهر للمهبل.

الفعالية الطبية: اليود هو مادة مطهرة.

2. قبل استعمال الدواء:

يُمنع استعمال الدواء:

- لا تستعمل هذا الدواء إذا كان لديك حساسية لمادة اليود، أو ل احد المركبات الأخرى للدواء.
- لا تستعمله لدى الاطفال كغسيل للمهبل.
- لا تستعمله إذا كنت حاملاً أو مرضعة.

تحذيرات خاصة فيما يتعلق باستخدام هذا الدواء:

- إذا كانت لديك حساسية لأي نوع من الطعام أو الدواء، عليك إبلاغ الطبيب قبل استخدام هذا الدواء.
- لا يجوز لك استعمال هذا الدواء في فترات مقاربة أو لفترة طويلة بدون استشارة الطبيب

لا يجوز لك استعمال هذا الدواء قبل مراجعة الطبيب
مقدمات:

- إذا كنت تعاني أو اذا عانيت في الماضي من خلل في وظيفة الغدة الدرقية (تيرويد).
- غسل المهبل - يُمنع الاستعمال أثناء فترة الحمل والرضاعة دون استشارة الطبيب، خوفا من تضرر الغدة الدرقية (تيرويد) لدى الجنين.
- إذا كنت تعاني من مرض التهابات الحوض، أو تاريخ من الأمراض المنقولة جنسياً.

إذا كنت تتعاطين بولاً اضافياً أو إذا أنهيت العلاج مؤخراً ببولاً آخر، فيجب إعلام الطبيب أو الصيدلي.

وذلك لتفادي الاخطار أو عدم النجاعة الناتجة عن التفاعلات بين العقاقير، خاصة الادوية من المجموعات التالية:

- ليتيوم.

الحمل والرضاعة:

إذا كنت تخططين للحمل في فترة استعمال هذا الدواء، فيجب استشارة الطبيب بالنسبة للميزات والاطخار من استعمال بوليسبيت لغسل المهبل خلال فترة الحمل.

إذا كنت حاملاً، فيجب استشارة الطبيب قبل استعمال الدواء.

- يمكن استعمال الدواء اذا كنت مرضعة.
- يُمنع استعمال بوليسبيت لغسل المهبل خلال 6 ساعات منذ اقامة علاقة جنسية، اذا كنت قد استعملت مبيد الحيوانات المنوية في المهبل لمنع الحمل.
- بوليسبيت لغسل المهبل ليس وسيلة لمنع الحمل.

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب دائماً الاستعمال وفقاً لتعليمات الطبيب. اذا لم تكن متأكدًا، فيجب عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي.

الجرعة الموصى بها في حال عدم وجود تعليمات اخرى من الطبيب:

لغسل المهبل:

اخلطي ملعقة واحدة بوليسبيت (15 مل) ب لتر ماء فاتر، للغسل مرتين في الاسبوع. اذا لم يطرأ تحسن بوضعك خلال 5 ايام،

يجب التوجه للطبيب.

لا تستعمله لدى الاطفال كغسيل للمهبل.

بوليسبيت لغسل المهبل لا يسبب بقع على الجلد او القماش القطني.

يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

ليس للبلع! هذا الدواء معد للاستعمال الخارجي فقط.

إذا تناولت جرعة زائدة أو اذا بلع ولد بالخطأ من الدواء، توجه فوراً للطبيب او للطوارئ في المستشفى واحضر عبوة الدواء معك.

إذا نسيت تناول الدواء، فيجب تناوله فور تذكرك ولكن يُمنع تناول جرعتين معاً في اي حال من الاحوال. تناول الجرعة التالية في الوقت المحدد واستشير الطبيب او الصيدلي.

يُمنع تناول ادوية في الظلام! افحص العبوة والجرعة في كل مرة تتناول فيها الدواء. ضع/ي نظارات اذا كنت بحاجة اليها. إذا كانت لديك اسئلة اضافية بما يتعلق باستعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

4. أعراض جانبية:

كما الحال في كل دواء، استخدام بوليسبيت لغسل المهبل قد يؤدي لاعراض جانبية لدى بعض المستخدمين. لا داعي للذعر من قائمة الاعراض الجانبية. قد لا تعاني من اي عرض منها.

● إذا كنت تعاني من الطفح الجلدي، الاحمرار " خلايا النحل"، أو حكة، أو أي رد فعل غير عادي بعد استخدام هذا الدواء، يجب التوقف عن استعمال هذا الدواء والتوجه للطبيب في اسرع وقت ممكن.

● إذا استمرت أعراض الحكة والتهيج في المهبل لأكثر من 5 ايام، او اذا تطور احمرار، تورم، أو ألم، فيجب التوقف عن العلاج والتوجه للطبيب.

● يجب التوجه للعلاج الطبي فوراً اذا واجهت احد الاعراض الجانبية الخطيرة التالية:

● الحساسية الشديدة (طفح جلدي شديد، احمرار خلايا النحل، الحكة، صعوبة في التنفس؛ ضيق في الصدر، تورم في الفم، الوجه، اللغّة أو اللسان)؛ قشعريرة. جفاف مفرط في المهبل، الحمى، آلام حادة في البطن، افرازات غير عادية من المهبل، آلام في المهبل، ألم، تورم، احمرار، أو تهيج.

إذا ظهر عرض جانبي، أو اذا تفاقم احد الاعراض الجانبية، أو اذا كنت تعاني من اعراض جانبية لم تذكر في هذه النشرة، عليك عندئذ مراجعة الطبيب.

5. كيف تخزن الدواء؟

امنع اي التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول ايدي الاطفال و/او الرضع وهكذا تمنع التسمم. لا تتسبب بالتقيؤ بدون تعليمات واضحة من الطبيب.

● يُمنع استعمال الدواء بعد انقضاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على ظهر العبوة/ تاريخ انقضاء الصلاحية يُظهر اليوم الاخير لنفس الشهر.

● يجب حفظ الدواء في مكان جاف وبدرجة حرارة تحت 30°C. يمكن استعمال الدواء حتى 4 اسابيع من يوم فتح العبوة.

6. معلومات اخرى:

بالاضافة الى المادة الفعالة يحتوي هذا الدواء كذلك على: Purified water, Disodium hydrogen phosphate dihydrate, Citric acid anhydrous, Poloxamer-407 (Lutrol F-127), Polyethylene glycol 400.

كيف يبينو الدواء وماذا يوجد بداخل العبوة:

محلول بلون بني معبأ داخل زجاجة.

صاحب الامتياز والمنتج: ريكس للصناعة النوائية م.ض. شارع هاميلدا 30 حولون، اسرائيل.

فحصت هذه النشرة وصودقت بواسطة وزارة الصحة في تاريخ 2014/8.

رقم تسجيل هذا الدواء في قائمة الأدوية في وزارة الصحة: 140-19-31669-00