

# פוליספט

## שטיפה וגינאלית

הרכב:

פובידון אידיון 10% Povidone Iodine

לרשימת החומרים הבלתי פעילים בתכשיר ראה סעיף 6 - מידע נוסף.

קראי בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו ניתנת ללא צורך במרשם רופא והיא מיועדת למבוגרים. עליך ליטול התרופה בצורה נכונה. היועצי ברוקח אם הינך זקוקה למידע נוסף.

יש לפנות לרופא אם התסמינים אינם חולפים תוך 5 ימים למרות השימוש בתרופה.

### 1. למה מיועדת התרופה?

התרופה מיועדת לשטיפה אנטיספטית של הנרתיק. פעילות תרופתית: יוד הוא חומר מחטא.

### 2. לפני שימוש בתרופה:

אין להשתמש בתרופה זו:

- אין להשתמש בתכשיר באם ידועה רגישות ליוד או לאחד ממרכיביה האחרים של התרופה.
- אין להשתמש בילדים כשטיפה וגינלית.
- אין להשתמש אם הינך בהריון או מניקה.

### אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

- אם הינך רגישה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עליך להודיע על כך לרופא לפני השימוש בתרופה.
- אין להשתמש בתכשיר לעיתים קרובות או לתקופה ממושכת מבלי להתייעץ עם רופא.

### אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול:

- אם הינך סובלת או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד בלוטת התריס (תירואיד).
- שטיפה וגינאלית - אין להשתמש במהלך ההריון וההנקה מבלי להיוועץ ברופא. מחשש לפגיעה בבלוטת התריס (תירואיד) של העובר.
- אם את סובלת ממחלה דלקתית של אגן הירכיים, או היסטוריה של מחלות המועברות במגע מיני (מחלות מין).

### אם את לוקחת, או אם נטלת לאחרונה, תרופות אחרות או הינך נוטלת תרופה נוספת, או אם גמרת זה עתה טיפול בתרופה אחרת עליך לדווח לרופא המטפל או לרוקח. כדי למנוע סיכונים או אי-יעילות הנובעים מתגובות בין-תרופתיות. במיוחד, לגבי התרופות הבאות:

- ליתיום.

### הריון והנקה:

אם הינך מתכוונת להרות בזמן השימוש בתרופה זו, יש להתייעץ עם הרופא על היתרונות והסיכונים של שימוש בפוליספט שטיפה וגינאלית במהלך ההריון. אם הינך בהריון, יש להיוועץ ברופא לפני התחלת השימוש בתרופה.

אין להשתמש בתרופה זו אם הינך מניקה. אין להשתמש בפוליספט שטיפה וגינאלית בתוך 6 שעות מקיום יחסי מין. אם השתמשת בקוטל זרע בנרתיק למניעת הריון. פוליספט שטיפה וגינאלית אינו אמצעי למניעת הריון.

### 3. כיצד תשתמש בתרופה?

תמיד יש להשתמש לפי הוראות הרופא. אם אתה לא בטוח איך להשתמש בתרופה, יש להיוועץ ברופא או רוקח.

מינון מקובל בהעדור הוראה אחרת מהרופא:

לשטיפה של הנרתיק:

ערבבי כף אחת פוליספט (15 מ"ל) בליטר אחד של מים פושרים, לשטיפה פעמיים בשבוע. אם לא חל שיפור

במצב תוך 5 ימים, יש לפנות לרופא.

אין להשתמש בילדים כשטיפה וגינלית.

פוליספט שטיפה וגינאלית אינו מכתים את העור ואת בד הכותנה.

### אין לעבור על המנה המומלצת.

לא לבלוע! תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד.

אם נטלת בטעות מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, יש לפנות מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והביאי אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול את התרופה - יש ליטול מנה מיד כשנזכרת אך בשום אופן אין ליטול שתי מנות יחד. קחי את המנה הבאה בזמן הרגיל והיועצי ברופא או רוקח.

אין ליטול תרופות בחושך! בדקי התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטלת התרופה. הרכבי משקפיים אם הינך זקוקה להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועצי ברופא או ברוקח.

### 4. תופעות לוואי:

כמו בכל תרופה, השימוש בפוליספט שטיפה וגינאלית עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהלי למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבלי מאף אחת מהן.

- במקרה של פריחה בעור, סרפדת גירוד, או כל תגובה חריגה אחרת לאחר השימוש בתרופה זו, יש להפסיק את השימוש ולפנות לרופא בהקדם האפשרי.

- אם תסמינים של גרד וגירוי בנרתיק נמשכים יותר מ 5 ימים, או אם מפתחת אדמומיות, נפיחות, או כאב, יש להפסיק את השימוש ולפנות לרופא.

- יש לפנות לעזרה רפואית באופן מיידי אם חווית אחת מתופעות הלוואי החמורות הבאות:

תגובות אלרגיות חמורות (פריחה חמורה, סרפדת, גירוד, קשיי נשימה; לחץ בחזה, נפיחות בפה, בפנים, בשפה, או בלשון); צמרמורת; יובש מוגזם בנרתיק, חום, כאבי בטן עזים, הפרשות יוצאות דופן מהנרתיק, כאבים בנרתיק, כאב, נפיחות, אדמומיות, או גירוי.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או אם הינך סובלת מתופעת לוואי שלא הזכרנו בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

### 5. איך לאחסן את התרופה?

מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרמי להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של החודש.

- יש לאחסן במקום יבש ובטמפרטורה מתחת ל-30°C. ניתן להשתמש בתרופה עד 4 שבועות מיום הפתיחה.

### 6. מידע נוסף

נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:

חומרים בלתי פעילים:

Purified water, Disodium hydrogen phosphate dihydrate, Citric acid anhydrous, Poloxamer-407 (Lutrol F-127), Polyethylene glycol 400.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

תמיסה בצבע חום ארזזה בבקבוק.

בעל הרישום והיצרן:

רקח תעשיית תרופות בע"מ,

רח' המלאכה 30, חולון, ישראל.

עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות באוגוסט 2014.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 140-19-31669-00