עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו-1986
קרא/י בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש/י בתרופה.

נורופן פורטה טבליות

הרכב: כל טבליה מכילה:
חומר פעיל: Ibuprofen 400 mg

מרכיבים בלתי פעילים:
Croscarmellose sodium, Sodium lauryl sulfate, Sodium citrate, Stearic acid, Colloidal anhydrous silica, Carmellose sodium, Talc, Acacia spray dried, Sucrose, Titanium dioxide, Macrogol 6000, Opacode Monogramming Ink S-1-15904 red.
כל טבליה מכילה 232.2 מ"ג סוכרוז.

קבוצה תרפויטית: נוגדי דלקת שאינם סטרואידים (NSAIDs).

התוויה:
נורופן פורטה מיועד לשיכוך כאבים קלים עד בינוניים כגון: כאב ראש, כאבי שיניים, כאבי מחזור, כאב גב ושרירים.
להקלה בתופעות הקשורות למחלות שיגרוניות (ראומטיות).

מתי אין להשתמש בתכשיר?

אל תשתמשי בתרופה כאשר הינך בהריון.
אין להשתמש בתרופה זו אם ידועה רגישות לאחד ממרכיביה, אם היתה לך בעבר תגובה אלרגית בנטילת משכך כאבים כלשהו, אם עברת זה עתה, או הינך עומד/ת לעבור ניתוח לב.
אין ליטול בו זמנית עם תרופות אחרות מקבוצת נוגדי דלקת שאינם סטרואידים.
אין להשתמש בתרופה זו אם הינך סובל/ת או סבלת בעבר מכיב עיכולי.
השימוש בילדים מתחת לגיל 12 שנה יהיה בפיקוח רפואי.

אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול: אם הינך מיניקה או אם הינך סובל/ת או סבלת בעבר מבעיות בקיבה כגון: צרבת או כאבי בטן, בעיות בקרישת דם, יתר לחץ דם, מחלות לב וכליה, מליקוי בתיפקוד מערכת הנשימה (כגון אסטמה או פוליפים באף), הכבד, זאבת אדמנתית, ממחלות רקמות החיבור או רגישות לסליצילטים (אספירין, אם הינך נוטל/ת משתנים, אם הינך מעל גיל 60, אם נטילת תרופה מקבוצה זו או כל משכך כאבים אחר גרמה בעבר לתופעות-לוואי חמורות.

איך תשפיע התרופה על חיי היום יום שלך?

בחולים מסויימים תרופה זו עלולה לגרום לנימנום, סחרחורת או טישטוש בראייה. אם חשת בתופעות אלה לאחר השימוש בתכשיר, עליך להיזהר בנהיגה ברכב או בהפעלת מכונות מסוכנות.
באשר לילדים (מעל גיל 12 שנה), יש להזהירם מרכיבה על אופניים או ממשחקים בקרבת הכביש וכדומה.

תרופה זו עלולה לגרום לרגישות מיוחדת עם חשיפה לשמש (לשיזוף מוגבר); על-כן יש להמנע מחשיפה לשמש ולדאוג להגנה מתאימה (בגדים ארוכים, כובע, משחות הגנה וכו').

אזהרות:
אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או תקופה ממושכת בלי להיוועץ ברופא.
במקרה של טיפול ממושך בתרופה זו יש לערוך בדיקות דם, שתן, תפקודי כבד, כליה ובדיקות עיניים.
אם הינך רגיש/ה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עליך להודיע על-כך לרופא לפני נטילת התרופה.
עליך לדווח לרופא המרדים על נטילת התרופה אם הינך עומד/ת לעבור ניתוח (כולל ניתוח דנטלי) או בדיקות מעבדתיות, מאחר והטיפול עלול להפריע לתוצאות הבדיקה.
נטילת תכשיר זה עלולה לגרום לדימומים בקיבה במיוחד אם:
- עברת את גיל 60.
- הינך נוטל/ת תרופות אחרות מקבוצת נוגדי דלקת שאינם סטרואידים.
- הינך צורך/ת יותר מ-3 משקאות אלכוהוליים ליום.

נטילת תכשיר זה במינון גבוה מהמומלץ, או לתקופה ממושכת עלולה להגביר את הסיכון לשבץ מוחי או התקף לב ולדימום בקיבה.

תרופה זו עלולה לגרום לתופעות אלרגיות כגון: פריחה עורית, גרד, שלפוחית בעור, נפיחות בפנים, קוצר נשימה, החמרה של אסטמה, הלם (שוק).
הפסק/י השימוש ופנה/י לרופא, אם החום נמשך יותר מ-3 ימים או אם הכאבים נמשכים יותר מ-10 ימים.
הטבליות מכילות סוכרוז.

תגובות בין-תרופתיות:
אם הינך נוטל/ת תרופה נוספת, או אם סיימת זה עתה טיפול בתרופה אחרת, עליך לדווח לרופא כדי למנוע סיכונים או אי-יעילות הנובעים מתגובות בין-תרופתיות, במיוחד לגבי תרופות מהקבוצות הבאות: אספירין וסליצילטים או נוגדי דלקת אחרים, תרופות נגד קרישת דם (כגון קומרין ונגזרותיו), תרופות להורדת לחץ דם (כגון חוסמי בטה או קפטופריל), פרובנציד, ליתיום או מטוטראקסט (לסרטן ולספחת).

תופעות לוואי:
בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה, בזמן השימוש בה עלולות להופיע השפעות לוואי, כגון: שילשול, כאב בטן, בחילה, נמנום או סחרחורת.

תופעות המחייבות התייחסות מיוחדת:
הפרעות בראיה או בשמיעה (נדיר): הפסק/י הטיפול ופנה/י לרופא.
פריחה, סימפטומים של דלקת קרום המוח (כגון: כאבי ראש, חום, צוואר נוקשה), בחילות חריפות וממושכות, הקאות, צפידות, כאבים בעמוד השידרה או בצקת (נדיר): הפסק/י הטיפול ופנה/י לרופא מיד.
כאבים ברום הבטן, כאבי ראש או קילוף עור (נדיר): הפסק/י הטיפול ופנה/י לרופא.
אם הינך חש/ה עילפון, הקאה דמית, צואה דמית או שחורה - יש להפסיק הטיפול ולפנות מיד לרופא.
בכל מקרה שבו הינך מרגיש/ה תופעות לוואי שלא צויינו בעלון זה, או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית עליך להתייעץ עם הרופא מיד.

מינון: המינון המקובל בהעדר הוראה אחרת מהרופא:
מבוגרים וילדים מעל גיל 12: טבליה אחת כל 4-6 שעות.
אין ליטול יותר מ-3 טבליות במשך 24 שעות.
אין ליטול במשך יותר מ-10 ימים, למעט אם הרופא הורה על כך (ראה/י סעיף אזהרות).
אם תסמיני המחלה מחמירים או מתמשכים, יש לפנות לרופא.
אין ליטול מעל המנה המומלצת.
יש ליטול את המנה הנמוכה ביותר המשיגה את מטרת השימוש.
תרופה זו אינה מיועדת לילדים מתחת לגיל 12 שנים.

אופן השימוש:
אין ללעוס! לבלוע את התרופה עם הרבה מים, עם או אחרי הארוחה.
בהעדר קו חציה, לא ניתן לחצות את הטבליות.

<u>מנע/י הרעלה!</u>
תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל-ידי כך תמנע/י הרעלה.
אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה/י מיד לחדר מיון של בית-חולים והבא/י אריזת התרופה איתך.
<u>אין לגרום להקאה</u> ללא הוראה מפורשת מרופא!
<u>אין ליטול תרופות בחושך!</u> יש לבדוק התווית והמנה <u>בכל פעם</u> שהינך נוטל/ת תרופה. יש להרכיב משקפיים אם הינך זקוק/ה להם.

אחסנה: מתחת ל-30°C.
לסגור היטב למניעת חדירת אוויר ורטיבות.
גם לפי תנאי האריזה/האחסנה המומלצים, תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד.
נא לשים לב לתאריך התפוגה של התכשיר! בכל מקרה של ספק, עליך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופה.אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.

מס' רישום התרופה: 00 29085 66 105

היצרן: רקיט בנקיזר הלת'קר בע"מ, אנגליה.
בעל הרישום: רקיט בנקיזר (ניר איסט) בע"מ, רח' הנגר 6, הוד השרון, ת.ד. 6440, ישראל 45240.

פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר באוקטובר 2012.