

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים

(תכשירים) התשמ"ו-1986

קרא/י בעיון את העלון עד סופו כטרם תשתמש/י בתרופה  
פורמט עלון זה ניקבע ע"י משרד הבריאות ותכנון נבדק ואושר על ידי ב-07/2017

# גליצרין פתילות למבוגרים

הרכב:

כל פתילה למבוגרים מכילה:

Glycerin 1.104 g

Glycerin 2.16 g

כל פתילה לילדים מכילה:

Stearin, Sodium Carbonate, Purified Water. **גם:**

פתילות מכילות בנוסף גם:

פתילות רפואיות: משולש.

התוויה: התרופה מיועדת להקלת עצירות.

**מתי אין להשתמש בתכשיר?**

אין להשתמש אם ידועה רגישות לאחד ממרכיבי התרופה.

אין להשתמש בתרופה משולשת אם לא הופיעה פעילות מעיים במשך יום אחד או יומיים ('רהאי' גם בסעיף 'אזהרות').

אין להשתמש במקרה של אי ספיקת לב.

אין להשתמש במקרה של דימום רקטלי/אד מוסבר או בחסימת מעיים או חוסר תפקוד כרוני של המעיים.

אין להשתמש במקרים של בחילות, הקאות, כאבי בטן.

אין להשתמש במקרים של סימנים של דלקת התוספתן.

**אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול:**

אם הינן בהריון או מיניקה.

אם הינן סובלות או סבלת בעבר מליקוי בתיפקוד: הלב ו/או כלי דם, מערכת העיכול.

אם הבחנת בשינוי פתאומי בתדירות פעילות המעיים אשר מתמשך מעל לשבועיים.

**אזהרות:** שימוש מתופש עלול לגרום לתלות במקולשלים!

אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או תקופה ממושכת בלי להיוועץ ברופא.

אם הינן רגיש/ה לאלמנט כלשהו או לתרופה כלשהי, עליו להודיע על-כך לרופא לפני נטילת התרופה.

תכשיר זה מיועד רק לעצירת הנמשכת מספר ימים. חוסר פעילות המעיים ליום או יומיים אינו מצדיק שימוש בו. כמו כן אין להשתמש בו למטרות אחרות כגון 'ניקוי הגוף' וכדומה.

**תגובות בין תרופתיות:** אם הינן נוסט/ת תרופה נוספת, או אם גמרת זה עתה טיפול בתרופה אחרת עליו לדווח לרופא המטפל כדי למנוע סיכונים או אי-עילות הנובעים מתגובות בין תרופתיות. במיוחד לגבי תרופות משולשות אחרות.

**תופעות לוואי:** בנוסף לפעילות הרואית של התרופה, בזמן השימוש בה עלולות להופיע השפעות לוואי כגון: פריחה בעור עם גירויים, בחילה, סחרחורת.

**תופעות החיוביות התייחסות מיוחדת:**

גירוי מקומי או דלקת או פריחה במקום הטיפול (נדיר): הפסק הטיפול ופנה לרופא. הופעת דימום רקטלי או העדר פעולת מעיים אחרי שימוש במשולש: הפסק הטיפול

ופנה לרופא.

בכל מקרה שבו הינן מרגיש/ה תופעות לוואי שלא צויינו בעלון זה, או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית, עליו להתייעץ עם הרופא מיד.

**תופעות לוואי ותגובות בין תרופתיות בילדים ותינוקות:**

על ההורים לדווח לרופא המטפל על כל תופעות לוואי וכן על כל תרופה נוספת הניתנת לילד/ה.

**מינון מוקבל בהעדור הרואה אחרת מרופא:**

גליצרין פתילות למבוגרים: פתילה אחת ליום למבוגרים לפי הצורך.

אין לעבור על המנה המומלצת.

תרופה זו אינה מועדפת בדרך כלל לילדים ותינוקות מתחת לגיל 6 שנים.

גליצרין פתילות לילדים: פתילה אחת ליום לילדים לפי הצורך.

אין להשתמש בילדים מתחת לגיל שנתיים בלא הרואה של רופא.

אם לא חל שיפור במצב תוך שבוע יש לפנות לרופא.

**שים לב:** אל לבונו תרופה זו מועדפת לשימוש בפי הטבעת בלבד.

**אופן השימוש:** הסר העטיפה מן הפתילה, ניתן להרטיב את הפתילה במעט מים להקלת ההחדרה.

שכב על צידו והחדר הפתילה עמוק לתוך פי הטבעת בעזרת האבע. רחץ היטב את ידיו.

פעולת מעיים מוקבלת בד"כ תוך 15 דקות עד שעה.

**כיצד תוכלו/י לסייע להצלחת הטיפול?**

רצוי שהפתילה תישאר בפי הטבעת כ-15 דקות.

הטיפול צריך להיות מלווה בצריכה מתאימה של נוזלים (1.5-1 ליטרים).

הרגלי זונה ופעולת גופנית מתאימים (דיאטה עשירת סיבים).

בימוש ברציפות מעל שבוע יש להיוועץ ברופא.

**מנע הרעלה!**

תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי-כך תמנע הרעלה. אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לחדר מיון של בית-חולים, והבא אריזת התרופה. אתר: **אל תגרום**

**למקרה ללא אריזה מפורשת מרופא!**

**אין ליטול תרופות בחשאי!** בדוק התוויה והמנה בכל פעם שהינן נוסט לתרופה.

הרכיבי משקפים אם הינן יזוקה להם.

**אחסנה:** שמור בטמפרטורה מתחת ל-25°C.

לפי תנאי האריזה/האחסנה המומלצים, תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד. נא לשמור על תאריך התפוגה של התכשיר! בכל מקרה של ספק, עליו להיוועץ ברופא.

שיטת נר את התרופה. אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.

**מס' רישום התרופה:**

גליצרין פתילות מבוגרים: 00-21926-137-97

גליצרין פתילות ילדים: 00-33387-41-146

**יצרן:** רחק תעשייה פרמצבטיית בע"מ, רח' המלאכה 30 חולון, ישראל.