

فونجيمون

مسحوق

المواد الفعالة وتركيزها في وحدة مقدار دوائي :

زنك أونديسييلين	18%
Undecylenic acid	3%
Aluminium chlorohydrate	3%

المواد غير الفعالة في المستحضر - انظر الفقرة ٦ «معلومات إضافية».

اقر الشارة بتمعن حتى نهايتها قبل استعمال الدواء. تحتوي هذه الشارة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا تورط لديك الأطفال والرضع دون عمر ستين إلٰي سبعين من الطبيب وتحت إشارة، عليك الاستعلام بشكٍ صحيٍّ. استشر الصيدلي إذا كنت بحاجة لمعلومات إضافية. عليك مراجعة الطبيب إذا تفاقمت حالتك أو لم تتحسن بعد ٤ أسابيع.

(١) لأي غرض مخصص الدواء؟

فونجيمون يجمع بين ميراء الفعالية ضد الفطريات ومية من العرق.
الدواء مخصص لمنع وعلاج فطر القدم (Athlete's foot) وأمراض جلدية فطرية.

(٢) قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (الergicy) للمواد الفعالة أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء.
- كان الجلد مصاباً بجرح

تذكرة خاصة بتعليق واستعمال الدواء

- إذا كنت حساساً لأي طعام أو لأي دواء، عليك إبلاغ الطبيب بذلك قبل تناول الدواء.
- تجنب تناول الدواء مع المينين ومن استنشاق المادة.

قبل العلاج بـ فونجيمون احك للطبيب إذا:

- كنت تعاني أو كنت في الماضي من خلل في وظيفة الأوعية الدموية.
- كنت تعاني من السكري.

إذا كنت تتناول أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وأصناف غذائية، احك للطبيب أو الصيدلي عن ذلك. يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي بالأشخاص إذا كنت تتناول مستحضر آخر أولاً للإستعمال على نفس المنطقة في الجلد.

الحمل والإرضاع

إذا كنت في فترة الحمل أو الرضاعة يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل الإستعمال. نظراً لعدم تورط المعلومات بخصوص الأمان عند الإستعمال أثناء فترة الرضاعة أو الحمل.

(٣) كيفية استعمال الدواء؟

عليك الاستئناف من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكون واثقاً بخصوص الإستعمال. المقادير الدوائية الاعتيادي هو: مرتين في اليوم للإستعمال بين أصابع القدمين، في

قبل الإستعمال يجب تنظيف المبنية المصابة وما حولها وتحفيفها جيداً. يجب الإستعمال في رش المسحوق على القدمين حتى بعد الشفاء لمدة ما يقارب الأسبوعين وذلك لمنع تكرار ظهور التلوث الفطري. كذلك بالإمكان استعمال المسحوق كوسيلة وقائية في الشتا. في حالات التلوث الفطري، على المربيين المفاظ على شروط النظافة الملاشة مثل الإغسال مرة واحدة في اليوم على الأقل بالتزامن مع العلاج بالمستحضر.

هذا الدواء غير مخصص عادة للأطفال والرضع دون عمر ستين إلٰي سبعين من الطبيب وتحت إشارة. يجب مراجعة الطبيب إذا لم يطرأ تحسن على حالتك خلال ٤ أسابيع.

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائية الموصى بها.
لا يجوز اللجوء إلى الاستعمال الخارجي فقط. هذا المستحضر غير فعال للإستعمال على فروع النساء أو الأظافر.

إذا استعملت مقداراً فوقاً مقارنة بأدyle الطفولة في المستشفى وأحضر على الدواء، توجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر عليه الدواء معك. بلع المسحوق من شأنه أن يؤدي إلى ظهور الآعراض التالية: غثيان، تقيؤات، إضطرابات أخرى في الجهاز الهضمي.

كيف تستطيع المساعدة في نجاح العلاج؟

المرتبطة بتساعد على معاً المظاهر، لذلك يجب الحفاظ على جفاف المنطقة المصابة.
يجب غسل المبنية المصابة قبل كل إستعمال بالدواء.

إذا كان العلاج في القديم يجيب الحرص على الغسل جيداً وتجميف خاصة بين الأصابع. من المفضل استعمال الجوارب الطبية؛ يجب الإنتباه عن ارتداء الجوارب الصوفية أو المصنوعة من المواد الإصطناعية. من المفضل تبديلها عدة مرات في اليوم (ذلك حسب كمية العرق).

في الوسائل المعلنة بالمملكة المتحدة من الموصى به انتقال صنادل بدون جوارب.

لا تتناول الأدوية في العتمة؛ يجب تشخيص طابع الدواء والتاكيد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء، ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا تورط لديك أسلطة إضافية حول إستعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

(٤) الأعراض الجانبية

كما يكتل دواء، إن إستعمال فونجيمون قد يسبب أمراض جانبية عند بعض المستعملين. لا تنتهي من قائمة أمراض الجانبية، من الجائز الاعتقاد أي منها.

يجب مراجعة الطبيب إذا ظهرت أمراض جانبية.

تهيج موضعي، إنتفاٌ أو طفح.

إذا ظهر عرض جانبى، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية، أو عندما تعانى من عرض جانبى يذكر في هذه النشرة، عليك استشارة الطبيب.

(٥) تحذيرات خاصة تختزن الدواء؟

تجنب التسمم: يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال / أو الرضع، وذلك لتفادي اصطيهانهم بالتسنم. لا تسبب التقيؤ بدون تليميات من الطبيب.

لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنتهاء تاريخ الصلاحية (exp. date) (الذي يظهر على العلبة والمصنة). يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

يجب تخزين في مكان بارد وجاف، دون ٢٥ درجة مئوية.

(٦) معلومات إضافية

يحتوى الدواء بالإضافة للمواد الفعالة أيضاً:

Purified talc, magnesium trisilicate, methyl hydroxybenzoate sodium, colloidal silicon dioxide, essence lavender.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة؟
عينة بلاستيك تحتوي على ٦٠ غرام مسحوق بلون أبيض ذو رائحة خرامي لا يزيد.

صاحب الامتياز والمنتج: تيريلما، منتجات طبية إسرائيلية مبروت. م.ض.، كيبوتس عبوروت ٤٢٠٠٤، إسرائيل.

اقترب وزارة الصحة صيفه هذه النشرة ومحتوها مُخصّص ورخص في حزيران ٢٠١٤

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:
١٠٠٤١١٠٠٢٤٤٥٢٨-٢٢٤٥٠٢٨-

من أجل سهولة وتوسيع القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكرة. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصوص لكل الجنسيين.

٤٠٢٣٠٠٠
معبروت
٦٥ منتجات طبية إسرائيلية
معبروت، م.ض.

