

فريسكو أقراص

التركيب: كل قرص يحتوي على:

Calcium Carbonate 500 mg
Magnesium Carbonate 12 mg

المواد غير الفعالة:

Mannitol, maize starch, talc, lactose, alginate, gelatin, magnesium stearate, magnesium trisilicate, aerosil, peppermint oil, spearmint oil, sodium cyclamate, saccharin sodium.

كل قرص يحتوي على ١.٤ ملغ صوديوم، ٣ ملغ كلتوز و ٠.٢ ملغ سكارين. صوديوم.

قدرة القرص على تعديول الحموضة: حوالي 10.5 mEq

الصلابة العلاجية: هذا الدواء ينتمي إلى مضادات الحموضة.

تأثيرات الدواء الطبية: لتخفيض أو تعديل الحموضة الزائدة في المعدة.

متى لا يجوز لك إستعمال المستحضر؟

لا يجوز إستعمال هذا الدواء إذا وجدت لديك حساسية لأحد مركباته.
لا يجوز إستعماله في حالات زيادة الكالسيوم أو في حالات وجود خلل خطير في وظائف الكلية.
كما لا يجوز إستعماله في حالات وجود إشارات تدل على التهاب الزائدة الدودية أو التهاب الأمعاء مثلاً: آلام البطن، غثيان أو تقيؤات.
لا يجوز إستعماله إذا كنت تعاني/ن من حصي في الكلى أو من مرض اللحمانية Sarcoidosis (تدرنات أو حبيبات لحماية).

لا يجوز لك إستعمال هذا الدواء قبل مراجعة الطبيب مقدماً:

عندما تكونين في فترة الحمل أو الرضاعة. إذا كنت تعاني/ن أو إذا عانيت في الماضي من خلل في وظيفة الكلى/السالس البولية، الغدة الدرقية، الجهاز الهضمي كالإمساك أو إندساد الأمعاء، التهاب الزائدة الدودية، التهاب القولون، الوباسير، نزف من الأمعاء و نزف من الشرج، مفاغرة القولون Colostomy (عملية فتحة تصريف في القولون)، مفاغرة المعى ileostomy، إسهال. إذا كنت تعاني/ن من كسور في العظام، أمراض في الكبد، أمراض القلب/الووعية الدموية.

كيف سيؤثر هذا الدواء على سير أمورك اليومية؟

يجب الامتناع عن الإفراط بإستعمال التبغ، المشروبات الكحولية أو المشروبات التي تحتوي على الكافئين.

تحذيرات: لا يجوز لك إستعمال هذا الدواء في فترات مقاربة أو لفترة طويلة بدون إستشارة الطبيب. يجب إبلاغ الطبيب عن أي حساسية لديك لطعام أو عقاقير قبل إستعمالك للدواء. لا يجوز تناول هذا الدواء صباحاً قبل إجراء اختبار إفراز حموضة المعدة.

في حالة العلاج المتواصل بهذا الدواء (حسب تعليمات الطبيب) يُفضل

إجراء الفحوص لتتركيز الكلس في الدم.

التفاعلات بين الأدوية: إذا كنت تتعاطى /ن دواءً إضافياً أو إذا أنهيت العلاج الآن بدون آخر، فيجب إعلام الطبيب المعالج، وذلك لتقادي الأخطار أو عدم النجاعة الناتجة من التفاعلات بين العقاقير، خاصة الأدوية التي تنتمي إلى المجموعات التالية: مضادات الفطريات (كينتوكنازول)، أدوية تحتوي على الحديد والفوسفات، الكلس، المنغزيم، مضادات حيوية (تتراسيكلينات، أدوية فلوأوروكوبولون)، فيتامين D، جليكوزيدات الديجيتال، سلولوز صوديوم فوسفات، ميتانامين، صوديوم بوليسستيرين سولفونات، كورتيكوستيروئيدات، فينيتوئين.

الأعراض الجانبية: إضافة إلى التأثيرات الطبية المرغوبة للدواء، فقد تظهر أثناء فترة إستعماله بعض الأعراض الجانبية كجفاف الفم، إمساك، إسهال، مذاق كلسي، آلام في البطن، عطش، قلة الشهية للطعام، غثيان، تقيؤات، إضطرابات في الجهاز الهضمي.

أما إذا ظهرت لديك أعراض جانبية لم تذكر في هذه النشرة، أو إذا طرأ أي تغيير على شعورك العام، عليك عندئذ مراجعة الطبيب حالاً.

الجرعة الدوائية الإعتيادية في حالة عدم وجود تعليمات أخرى من الطبيب: من قرص إلى قرصين بعد الطعام وقبل النوم وحسب اللزوم. لا يجوز تناول أكثر من ١٥ قرصاً في اليوم.

هذا الدواء غير مخصص للإستعمال لدى الأطفال دون ٦ سنين من العمر بدون إستشارة الطبيب.

إنتبه/ي: يجب الانتظار ساعتين على الأقل بين تناول هذا الدواء وبين تناول الأدوية الأخرى المتتالية عن طريق الفم.

لا يجوز تناول هذا الدواء بشكل متزامن مع كميات كبيرة من الحليب ومنتجاته، الخبالة، منتجات القمح الكامل، السبانخ.

إرشادات الإستعمال: يجب مضغ القرص أو مصه.

كيف تستعمل/ين أن تساهم/ي في نجاح العلاج؟

يجب الإكثار من شرب السوائل من أجل منع تشكل حصي الكلى.

تجنب/ي التسمم!

يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتقادي إصابتهم بالتسمم. إذا أفرطت في تناول الجرعة الدوائية أو إذا بلغ الإطف/ة خطأ من هذا الدواء، عليك التوجه إلى المستشفى حالاً مصطحباً/ة عبوة الدواء.

لا تسبب/ي التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب!

لا تتناول/ي الدواء في العتمة: يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول/ين فيها دواء.

ضع/ي النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

التخزين: يجب حفظ هذا الدواء في مكان جاف، تحت 25° درجة مئوية. تبقى الأدوية صالحة لفترات محدودة فقط، حتى ولو ظلت في عبئتها الأصلية وتم حفظها بموجب تعليمات الخزن. الرجاء ملاحظة تاريخ إنتهاء صلاحية المستحضر الدوائية على العبوة، في حالة الشك!

عليك إستشارة الصيدلي الذي صرف لك هذا الدواء.

لا يجوز تخزين أدوية مختلفة في نفس العبوة.

رقم سجل الدواء: ٢٨٥٨٢١٩٥٢٠٠

المنتج: ويك للصناعة الدوائية م.ض.، شارع هامبلاخ ٠٢، حولون، إسرائيل.