

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ В СООТВЕТСТВИИ С ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМИ СТАНДАРТАМИ (ТРЕПАРАТЫ) – 1986

Внимательно и полностью прочтите данную инструкцию
перед применением препарата

Формат настоящей инструкции установлен Министерством
здравоохранения, его содержание проверено и утверждено 08/2008

ФРЕСКО Таблетки

Состав: каждая таблетка содержит:

Calcium Carbonate 500 mg

Magnesium Carbonate 12 mg

Пассивные ингредиенты: Mannitol, maize starch, talc, lactose, alginate acid, gelatin, magnesium stearate, magnesium trisilicate, aerosil, peppermint oil, spearmint oil, sodium cyclamate, saccharin sodium.

Каждая таблетка содержит 1.4 мг натрия, 3 мг лактозы и 0.2 мг сахара натрия.

Способность нейтрализации кислоты в одной таблетке: приблизительно 10.5 mEq

Фармацевтическая группа: нейтрализатор кислоты.

Терапевтическое действие: для снижения или нейтрализации повышенной кислотности в желудке.

Когда не следует принимать препарат?

Противопоказано применение препарата при повышенной чувствительности к одному из компонентов препарата.

Не применяйте данный препарат в случае гиперкальциемии или острой почечной недостаточности.

Не применяйте препарат, если имеются симптомы аппендицита или воспаления кишечника, например, такие, как: боли в животе, тошнота или рвоты. Не применяйте препарат, если Вы страдаете почечнокаменной болезнью или саркоидозом.

Не применяйте препарат без предварительной консультации с врачом:

Если Вы беременны или кормите грудью.

Если Вы страдаете или страдали в прошлом нарушениями функций: почек/системы мочеотделения, щитовидной железы, пищеварительной системы, например: запорами или непроходимостью кишечника, аппендицитом, колитом, геморроем, кровотечением из тонкого кишечника или прямой кишки, колостомией, илеостомией или поносами. Если Вы страдаете переломами костей, заболеваниями печени, болезнями сердца/кровеносных сосудов.

Как повлияет препарат на Вашу повседневную жизнь?

Избегайте избыточного потребления табака, крепких алкогольных напитков или напитков, содержащих кофеин.

Предостережения: Не принимайте данный препарат часто или в течение продолжительного срока без консультации с врачом.

До начала приема препарата следует сообщить врачу о наличии повышенной чувствительности к продуктам питания или лекарственным препаратам. Не следует принимать препарат утром перед анализом отделения кислоты в желудке.

При длительном лечении этим препаратом (по указанию врача) желательно проводить анализ концентрации кальция в крови.

Взаимодействие препаратов: Если Вы принимаете другой лекарственный препарат или недавно закончили лечение другим препаратом, сообщите об этом лечащему врачу в целях предотвращения опасности или неэффективности лечения, связанных с взаимодействием препаратов, в особенности, если Вы принимаете препараты следующих групп: противогрибковые препараты (кетоконазол), препараты, содержащие железо и фосфор, кальций, магний, антибиотики (тетрациклины, фтороквинолоны), витамин D, гликозиды наперстянки, целлюлоза фосфат натрия, метанамин, полистирен сульфат натрия, кортикостероиды, фенитоин.

Побочные эффекты: Во время курса лечения, наряду с желаемым действием препарата, могут возникнуть побочные эффекты, такие как: сухость во рту, запор, понос, ощущение вкуса мела, боли в животе, жажда, снижение аппетита, тошнота, рвота, нарушения деятельности пищеварительной системы.

В случае, если Вы заметили побочные эффекты, не упомянутые в данной инструкции, или произошло изменение в общем самочувствии - незамедлительно обратитесь к лечащему врачу.

Рекомендуемые дозы при отсутствии иных указаний врача: 1-2 таблетки после приема пищи, перед сном или при необходимости. Не следует принимать более 15 таблеток в день.

Данный препарат не предназначен для лечения детей младше 6 лет, за исключением указаний врача.

Внимание: Следует соблюдать не менее, чем двухчасовой интервал между приемом этого препарата и других лекарств, вводимых через рот. Не следует принимать это лекарство одновременно с большими количествами молока и молочных продуктов, отрубями, продуктами из цельной пшеницы, шпинатом.

Указания к применению:

Следует прожевывать или сосать это лекарство.

Как способствовать успешному лечению?

С целью избежать образования камней в почке Вам следует выпивать большое количество жидкостей.

Избегайте отравления! Данный препарат, как и любую другую, надлежит хранить в закрытом, недоступном для детей и/или младенцев месте, во избежание отравления. Если Вы приняли большую дозу, или ребенок по ошибке проглотил этот препарат - незамедлительно обратитесь в приемное отделение больницы, захватив с собой упаковку препарата. **Не вызывайте рвоту** без получения точных указаний врача! **Лекарства нельзя принимать в темноте!** Проверьте надписи и дозу **каждый раз** перед применением препарата. При необходимости пользуйтесь очками.

Хранение: в сухом месте, ниже 25°C.

Даже при хранении в рекомендуемой упаковке/рекомендуемых условиях препараты имеют ограниченный срок годности. Обратите внимание на срок годности препарата! В случае сомнения - проконсультируйтесь с фармацевтом, выдавшим препарат.

Не храните разные препараты в одной упаковке.

Регистрационный номер препарата: 028582195200

Производитель: Реках Фармацевтика ЛТД, ул. Мелха 30, Холон, Израиль.