

مكابي مول كيد فورتي

فتائل

التركيب:

تحوي كل فتيلة على:

باراسيتامول 250 mg - Paracetamol 250 mg -

للمواد غير الفعالة في المستحضر انظر الفقرة 6 - "معلومات اضافية".

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل استعمالك الدواء: تحوي هذه النشرة معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت لديك سؤال آخر، توجه إلى الطبيب أو الصيدلي.

يُعطى هذا الدواء بدون وصفة طبيب وهو مخصص للأولاد من جيل 6 سنوات فما فوق. لتخفيض السخونة وتسكين الآلام. يمكن استعمال هذا الدواء أيضاً للبالغين.

يجب التوجه إلى الطبيب إذا استمرت السخونة لأكثر من 3 أيام أو إذا لم تختفي الاعراض خلال 5 أيام رغم استعمال الدواء.

يجب تناول الدواء بشكل صحيح. استشر الصيدلي إذا كنت بحاجة إلى معلومات إضافية.

1. لماذا هذا الدواء؟

هذا الدواء مخصص لتسكين الآلام وتخفيض السخونة.

المجموعة العلاجية: مسكن للألام وخافض للسخونة.

2. قبل استعمال الدواء:

يُمنع استعمال الدواء:

• إذا كانت لديك حساسة للباراسيتامول أو لأحد المركبات الأخرى التي يحتويها الدواء.

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء:

• إذا تعرض البالغ/الولد لأثار جانبية جلدية في الماضي بسبب تناول مستحضرات تحوي الباراسيتامول وذلك كي لا يتسبب مرة أخرى باعراض جانبية خطيرة.

• يحوي المستحضر باراسيتامول الذي قد يؤدي إلى تضرر الكبد عندما:

- يُعطي بجرعة زائدة عن الموصى بها أو لفترة متواصلة.

- في فترة العلاج تتناول مشروبات روحية.

- تتناول أدوية أخرى تؤثر على فعالية الكبد.

• يُمنع تناول الدواء لفترات متواصلة بدون استشارة الطبيب.

• يُمنع تناول أدوية أخرى لتخفيض السخونة وتسكين الآلام أو أدوية للرشح بدون استشارة الطبيب أو الصيدلي لتجنب جرعة زائدة أو تسمم باراسيتامول.

• يُمنع تناول أدوية أخرى تحوي باراسيتامول.

• يُمنع تناول جرعة عالية (في حدود الموصى به) لهذا الدواء في فترة الصوم.

• إذا كان لدى الولد حساسية لطعام معين أو لدواء معين، فعليك اعلام الطبيب قبل تناول الدواء.

• يحتوي الدواء على زيت الصويا. إذا كانت لديك حساسية للصويا أو للفستق، فلا تستعمل الدواء.

يجب استشارة الطبيب قبل البداية بالعلاج إذا كنت تعاني أو عانيت في الماضي من:

• مرض كبدي أو خلل في وظيفة الكبد.

• خلل في وظيفة الكلى.

• ادمان الكحول.

• يرقان.

• إذا كنت حاملاً أو مرضعة.

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب ومضادات الغذاء، اخبر بذلك الطبيب أو الصيدلي.

خاصة يجب اعلام الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تتناول أدوية من المجموعات التالية أو إذا انهيت مؤخراً تناول أدوية:

• أدوية مضادة لتخثر الدم خاصة وارافيرين.

• مستحضرات تحفز إنتاج إنزيمات الكبد (مثل: ريفامبيسين، باربيتورات).

• أدوية الصرع - الفينيتوين، كاربامازيبين.

• مستحضرات مضادة للالتهابات غير منشطة.

• ميتوكلوبراميد أو دومبيريدون (المستخدم في علاج الغثيان والقيء ومشاكل في الجهاز الهضمي الأخرى).

• كلورامفينيكول (مضادات حيوية).

• بروبينسيد (معالجة التقرّس).

• كولسترامين (الخفض الدهون في الدم)

• لا تتناول هذا الدواء مع مستحضرات أخرى تحتوي على باراسيتامول.

تأكد من التركيب مع طبيبك أو الصيدلي.

استعمال البراسيتامول والكحول:

يُمنع تناول الكحول في فترة العلاج بالبراسيتامول بسبب ارتفاع خطر تضرر الكبد.

الحمل والرضاعة:

إذا كنت حاملاً أو مرضعة فيجب استشارة الطبيب قبل استعمال الدواء.

الاستعمال مع الأولاد:

هذا الدواء مخصص للأولاد فوق سن 6 سنوات، (20 كغم فما فوق).

يجب على الآباء إبلاغ الطبيب عن أي آثار جانبية فضلاً عن أي دواء آخر

يُعطى للولد. يُمنع اعطاء الولد الكحول او ادوية تحوي كحول، في فترة العلاج بهذا الدواء.

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب عليك استشارة الطبيب او الصيدلي اذا لم تكن متأكداً. الجرعة الموصى بها في حال عدم وجود تعليمات اخرى من الطبيب: اولاد حتى سن 6 سنوات: حسب تعليمات الطبيب فقط.

اولاد من 6-12 سنة: 1-2 فتيلة، 4-5 مرات في اليوم.
كبار: 2 فتيلة، 4-5 مرات في اليوم.

يجب الانتظار 4 ساعات على الاقل قبل إعطاء جرعة اخرى.

يجب التوجه الى الطبيب اذا استمرت السخونة لاكثر من 3 ايام او اذا لم تختفي الاعراض خلال 5 ايام رغم استعمال الدواء.
يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

اذا تناول ولد بالخطأ جرعة مضاعفة من الدواء، توجه فوراً للطبيب او للطوارئ في المستشفى.

ليس للبلع! هذا الدواء مخصص للاستخدام في المستقيم فقط.
يُمنع قطع/قسم الفتيلة.

طريقة الاستعمال:

ملاحظة: اذا كان الفتيل لينة جداً حيث يصعب امكانية ادخالها، يمكن تبریدها عن طريق تخزينها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة، او عن طريق امساكها تحت مياه جارية باردة قبل ازالة الطغاء.

1. كيفية ادخال الفتيل: أولاً، اغسل يديك جيداً.

2. اعزل فتيلة واحدة من باقي الفتائل. لازالة الفلاف، يجب فصل الغلاف في المنطقة المسطحة من الغلاف.

3. ضع مع الطفل على جنبه، وادخل الفتيل بلطف في عمق المستقيم بإصبعك.
4. اغسل يديك جيداً بعد ادخال الفتيل.

اذا تناولت الخطأ جرعة زائدة او اذا ابتلع ولد بالخطأ من الدواء، توجه فوراً للطبيب او للطوارئ في المستشفى واحضر عبوة الدواء معك. يُمنع تسبب التقيؤ بدون تعليمات واضحة من الطبيب! حتى لو كان شعورك

جيد، العلاج الفوري ضروري، بسبب خطر تطور ضرر خطير للكبد.
قد تكون الاعراض الجانبية الغثيان والقيء، الإسهال، فقدان الشهية، آلام في البطن، الانفاس، التعرق المفرط، ألم أو حساسية في الجزء العلوي من البطن، وقد لا تعكس شدة تضرر الكبد.

يُمنع تناول ادوية في الظلام! افحص العبوة والجرعة في كل مرة تتناول فيها الدواء. ضع/ي نظارات اذا كنت بحاجة اليها.

4. اعراض جانبية:

كما الحال في كل دواء، استخدام مكابي مول كيد فورتي قد يؤدي لاعراض جانبية مثل الاحمرار او الم في منطقة فتحة الشرج لدى بعض المستخدمين. لا داعي للذعر من قائمة الاعراض الجانبية. قد لا تعاني من اي عرض منها.

اعراض جانبية خطيرة:

يجب التوقف على العلاج والتوجه الى الطبيب فوراً:
• إذا كان هناك حساسية شديدة مثل الطفح الجلدي والحكمة، تورم في

الوجه والشفتين واللسان والحلق و/أو الأطراف التي قد تسبب صعوبة في التنفس أو البلع.

• قد يسبب البراتسيتامول في حالات نادرة، لظهور أمراض جلدية شديدة قد تكون علاماتها: احمرار، طفح جلدي، بثور، إصابة جلدية على نطاق واسع.

• قد تظهر اعراض جانبية جلدية شديدة حتى لو كنت قد تناولت في الماضي مستحضرات تحوي المادة الفعالية البراتسيتامول بدون مشاكل.

• إذا ظهرت اعراض جانبية جلدية فيجب التوقف عن العلاج وتوجه للطبيب فوراً.

• إذا كنت ترى علامات على تغيرات في الجهاز الدموي، مثل نزيف، كدمات، تطور التهابات بسهولة.

اذا تفاقم احد الاعراض الجانبية، او اذا كنت تعاني من اعراض جانبية لم تذكر في هذه النشرة فيجب عليك مراجعة الطبيب فوراً.

5. كيف تخزن الدواء؟

امنعاً/ي التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول ايدي الاطفال و/او الرضع وهكذا تمنع التسمم. لا تتسبب بالتقىؤ بدون تعليمات واضحة من الطبيب.

• يُمنع استعمال الدواء بعد انقضاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على ظهر العبوة/ تاريخ انقضاء الصلاحية يُظهر اليوم الاخير لنفس الشهر.

• يجب حفظ الدواء تحت درجة حرارة 25°C.

6. معلومات اخرى:

بالاضافة الى المادة الفعالة يحتوي هذا الدواء كذلك على:

Hard Fat, Soya Oil, Methylparaben, Propylparaben, BHT, BHA.

كيف يباع الدواء وماذا يوجد بداخل العبوة:

فتائل بيضاء مغلفة بخلاف PE-ALUMINIUM في

علبة من 12 فتيلة.

صاحب الامتياز والمنتج:

ريصح للصناعة الدوائية مرض.

شارع هاميلاخا

30 حولون، اسرائيل.

فحصت هذه النشرة وصودقت بواسطة وزارة

الصحة في نوفمبر 2013

رقم تسجيل هذا الدواء في قائمة الأدوية في وزارة

الصحة: 00 31436 17 137

من اجل التخفيف وتسهيل القراءة، كتبت هذه النشرة بصيغة المذكرة. بالرغم من ذلك، هذا الدواء مخصص للجنسين.