

ثيو جيل

التركيب:

ايزو-شيبينديل هيدروكلوريد 0.75%

Isothipendyl Hydrochloride 0.75%

لائحة المواد الغير فعالة في المستحضر انظر فقرة

6 - معلومات اضافية».

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل استعمال

الدواء. تجوي هذه النشرة معلومات موجزة عن

الدواء. اذا كانت لديك اسئلة اخري، توجه الى

الطبيب او الصيدلي.

يعطي هذا الدواء بون وصفة طبيب وهي مخصصة

للكبار والولاد من سن 30 شهراً فما فوق.

الجرعة للأولاد دون 6 سنوات: تحدد بواسطة

الطبيب.

على مراجعة الطبيب اذا لم تختفي الاعراض خلال

5 أيام رغم استعمال الدواء.

ادا واجرت اعراض جانبية لم تذكر في هذه النشرة.

او اذا كنت تعاني من احد الاعراض الجانبية بشكل

جدى، توجه للطبيب او الصيدلي.

يجب تتولى الدواء بشكل صحيح. استشر الصيدلي

ادا كنت بحاجة لمعلومات اضافية.

1. لماذا هذا الدواء؟

الاستطباب: هذا الدواء مخصص لتفتيق

مؤقت للحكمة بسبب اضطرابات طفيفة

للجلد مثل: لدغات (غير سامة)، تهيج، حرق

الشمس والتهاب جلدي جراء حساسية من

اللباب او البلوط.

الفصيلة العلاجية:

مضاد الهيستامين للاستعمال الخارجي.

2. قبل استعمال الدواء:

يمنع استعمال الدواء:

• اذا وجدت لديك حساسية لمضاد الهيستامين

او الإيزو-شيبينديل او لأحد مركبات الدواء

الآخر.

• على جروح مفتوحة او ملتهبة.

لا يجوز لك استعمال هذا الدواء قبل مراجعة

الطبيب مقدماً:

ادا كنت حاماً او مرضعة.

تحذيرات خاصة تخص استعمال الدواء:

يمنع استعمال الدواء بشكل متكرر دون استشارة

الطبيب.

ادا كانت لديك حساسية لطعم معين او دواء معين.

فعليك اعلام الطبيب المعالج قبل تناول الدواء.

يمنع الاستعمال على جروح مفتوحة، جله مشتق

او ملتهب، وجود بثور او تصريفات، او جدرى

الماء او الحصبة.

يجب الامتناع عن الاستعمال المتواصل او الواسع

للمستحضر.

يمنع استعمال هذا المستحضر على اليدين.

يمكن الاستعمال على منطقة كبيرة تحت ضمادة، على

جلد متضرر، او الرضيع او الخدج بسبب خطر انتقال

المادة الفعلية الى الدم.

يمنع الاستعمال على الاشيه المخاطية.

هذا الدواء ليس مرهم حماية من الشميس.

يمنع استعمال هذا الدواء كمرهم لعنابة جلد صحي.

الحكمة هي عرض من اعراض التي يمكن أن يكون

لها أسباب عديدة التي تتطلب المشورة من الطبيب

و خاصة في حالة اضطرابات مستمرة او مقاومة.

ادا كنت تتناول، او اذا تناولت مؤخرًا،

ابوية اخرى بما في ذلك ابوية بيون وصفة

طبيب ومضافات الطعام، اخبر بذلك الطبيب

والصيدلي.

الحمل والرضاعة:

يجب استعمال هذا الدواء بحذر في فترة

الحمل والرضاعة.

يجب استشارة الطبيب او الصيدلي اذا كنت

حاماً او مرضعة قبل استعمال الدواء.

معلومات مهمة على بعض مركبات ثيو جيل:

يحتوي الدواء على حمض السوربيك والتي

قد تسبب رد فعل موضعي على الجلد (مثل

الاكزيما).

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب استشارة الطبيب او الصيدلي اذا لم تكن متاكداً.

الجرعة الموصى بها في حال عدم وجود تعليمات

اخرى من الطبيب:

يجب دهن المنطقة المصابة 3-2 مرات في اليوم. هذا

الدواء مخصوص للكبار والولاد فوق سن 30 شهراً.

الجرعة للأولاد دون 6 سنوات: تحدد بواسطة

الطبيب.

يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

اذا لم يحدث تحسن خلال 5 ايام فعليك مراجعة

الطبيب.

انتبه: ليس للبلع! هذا الدواء معد للاستعمال

الخارجي فقط.

يجب الامتناع عن تناول المستحضر العينين، الاشيه

المخاطية (مثل في الفي الانف) في حالة اصابة

العينين، فيجب غسلهما جيداً بالماء.

اذا نسيت دهن هذا الدواء في الوقت المحدد، يُمنع

بای شكل من الاشكال تعوضها بالدهن مرتبين معاً.

اذا تناولت جرعة زائدة او اذا بلع ولد بالخطأ من

الدوااء، توجه فوراً للطبيب او للطوارئ في المستشفى

واحضر عبوة الدواء.

يُمنع تناول ادوية في الظلام؛ افحص العبوة

والجرعة في كل مرة تتناول فيها الدوااء. ضع اي

نظارات اذا كنت بحاجة اليها.

اذا كانت لديك اسئلة اضافية بما يتعلق

باستعمال الدواء: استشر الطبيب او الصيدلي.

4. اعراض جانبية:

كما الحال في كل دواء، استخدم ثيو جيل قد يؤدي

لاعراض جانبية لدى بعض المستخدمين. لا داعي

للذعر من قائمة الاعراض الجانبية. قد لا تتعانى من

اي عرض منها.

في حالة ظهور احد هذه الاعراض الجانبية توجه

للطبيب:

- ظهور حساسية ثيو جيل.

- حالات نادرة من الحساسية للضوء (رد فعل في

الجلد عند التعرض الضوء الشخص او شعاع UV).

اذا تفاقم احد الاعراض الجانبية، و اذا كنت تعاني

من اعراض جانبية لم تذكر في هذه النشرة فيجب

عليك من اجل العودة فوراً.

5. كيف تخزن الدواء؟

امض اي التسمم: يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء

آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول يدي الاطفال

واو الرضيع ومكдан تمنع التسمم، لا تتسبب بالتنفس

بدون تعليمات واضحة من الطبيب.

يُمنع استعمال الدواء بعد انقضاء الصلاحية (date)

(الظهور على ظهر العبوة. تاريخ انقضاء

الصلاحية يظهر اليوم الاخير لنفس الشهر).

بعد فتح العبوة للمرة الاولى يمكن استخدام الدواء

لمدة 8 اسابيع.

يجب حفظ الدواء تحت درجة حرارة 25°C.

6. معلومات اخرى:

بالاضافة الى المادة الفعالة يحتوي هذا الدواء

كل ذلك على:

Purified water, sorbitol solution 70%, Carboxymethylcellulose sodium, sorbic acid, edetic acid, sodium hydroxide

كيف يبقي الدواء وماذا يوجد داخل العبوة:

هلام شفاف معجاً في أنبوب من الألومنيوم يحوي

40 غرام.

صاحب الامتياز والمنتج:

ريჯ لصناعة الدوائية م.ض. شارع هاميلانا 30

حولون، اسرائيل.

فُحصت هذه النشرة وصودقت بواسطة وزارة

الصحة في تاريخ: أبريل 2014

رقم تسجيل هذا الدواء في قائمة الأدوية في

وزارة الصحة:

140 23 24394 00

من اجل التخفيف وتسهيل القراءة، كتبت هذه النشرة

بصيغة المذكرة. بالرغم من ذلك، هذا الدواء مخصوص

للجنسين.