



תופעות לוואי נוספות:

תופעות לוואי שכיחות:

סחרחורת, אי נוחות בקיבה, נמנום.

תופעות לוואי ששכיחותן אינה ידועה:

כאב ראש, יובש בפה, עצירות.

אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא הוזכרה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

תופעות לוואי לרغובות בין תרופתיות בילדים:
על ההורים לזוזז לרפוא המטפל על כל תופעת לוואי וכן על כל תרופה נוספת הניתנת לילד!

5. איך לאחסן את התרופה?

• מעג הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרם להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

• אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date). המופע על גבי האריזה/תווית. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

• יש לאחסן במקום חשוך וקרי, מתחת ל-25°C.

• לאחר הפתיחה הראשונה ניתן להשתמש בתכשיר עד 6 חודשים.

6. מידע נוסף

• נוסף על החומרים הפעילים התרופה מכילה גם:
Purified water, sucrose, honey 375 mg, alcohol 96%, caramel, citric acid anhydrous, vanillin, orange flavor, cherry flavor, eucalyptus oil.
• כל 5 מ"ל סירופ מכילים 3 גרם סוכרוז ו- 3.2 מ"ג נתרן.

• **כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה?**
האריזה מכילה 115 מ"ל סירופ בצבע חום-קרמל.

• **יצרן ובעל הרישום:** תרימה תוצרי רפואה ישראלים מעברות בע"מ, מעברות 4023000 ישראל.

• עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות ביולי 2014.

• מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 131.32.31021.00

• למש הפשוט ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לשני המינים.

המינון המקובל בדרך כלל הוא:

מבוגרים וילדים מעל גיל 12 שנים: 10 מ"ל 3 x פעמים ביום - 10 מ"ל בערב לפני השינה.

ילדים מגיל 6–12 שנים: 5 מ"ל 3 x פעמים ביום חצי שעה לפני הארוחות.

ילדים מגיל שנה עד גיל 6 שנים: מינון יקבע על פי הנחיית רופא.

אין לעבור על המנה המומלצת.

תרופה זו אינה מיועדת לילדים ותינוקות מתחת לגיל שנה.

אם אל חל שיפור במצבך תוך 7 ימים יש לפנות לרופא.

צורת הנסילה:

1. בתרופות נוזליות, עליך להשתמש בכפית מדידה, מרזק או טפטפות למדידת הכמות הנכונה של התרופה. באם לא צורפה כפית או אמצעי מדידה אחר לאריזה, היוועץ ברופא. אין להשתמש בכפית ביתית לצורך מדידת כמות התרופה. הכפיות הביתיות שונות בגודלן ויתכן שלא תקבל את כמות התרופה הנכונה. יש לשתוף את כפית המדידה לאחר השימוש.
2. פקקום העמידים לפתיחה על ידי לודים הורידו משמעותית את מספר מקרי הרעלה הנגרמים על ידי תרופות בכל שנה. אולם, אם אתה מתקשה בפתיחת האריזה, באפשרותך לפנות לרוקח בבקשה להסיר את מנגנון הבטיחות של הפקק ולהכפו לפקק רגיל, קל לפתיחה.

אם נולדת בטעות מינון גבוה יותר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול את התרופה בזמן הדרוש, אין ליטול מנה כפולה. קח את המנה הבאה בזמן הרגיל והיוועץ ברופא.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק תוויות והמנה **בכל פעם** שהנך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברופא.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בטוּפּוּדְרין NF עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

יש להפסיק את השימוש ולפנות לרופא אם מתפתחות התופעות הבאות:

- סימנים פתאומיים של אלרגיה כגון: פריחה, גרד, חום, נפיחות בגרון, בפנים, בשפתיים, בעפעפיים, בלשון ו/או בחלקים אחרים בגוף, קוצר/קשיי נשימה, שוק אנפילקטי.

- תחושת קור בקצות הידיים או הרגליים, בחילה, האטה/האצה של קצב הלב.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

- אין להשתמש בתרופה זו לעתים קרובות או תקופה ממושכת בלי להיוועץ ברופא.

- אם הנך רגיש למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עליך להודיע על כך לרופא לפני נטילת התרופה.

Ⓛ אין להשתמש בתרופה מבלי היוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול:

- אם הנך סובל או סבל בעבר מליקוי בתפקוד: מערכת הנשימה (כגון אסתמה), הלב ו/או כלי דם, העיניים (כגון גלאוקומה), הכליה/מערכת השתן, בלוטת התריס (תירואיד), בלוטת הערמונית.
- אם הנך סובל או סבלת בעבר מאלרגיה (במיוחד אלרגיה לתרופות), מסוכרת.
- במקרה של שיעול מתמשך כתוצאה מעישון או מבעיה כלשהי המערבת את מערכת הנשימה כגון: אסתמה, מאפיזמה, COPD (מחלת ריאות כרונית מחסימת סימפונות), או שיעול המלווה בליחה מרובה (ראה גם סעיף "אין להשתמש בתרופה").

Ⓛ אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד יש לידע את הרופא או הרוקח אם אתה לוקח:

- תרופות המשפיעות על מערכת העצבים המרכזית (כגון: תרופות להרגעה, לשינה, לפרקינסון, לאלפילסיה, נגד אלרגיות, חומרים מרדמים לניתוחים ומשככי כאבים נקוטיים).
- תרופות נגד דיכאון מסוג מעכבי מונואמיין אוקסידיז (SSRI (ראה גם סעיף "אין להשתמש בתרופה").
- תרופות להורדת לחץ דם וזלב (כגון: חוסמי ביטא).
- תרופות נגד מיגרנה.
- תרופות נגד התקררות ו/או אלרגיה.
- שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול**
אין לשתות יינות או משקאות חריפים בתקופת הטיפול בתרופה.
- הריון והנקה**
אם הינך בהריון או מניקה אין להשתמש בתרופה.

Ⓛ נהיגה ושימוש במכוונת

השימוש בתרופה עלול לפגום בערנות ו/או בראיה ועל כן מחייב זהירות בנהיגה ברכב, בהפעלת מכוונת מסוכנות ובכל פעילות המחייבת ערנות. באשר לילדים יש להזהיר מרכיבה על אופניים או ממשחקים בקרבת הכביש וכדומה.

Ⓛ עישון

אם הנך מעשן - יש לדווח על כך לרופא לפני התחלת הטיפול בתרופה זו.

Ⓛ מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה:

התרופה מכילה סוכר ונתרן.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח ביחס לאופן השימוש.

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ז – 1986

התרופה משווקת ללא מרשם רופא.

טוסופדרין NF סירופ

חומרים פעילים: כל 5 מ"ל של הסירופ מכילים:

פוטסיום גואיאיקול-סולפונאט	120 mg	Potassium guaiacolsulphonate
סודיום בנזואט	20 mg	Sodium benzoate
אפדרין הידרוכלוריד	6 mg	Ephedrine HCl
דקסטרומתורפאן הידרוברומיד	5 mg	Dextromethorphan hydrobromide

לחומרים בלתי פעילים בתכשיר - ראה סעיף 6 "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

התרופה אינה מיועדת לילדים ותינוקות מתחת לגיל שנה.

עליך להשתמש ליטול אותה בצורה נכונה. היוועץ ברופא אם הנך זקוק למידע נוסף. עליך לפנות אל הרופא באם סימני המחלה (סימפטומים) מחמירים או אינם משתפרים לאחר 7 ימים.

1. למה מיועדת התרופה?

התרופה מיועדת להקלת שיעול.

קבוצה תרופוית

Ephedrine הוא סימפטומימי.

Dextromethorphan hydrobromide הוא נוגד שיעול.

Potassium guaiacolsulphonate הוא מכיית.

2. לפני שימוש בתרופה

Ⓛ אין להשתמש בתרופה:

- אם אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה.
- בעת התקף אסטמתי או דיכוי נשימתי.
- אם הינך בהריון או מניקה.
- אם הנך נוטל תרופות מקבוצת מעכבי מונואמיין אוקסידיזא (לדיכאון) או שהפסקת טיפול בהן ב- 14 יום האחרונים.
- אם הנך נוטל תרופות מקבוצת SSRI (מעכבים סלקטיביים של ספיגה חוזרת של סרוטונין כגון: פלואוקסטיין).
- אם הנך סובל מבעיות בתפקוד הכבד.
- בתינוקות מתחת לגיל שנה.



מעברות 4023000 תוצרי רפואה ישראלים מעברות בע"מ

©