نشرة طبية للمستهلك بموجب انظمة الصيادلة (مستحضرات) ١٩٨٦
اقرأ/ي النشرة بإمعان حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء
صودقت هذه النشرة وفحص محتواها من قبل وزارة الصحة في ٠٢/٢٠١٢

ڤاليتون
نقط

التركيب:
كل ١ مل (٢٠ نقطة) يحوي: Valerian dry extract 25 mg
المواد الغير فعالة :
Ethanol 95%, Propylene glycol, Methylparaben, Potassium sorbate, Polyoxyl 40 hydrogenated castor oil (CREMOPHOR RH 40) Purified Water.

يحوي كحول ٢٥٠ ملغ/مل
تأثيرات الدواء الطبية: هذا الدواء معد للتهدئة في حالات التوتر والعصبية.

متى لايجوز لك استعمال المستحضر ؟

لا يجوز لك استعمال هذا المستحضر اذا وجدت لديك حساسية للڤالريان لأحد مركباته.
يُمنع الاستعمال لدى الاولاد دون سن ١٢.

لا يجوز لك استعمال هذا الدواء قبل مراجعة الطبيب مقدماً:
عندما تكونين حاملاً اومرضعة .

كيف سيؤثر هذا الدواء على سير امورك اليومية ؟

قد يضعف هذا الدواء من يقظتك، لذا يجب اتخاذ الحيطة والحذر اثناء قيادة المركبات، تشغيل ماكنات خطرة وممارسة أي نشاطات أخرى تتطلب اليقظة.

لا يجوز شرب النبيذ او المشروبات الروحية الأخرى اثناء فترة تناول هذا الدواء .

تحذيرات:
لا يجوز لك استعمال هذا الدواء في فترات متقاربة أو لفترة طويلة بدون استشارة الطبيب.
يجب ابلاغ الطبيب عن اي حساسية لديك لطعام او عقاقير قبل استعمالك للدواء.

التفاعلات بين الأدوية :
اذا كنت تتعاطى/ن دواءً إضافياً بما في ذلك الادوية بدون وصفة طبيب ومضافات الغذاء، أو إذا أنهيت العلاج الآن بدواء آخر، فيجب اعلام الطبيب المعالج، وذلك لتفادي الأخطار أو عدم النجاعة الناتجة عن التفاعلات بين العقاقير. خاصة بالنسبة للادوية من الفصائل التالية: ادوية اخرى لاستمرار النوم، ادوية مضادة للخوف، المسكنات المخدرة، ادوية اخرى للتهدئة ادوية الصرع، كحول، لوبارميد، لورازفام وادوية التي تسبب التسمم للكبد.

الأعراض الجانبية :
إضافة الى التأثيرات الطبية المرغوبة للدواء، فقد تظهر أثناء فترة استعماله بعض الأعراض الجانبية: الغثيان، الصداع، الخوف وتسمم الكبد لدى المستخدمين لفترة مستمرة.
أما اذا ظهرت لديك أعراض جانبية لم تذكر في هذه النشرة، أو اذا طرأ أي تغيير على شعورك العام، عليك عندئذ مراجعة الطبيب حالاً.

الجرعة الموصى بها في حال عدم وجود تعليمات اخرى من الطبيب:
للكبار والاولاد فوق سن ١٢:
٢٠-٤٠ نقطة (١-٢ مل) حسب اللزوم او حسب تعليمات الطبيب.
لا تتجاوز/ي الجرعة الموصى بها.
هذا الدواء غير مخصص لاولاد دون سن ١٢ سنة.

ارشادات الاستعمال:
خفف هذا الدواء بالماء.

تجنب/ي التسمم!
يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال و/أو الرضع ، وذلك لتفادي أصابتهم بالتسمم.
اذا افرطت في تناول الجرعة الدوائية او اذا بلع الطفل/ة خطأ من هذا الدواء، عليك التوجه الى المستشفى حالاً مصطحباً عبوة الدواء.
لا تسبب/ي التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب .
لا تتناول/ي الدواء في الظلام: يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول/ين فيها دواء. ضع/ي النظارات الطبية اذا لزم الأمر ذلك.

التخزين: بدرجة حرارة تحت ال٢٥°C.
يمكن الاستعمال حتى ١٨ شهرًا فقط بعد فتح العبوة للمرة الاولى وفقط في حالة عدم انتهاء صلاحية الدواء.
اغلق جيدًا وامنع دخول هواء او رطوبة.
تبقى الأدوية صالحة لفترات محدودة فقط. حتى ولو ظلت في علبتها الاصلية وتم حفظها بموجب تعليمات الخزن. الرجاء ملاحظة تاريخ انتهاء صلاحية المستحضر المدونة على العبوة. في حالة الشك ! عليك استشارة الصيدلي الذي صرف لك هذا الدواء. لا يجوز خزن أدوية مختلفة في نفس العبوة.

رقم سجل الدواء : ١٤٧-٤٧-٣٣١٦٩-٠٠

المنتج : ريكح للصناعة الدوائية ش.م.م. شارع هاميلاخا ٣٠ حولون

מק"ט: 5VA1165A 02/13