

## رشاش لألتف بمقدار مُعيار

المواد الفعالة وكميتها بوحدة جرعة دوائية:

كل ١٠٠ مل تحتوي على:

Dimetindene Maleate	0.025gr
Phenylephrine Base	0.250gr

دايمتدين ماليات  
فينيليفرين

لقائمة المواد غير الفعالة الرجاء أنظر البند ٦.

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها وذلك قبل البدء باستخدام الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية فتوجه إلى الطبيب أو الصيدلي.

يُعطى هذا الدواء بدون حاجة لوصفة طبية. (فيروسيول رشاش لألتف بمقدار مُعيار مُعد للبالغين وللأطفال فوق جيل ٦ سنوات. تحت هذا الجول، يجب التوجه للطبيب). يجب عليك استعمال الدواء بطريقة صحيحة. توجه لاستشارة الصيدلي إذا كنت بحاجة لمعلومات إضافية. يجب عليك التوجه للطبيب إذا تفاقم أو لم تحسن علامات المرض (الأعراض) بعد مرور ٧ أيام.

### ١. لم أعذ هذا الدواء:

فيروسيول مخصص للتخفيف المؤقت من احتقان الأنف وزكام، زكام حاد، زكام تحسسي موسمي (حمى القش) وزكام تحسسي غير موسمي والتهاب حاد في الجيوب الأنفية. يستخدم فيروسيول أيضاً كعلاج مساعد بالتهاب الأذن الوسطى.

المجموعة العلاجية:

Dimetindene maleate - مضادات الهيستامين  
Phenylephrine - مُضيق للأوعية الدموية

### ٢. قبل استعمال الدواء

#### يُمنع استعمال الدواء إذا:

- وجدت لديك حساسية للمادة الفعالة أو لأحد المركبات الأخرى التي يحتويها الدواء.
- كنت تتناول بنفس الوقت مضاد للاكتئاب من مجموعة مثبطات مونوأمين أكسيداز (للاكتئاب) أو إذا تناولت دواء كهذا خلال الأيام الـ ١٤ الماضية.
- كنت تعاني من زكام مزمن أدى إلى أن يكون غشاء الأنف المخاطي أكثر رقة.

#### تحذيرات خاصة متعلقة باستخدام الدواء:

قبل بدء العلاج فيروسيول أعلم الطبيب إذا كنت تعاني من: مرض في القلب، ضغط الدم العالي، فرط نشاط الغدة الدرقية، الرزق (الجلوكوما) من نوع ضيق الزاوية. لا يجوز استعمال فيروسيول بشكل متواصل لأكثر من ٧ أيام. في حال استمرار الأعراض، توجه لاستشارة الطبيب. استعمال متواصل أو فائض عن الحاجة ممكن أن يُسبب إلى عودة الاحتقان إلى الأنف أو إلى تفاقمه. هذه الظروف من المحتمل أن تؤدي إلى التهاب في أغشية الأنف المخاطية وأن تؤدي إلى زكام نتيجة لاستعمال الدواء. ممنوع تجاوز الجرعة الموصى بها، خاصة عند الأطفال والمسنين. فيروسيول ليس معداً للاستعمال في العينين أو الفم.

إذا كنت تتناول أو تناولت، مؤخراً، أدوية أخرى، بما في ذلك الأدوية بدون وصفة طبية والمكملات الغذائية، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. وبشكل خاص، يجب إخبار الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تتناول:

أدوية من مجموعة مثبطات مونوأمين أكسيداز (للاكتئاب) أو خلال ١٤ يوماً من انتهاء العلاج بها، أدوية مضادة للاكتئاب من نوع تريبتكلات، أدوية لخفض ضغط الدم من نوع مثبطات بيتا.

#### الحمل والإرضاع

يجب استشارة الطبيب قبل استعمال الدواء إذا كنت حاملاً أو إذا كنت مرضعة، إذا كنت تعتقد أنك حامل أو إذا كنت تخططين لتحمل، لأنه ليس معروفاً ما هي تأثيرات هذا الدواء على هذه الفئة السكانية.

#### القيادة واستعمال الماكينات

فيروسيول لا يؤثر على القدرة على قيادة السيارات أو تشغيل ماكينات.

### ٣. كيف تستعمل الدواء؟

يجب عليك الفحص مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا.

• الجرعة المُتَّبعة، عادة، هي:

أطفال من عمر ٦-١٢ سنوات (بمراقبة شخص بالغ): ٢-١ رشاش (ضغطات) في كل

منخر، ٤-٣ مرات في اليوم.

البالغين فوق ١٢ سنين والكبار: ٢-١ رشاش (ضغطات) في كل منخر، ٤-٣ مرات في اليوم.

هذا المستحضر غير موصى به للاستعمال للأطفال تحت جيل ٦ سنوات.

لا يجوز استعمال فيروسيول بشكل متواصل لأكثر من ٧ أيام

يُمنع تجاوز الوجبة الموصى بها.

إرشادات الاستعمال:

إنزع الغطاء الواقي، قبل الاستعمال للمرة الأولى فقط، يجب تشغيل الرشاش لألتف بمقدار معيار بضع مرات في الهواء وعند ذلك يكون جاهزاً للاستعمال.

نظف الأنف. أدخل فوهة الرشاش لداخل المنخر واضغط وضغطة واحدة قوية مع استنشاق الرذاذ. احرص على إخراج طرف فوهة الرشاش قبل أن ترخي الضغط على المكبس.

كرّر العملية في المنخر الثاني. أعد غطاء الأمان إلى مكانه.

إذا تناولت أو طريق الخطأ جرعة أعلى أو في حال بلع الدواء، فتوجه فوراً إلى الطبيب أو الصيدلي

إذا نسيت تناول الدواء في الوقت المحدد، فلا تتناول وجبة مضاعفة. قم بتناول الجرعة التالية في وقتها المعتاد.

يُمنع تناول الدواء في الظلام! تحقق من المصلى على الدواء ومن الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا كانت لديك أسئلة إضافية بالنسبة إلى استعمال الدواء، فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

### ٤. الأعراض الجانبية

كجميع الأدوية، قد يسبب استعمال فيروسيول أعراضاً جانبية لدى قسم من متناولي الدواء. لا تصمد عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. من المحتمل ألا تعاني من أي منها. أعراض جانبية تظهر في أحيان متباعدة (١:١٠٠٠): خفاف في الأنف، حرقة في مكان الرش.

إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو إذا عانيت من أعراض جانبية غير مذكورة في النشرة، فتعليق استشارة الطبيب.

### ٥. كيف يخزن الدواء؟

• تجنّب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء، وكلّ دواء آخر، في مكان مغلق، بعيداً عن متناول أيدي الأولاد والأطفال، وهكذا تتجنّب التسمم. لا تسبّب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

• يُمنع تناول الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية ينسب إلى اليوم الأخير في الشهر.

• احفظ بدرجة حرارة تحت الـ ٣٠°C. يجب حماية الدواء من الضوء والحرارة.

• للاستعمال لمدة شهر من يوم فتح المستحضر لأول مرة.

### ٦. معلومات إضافية

• بالإضافة إلى المواد الفعالة، يحتوي الدواء، أيضاً:

Benzalkonium chloride, Disodium phosphate anhydrous, Citric acid monohydrate, Sorbitol, Oil of lavender terpenes, Purified water.

• كيف يبدو الدواء وماذا تحوي العبوة؟ فيروسيول هو محلول شفاف - أصفر، يكون في زجاجة ١٥ ملل تحتوي على رشاش بمقدار مُعيار وفوهة لألتف مع غطاء.

• صاحب التسجيل وعنوانه: NCH م.ض، شارع هيفالسيم ١٤، بينج تيكفا.

• المنتج: نوفارتيس كونسومير هيلث، سويسرا.

• تمّ فحص هذه النشرة والتصديق عليها من قبل وزارة الصحة في تاريخ: يناير ٢٠١٥.

• رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة: ٥٨٩١٢٣١٩

• لتبسيط قراءة هذه النشرة وتسهيلها، ورد النص بصيغة المذكّر. مع هذا فالدواء معدّ لكل الجنسين.