

**Инструкция по применению препарата в соответствии с "Положением о фармацевтах (Препараты)" - 1986**  
Лекарство продается без рецепта врача

## Вибросил



### Дозированный спрей для носа

Активные вещества и их содержание в единице дозировки:

Каждые 100 мл содержат: диметинден малеат 0.025 г (Dimetindene Maleate)

фенилэфрин 0.250 г (Phenylephrine Base)

Неактивные вещества в препарате – см. пункт 6.

**Прежде чем начать применение препарата, внимательно прочтите инструкцию до конца.**

Инструкция содержит краткую информацию о препарате.

Если у вас есть дополнительные вопросы, обратитесь к врачу или фармацевту.

Этот препарат продается без рецепта врача (дозированный спрей для носа Вибросил предназначен для взрослых и для детей старше 6 лет. Относительно детей в возрасте до 6 лет следует обратиться к врачу). Следует пользоваться препаратом правильным образом. Если вам потребуются дополнительная информация, проконсультируйтесь у фармацевта. Следует обратиться к врачу, если признаки заболевания (симптомы) усугубляются или если признаки их облегчение в течение 7 дней.

#### 1. Для чего принимают данный препарат?

Вибросил предназначен для временного облегчения заложенности в носу вследствие острого ринита, сезонного аллергического ринита (сенной лихорадки), несезонного аллергического ринита и острого синусита. Вибросил используется также как вспомогательное средство лечения при воспалении среднего уха.

**Терапевтическая группа:**

Dimetindene maleate – антигистаминный препарат

Phenylephrine - суживающий капилляры препарат

#### 2. Перед применением препарата

**Не следует принимать препарат:**

- Если вы страдаете аллергией на активные вещества препарата или на любой из дополнительных компонентов, содержащихся в препарате.
- Если вы одновременно принимаете или принимали в течение последних 14 дней препарат из группы ингибиторов моноаминоксидазы (антидепрессант).
- Если вы страдаете хроническим насморком, вызвавшим истончение слизистой оболочки полости носа.

**Особые предостережения в связи с приемом препарата:**

Перед применением Вибросила сообщите вашему врачу, если вы страдаете заболеваниями сердца, высоким артериальным давлением, гиперфункцией щитовидной железы, закрытоугольной глаукомой.

Не следует применять Вибросил более 7 дней подряд. Если у вас остаются симптомы заболевания, обратитесь к врачу. Продолжительное или избыточное применение препарата может привести к тому, что ощущение заложенности в носу возникнет заново или усугубится. Подобные условия могут вызвать воспаление слизистой оболочки носа и привести к насморку вследствие применения препарата.

Не следует превышать рекомендованную дозировку, в особенности у маленьких детей и пожилых людей. Вибросил не предназначен для применения в глазах или во рту.

**Если вы принимаете (или принимали в последнее время) другие препараты, включая препараты, продаваемые без рецепта врача, или пищевые добавки, необходимо сообщить об этом врачу или фармацевту.**

Следует обязательно проинформировать врача или фармацевта, если вы принимаете: препараты из группы ингибиторов моноаминоксидазы (антидепрессанты) или завершили их прием менее 14 дней назад, препараты из группы трициклических антидепрессантов, препараты для понижения артериального давления из группы бета-блокаторов.

**Беременность и грудное вскармливание**

Если вы беременны, полагаете, что можете быть беременны, или планируете беременность, то следует посоветоваться с врачом перед приемом препарата, так как его воздействие на данную группу населения неизвестно.

**Вождение автомашин и работа с механическим оборудованием**

Вибросил не влияет на способность водить машину или работать с механическим оборудованием.

#### 3. Как принимать препарат?

Если вы не уверены, как следует принимать препарат, то нужно проконсультироваться об этом с врачом или фармацевтом.

• Обычно препарат принимают в следующей дозировке: дети в возрасте 6-12 лет (под присмотром взрослых): 1-2 нажатия в каждую ноздрю, 3-4 раза в день.

Подростки в возрасте старше 12 лет и взрослые: 1-2 нажатия в каждую ноздрю, 3-4 раза в день.

Данный препарат не рекомендуется для использования у детей младше 6 лет.

Не следует применять Вибросил более 7 дней подряд.

Не следует превышать рекомендуемую дозировку.

**Способ применения:**

Снимите защитный колпачок. Только перед первым употреблением опробуйте дозированный спрей для носа, брызнув несколько раз в воздух. Теперь спрей готов к употреблению.

Восморкайтесь. Введите носик тубика в ноздрю и нажмите на него одним сильным нажатием, одновременно втягивая воздух. Выньте носик из ноздри прежде чем ослабить нажатие. Повторите то же действие со второй ноздрей. Верните на место защитный колпачок.

**Если по ошибке вы приняли более высокую дозу препарата, чем требуется,** или если вы проглотили препарат, немедленно обратитесь к врачу или фармацевту.

**Если вы забыли принять препарат** в установленное время, то не следует принимать двойную дозу. Примите следующую дозу препарата в обычное время.

Не следует принимать лекарство в темноте! Необходимо проверить этикетку препарата и его дозу при каждом приеме. Если вы пользуетесь очками, наденьте их перед приемом препарата.

Если у вас возникли дополнительные вопросы относительно приема препарата, обратитесь с ними к врачу или фармацевту.

#### 4. Побочные явления

Как и в случае с любым другим препаратом, прием Вибросила может вызывать побочные явления у некоторых пользователей. Не пугайтесь, читая перечень этих явлений. Возможно, что вы не испытаете ни одно из них.

**Редкие побочные явления** (встречаются с частотой 1:1000): сухость в носу, жжение в месте введения спрея.

Если какое-либо из побочных явлений усугубляется, или если вы страдаете побочным явлением, не указанным выше, вам следует проконсультироваться с врачом.

#### 5. Как хранить препарат?

• Не оравитесь! Этот препарат, как и любое другое лекарство, следует хранить в закрытом месте, не доступном для детей и (или) грудных детей. Таким образом, вы сможете предотвратить отравление препаратом. Не вызывайте рвоту без соответствующего указания врача.

• Не следует принимать препарат по истечении срока его годности (exp. date), указанного на упаковке. Сроком годности препарата является последний день указанного на упаковке месяца.

• Храните препарат при температуре ниже 30°C в защищенном от света и высоких температур месте.

• Можно использовать препарат в течение месяца со дня первого открытия упаковки.

#### 6. Дополнительная информация

• Помимо активных веществ данный препарат содержит следующие компоненты: Benzalkonium chloride, Disodium phosphate anhydrous, Citric acid monohydrate, Sorbitol, Oil of lavender terpenless, Purified water.

• Как выглядит препарат, и каково содержимое его упаковки: Вибросил является прозрачным раствором желтого цвета. Он продается в бутылках объемом 15 мл с дозированным спреем и вставляющимся в ноздрю носиком, который закрыт колпачком.

• Владелец регистрации и его адрес: «NCH Лимитед», ул. Хамефалсим 14 Петах-Тиква.

• Производитель: «Новартис Консьер Хелс», Швейцария.

• Эта инструкция была проверена и утверждена Министерством здравоохранения в январе 2015 года.

• Регистрационный номер препарата в государственном реестре лекарственных препаратов Министерства здравоохранения: 589127319