

התרופה משוקת על פי מרשם רופא בלבד.

זודיפ, טבליות

- זודיפ 10,** טבליות
לקנדיפין הידרוכלוריד 10 mg
Lercanidipine hydrochloride
- זודיפ 20,** טבליות
לקנדיפין הידרוכלוריד 20 mg
Lercanidipine hydrochloride

רכיבים אף פעילים מפורטים בסעיף 6.

קרא בעיות את העלון וע סופו ברטם השתמש בתרופה. עלולן זו מכלי מידע תמציתי על התרופה. אין של מבער הרפוא נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה עבורך. לא תעביד אותה לאחרים. היא עלולה להזיק לך, אפילו אם נראה לך כי מבער הרפוא זומה. התרופה אינה מיועדת לילדים מתחת לגיל 18.

1. למה מיועדת התרופה?

לקצור להרפואית. חוסם תעלות סידן מנגרות הידרופידיים.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- הרך בהריון או מיטיה, ושובת שאח בהריון או מתכננת בהריון או שאינך משתמשת באמצעי מניעה.
- אתה גרש (אלרגי) לחומר הפעיל או לכל אחד מהרכיבים הנופיים אשר מכלה התרופה או לתרופות אחרות מקבוצה זו כגון אמולדיפין, קנדיפין, פלודיפין, איסרדפיין, סקדיפין או לידיפין.
- הרך סובל ממחלות לב מסוימות, כשל לב, לא שלט, סימיה ברימת דם מרבה, תעוקת חזה לא יציבה (תעוקת חזה במנוחה או שגדה בהדרגה), לא עבר חדוש ימים מתהרף לב.
- הרך סובל ממחלת כבד או לקח טיהור טויל מכלי: ציקלופורין, תרופות אנטיפטוריות כגון קאקולול או מקרולול, אנטיביוטיקות משפחת האמיקולין, כגון אריתרומיצין או טריולמיצין, תרופות אנטיכולריות כגון ריטובלין.
- הרך צורך אשכוליות או מיץ אשכוליות.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

- לפני השימוש בזודיפ ספר לרופא אם: הרך סובל מבערות כבד או כליות, או אם טיהור דיאליזה.
- הרך סובל מבערות לב מסוימות אחרות, שאר טפול על זה החדרת קוצב לב או שהרך סובל מתעוקת חזה.
- נאמר לך בעבר על ידי רופא שיש לך אי כביולות לסוכרים סמימים.
- הרך גרש לחזה, כלשהו או לתרופה כלשהי.

אתה לוקח. ואם לא לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ונופיים, חזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד של ליידיע את

הרופא או הרוקח אם:
■ הרך נטל תרופות אחרות להורדת לחץ דם, כגון: חוסין (beta blockers) לקצור משופרולול, משטנים או מעכבי ACE.

- קנדיפין או אמיאודרן (לדופק מואץ)
- פנפואין או קרבומפין (לאפילפסיה)
- ברבורית הרופא עקוב אחר ערכי לחץ הדם
- ריאפמיפין (לשטר)
- רוסמידין (לכד דקה, הפרעה בעיטל וצרכת- יתר מ² 800 mg)
- מידולום (לשימור שינה)
- אסטמיטן או טרנאנדין (אלרגיה)
- דוקוסין (לטיפול בבעיות לב)
- סימבסטטין (להורדת כולסטרול)

ראה גם סעיף "אין להשתמש בתרופה אם".

שימוש בתרופה ומזון

צרכת אשכוליות או מיץ אשכוליות עלולה להגביר את השפעת זודיפ ולכן יש להימנע מלק בתרופות הטיפול.

שימוש בתרופה וצרכת אלכוהול

יש להימנע מצריכת משקאות אלכוהוליים בתקופת טיולת זודיפ היות ואלכוהול עלול להגביר השפעת זודיפ.

הריון והנקה

אין להשתמש בתרופה אם הרך בהריון, או מיטיה, ושובת שאח בהריון או מתכננת הריון או שאינך משתמשת באמצעי מניעה.

נהיגה ושימוש בתרופה עלול לגרום לסחרחורת, חולשה ועייפות, ועל-כן יש לוודא כי אין לה שפעה זו עלך לפני ביצוע פעילות כגון נהיגה או הפעלת מכונות.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

תרופה זו מכלה לקטוז, אם נאמר לך בעבר על ידי רופא שיש לך אי כביולות לסוכרים מסוימים, היועץ ברופא לפני התחלת הטיפול בתרופה זו.

3. כיצד להשתמש בתרופה?

תמיד יש להשתמש לפי הוראות הרופא. עלך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח.
המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. המינון המקובל ברוב כלל הוא: טבליות אחת ליום, כאשר השתנה.

אם נבלת בעת המנה שומלצת על הרופא. ניתן להצוץ של לביולות את הטבליה עם מעט מים, עדין בבוקר, לפחות 15 דקות לפני ארוחת בוקר. אין מידע לגבי כתישה/ליעה.

התרופה אינה מיועדת לילדים מתחת לגיל 18.

בדיקות ומעקב

בדיקות הטיפול בתרופה זו יש לערוך בדיקות לחץ דם, א.ק.ג., קוצב לב.

אם נבלת בעת המנה שומלצת על הרופא. ניתן להצוץ של לביולות את הטבליה עם מעט מים, עדין בבוקר, לפחות 15 דקות לפני ארוחת בוקר. אין מידע לגבי כתישה/ליעה.

כטעות בלע לך מן התרופה, עלך לפנות מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים, ולהביא אריזת התרופה איתך.

אם שכחת לטיוול תרופה זו בזמן קוצב, דלל על המנה שנשכחה וטול את המנה הבאה בזמן. יש להמנע אופן אי לטיוול שתי מנות יחד. יש לשימוש בטיוול לפי שהומלץ על הרופא.

גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא או הרוקח.

אם אתה מפסיק את השימוש בתרופה לחץ הדם שלך עלול לעלות שוב.
אין לטיוול תרופות בחושיין בזקת הוותית והמנה בכל פעם שהינך נטול תרופה, הרבב את השימוש עם הרך קוצב לרם.
אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

ככל מכל תרופה, השימוש בזודיפ עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אין תיבה למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן לא תסבול מרף אחת מהן.

יש לפנות מיד לרופא בהופעות:

- תופעות לוואי נדירות (תופעות שמופיעות 1-10 אח מהמשתמשים מתוך 10,000);
- תעוקת חזה (כאב חזה עקב מחסור באספקת הדם ללב).
- תופעות לוואי נדירות מאוד (תופעות שמופיעות כפחות מששתם אחד מתוך 10,000); נפילה בלחץ דם, כאב בחזה, עלפון ותגובה אלרגית (עלולים להופיע כסמימים כגון: גרד, פריחה, חולת).

בחולים עם תעוקת חזה, תרופות מקבוצה זו עלולות להעלות את הדריות, משך או חמורת ההתקלה. נצפו מקרים בודדים של אוטם שריר הלב.

תופעות לוואי נוספות:

- תופעות לוואי שאינן שיכיות (תופעות שמופיעות 1-10 אח מהמשתמשים מתוך 1,000); כאב ראש, סחרחורת, דפיקות לב או דופק רפואי (פלפטטיות), האדמה, פתאומית של הפנים, הצוואר או החזה, נפחות בקרסוליים.
- תופעות לוואי נדירות: הפרעות בעיטל חסיקולות, קאשי עיכול, צרבת, שלש, בחילה, הקאה נאב בטן, שינויות, חולשה, עייפות, פריחה, השתנה מרובה, כאבי שרירים.
- תופעות לוואי נדירות מאוד: התפתחות ההנטיים, שינויים בתפקוד הכבד (הנראים בבדיקות מעבדה), עלייה בתדירות השלת השתן.

אם הופיעה תופעה לוואי או אחת מתופעות הלוואי המפורטות, אם אתה סובל מתופעות לוואי שלא צוינו בעלון, או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית, עלך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד

בריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי". עקב תרופת" שמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המיון לדיווח על תופעות לוואי: "על ניכס לקישור":
<https://forms.gov.il/globaldata/getsequence?getsequence=AdversEffectMedic.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלה לילדים ולכל החיה אחרת של לשומר במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או חיות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אין לגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date). המופיע על גבי האריזה. שאר התפוגה מתייחס ליום האחרון של חיי חודש.
- אין לאחסן בטמפ' העולה על 25°C. אחסן באריזה מקורית.

6. מידע נוסף

נופל על החומר הפעיל התרופה מכלה גם: microcrystalline cellulose, lactose monohydrate, sodium starch glycolate, povidone, hypromellose, magnesium stearate, titanium dioxide, macrogol 6000, talc, ferric oxide.

- כל טבליה של זודיפ 10 מכלה: כ- 29 מ"ג לקטוז.
- כל טבליה של זודיפ 20 מכלה: כ- 57 מ"ג לקטוז.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:
זודיפ 10 מ"ג: טבליות אובות, עגולות, מצופות עם קן חצייה בצד אחד.
דגלי אריזה מאשורים: 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 100

זודיפ 20 מ"ג: טבליות ורודות, עגולות, מצופות עם קן חצייה בצד אחד.
דגלי אריזה מאשורים: 7, 10, 14, 28, 30, 35, 42, 50, 56, 98, 100

יתכן שכל דגלי האריזה שמופיעים. עלון זה נבדק ואושר על ידי משרד הבריאות בתאריך: 01.2016

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:
זודיפ 10 מ"ג, טבליות: 29303 139
זודיפ 20 מ"ג, טבליות: 30881 100 24

לשם הפילוט והלקחת הקריאה, עלון זה נטח בשלש זכר על קף זאת, התרופה והמידע בעלון מיועדים לבני שמינים.

בצל רישום: **דקסק® בט"ם**
ר"ח דקסל 1, אור-עקיבא 3060000, ישראל