

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة

(مستحضرات) - ١٩٨٦

يسوق الدواء بدون وصفة طبيب

تامس عيار عادي بطعم النعنع

أقراص للمضغ

كل قرص يحتوي على كاربونات الكالسيوم ٥٠٠ ملغ (مما يوفر ٢٠٠ ملغ من الكالسيوم في القرص)

Calcium Carbonate 500 mg (elemental calcium 200 mg)

كل قرص يعادل ١٠ ميلي مول من مكافئ الحمض.

قائمة المركبات الإضافية مفصلة في الفقرة ٦.

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء. تحتوي

هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة

إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

١) لأي غرض مخصص الدواء؟

لتخفيف الحرقان والحموضة في المعدة.

الفصيلة العلاجية: من مضادات الحموضة.

٢) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء:

• إذا كنت حساسا (أليرجي) لكاربونات الكالسيوم أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (مفصلة في الفقرة ٦)

• لدى معالجين لديهم فائض من الكالسيوم في الدم (فرط كالسيوم الدم) أو فائض من الكالسيوم في البول (فرط كالسيوم البول)

• لدى معالجين متبعين لحمية فقيرة الفوسفات

• لدى معالجين ذوي مشاكل في نشاط الغدد نظيرة الدرقية

• لدى معالجين لديهم مشاكل في الكلى (مثل حصى في الكلى)

• لدى معالجين مصابون بمتلازمة زولينغر-إليسون

• لدى معالجين يتلقون ديجوكسين لأمراض القلب.

لا يجوز إستعمال الدواء بدون إستشارة الطبيب قبل بدء

العلاج:

• لدى أطفال دون عمر ١٢ سنة

• إذا كنت تعاني من السكري (يحتوي الدواء على السكر).

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في

ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحك للطبيب

أو الصيدلي عن ذلك. بالأخص إذا كنت تتناول:

مدرات بولية من نوع تيازيدات، بيسفوسفونات لعلاج تخلخل

العظام، تتراسيكلينات وسيپروفلوكساسين (مضادات حيوية).

يوصى الإنتظار ٢-٣ ساعات بين تناول هذا الدواء وبين تناول

أدوية أخرى عن طريق الفم.

الحمل والإرضاع

يجب إستشارة الطبيب أو الصيدلي قبل إستعمال الدواء. أنظري

الفقرة ٣ 'الجرعة الدوائية الإعتيادية'.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

يحتوي الدواء على سكريات. إذا قيل لك من قبل طبيبك بأنك تعاني من

عدم تحمل لسكريات معينة، راجع طبيبك قبل تناول هذا الدواء.

٣) كيفية إستعمال الدواء؟

عليك الإستيضاح من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن واثقاً.

الجرعة الدوائية الإعتيادية لدى الكبار والأطفال فوق

عمر ١٢ سنة هي:

أمضغ ٢-٤ أقراص عند ظهور الأعراض، أو بحسب توصية

الطبيب.

لا يجوز تناول أكثر من ١٥ قرصاً خلال ٢٤ ساعة.

إذا كنت في فترة الحمل، فلا يجوز تناول أكثر من ١٠ أقراص خلال

٢٤ ساعة.

لا يجوز إستعمال الجرعة الدوائية العظمى لفترة تتجاوز الأسبوعين،

إلا بتوصية وبمراقبة من طبيبك.

لا يجوز إستعمال الدواء إذا إستمرت الأعراض لأكثر من أسبوعين،

إلا بتوصية من الطبيب.

لا يجوز تجاوز الجرعة الدوائية الموصى بها

الدواء غير مخصص للأطفال دون عمر ١٢ سنة.

إذا تناولت جرعة دوائية مفرطة أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء،

توجه حالاً للطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر عبوة

الدواء معك. لا تتناول الأدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء

والتأكد من الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع

النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشر الطبيب

أو الصيدلي.

٤) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال تامس قد يسبب أعراضاً جانبية عند بعض

المستعملين. لا تتدهش من قائمة الأعراض الجانبية.

من الجائز ألا تعاني أياً منها.

الأعراض الجانبية تشمل: إمساك، غازات، غثيان، تجشؤات.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم إحدى الأعراض الجانبية، أو عندما

تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة

الطبيب أو الصيدلي.

٥) كيفية تخزين الدواء؟

• تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء في مكان مغلق بعيداً عن مجال رؤية ومتناول أيدي الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

• لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العبوة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

• يجب التخزين دون ٣٠ درجة مئوية.

٦) معلومات إضافية

• يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً -

Sucrose (as confectioner's sugar), starch, talc, mineral oil, flavor, sodium polyphosphate.

• كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة - قنينة بلاستيكية تحتوي على ٧٥ أو ١٥٠ قرصاً للمضغ. القنينة مغلقة بسدادة داخلية وبغطاء. كذلك، متوفر بعبوة ذات ٣ إسطوانات تحتوي ١٢ قرصاً كل واحدة (إجمالي ٣٦ قرصاً).

من الجائز ألا تسوق كافة أحجام العبوة.

• صاحب الإمتياز:

چلاكسو سميثكلين (إسرائيل) م.ض.،

شارع بازل ٢٥، بيتح تكفا.

• المنتج:

چلاكسو سميثكلين كونسيومر هيلث كير، L.P.

سانت لويس، الولايات المتحدة.

• أقرت وزارة الصحة صيغة هذه النشرة ومحتواها فُحص ورُخص

في تاريخ: تشرين الثاني ٢٠١٤.

• رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

٢٢٢٧٨-٠٣-١٠٧

• من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة

بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا

الجنسين.