

أكسيليون لصقة ٥

أكسيليون لصقة ١٠

أكسيليون لصقة ١٥

لصقة جلدية للاستعمال عن طريق الجلد

المادة الفعالة:

كل لصقة تحتوي على:

إكسيليون لصقة ٥: لصقة بقياس ٥ سم^٢ للإستعمال عن طريق الجلد تحوي ٩ ملغ ريفاستيجمين (Rivastigmine). معدل تحرير الدواء هو: ٤,٦ ملغ في ٤٤ ساعة.

إكسيليون لصقة ١٠: لصقة بقياس ١٠ سم^٢ للإستعمال عن طريق الجلد تحوي ١٨ ملغ ريفاستيجمين (Rivastigmine). معدل تحرير الدواء هو: ٩,٥ ملغ في ٤٤ ساعة.

إكسيليون لصقة ١٥: لصقة بقياس ١٥ سم^٢ للإستعمال عن طريق الجلد تحوي عن طريق الجلد تحوي ٢٧ ملغ ريفاستيجمين (Rivastigmine). معدل تحرير الدواء هو: ١٣,٣ ملغ في ٤٤ ساعة.

المواد غير الفعالة:

أنظر الفقرة ١ 'معلومات إضافية'.

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفر لديك أي أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي. وصف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطيه للأخرين. فهو قد يضرهم حتى لو بدا لك أن مرضهم مشابه لمرضك.

١) لأي غرض مخصوص الدواء؟

إكسيليون لصقة ٥ وإكسيليون لصقة ١٠: لعلاج مشاكل الذاكرة الخفيفة حتى المتوسطة والخرف (dementia) لدى مرضى الزهايمر.

إكسيليون لصقة ١٥: لعلاج مشاكل الذاكرة الخفيفة حتى الشديدة والخرف (dementia) لدى مرضى الزهايمر.

لدى مرضى لديهم خرف نتيجة مرض الزهايمر، تموت خلايا عصبية معينة في المخ، الأمر الذي يؤدي إلى مستويات منخفضة للموصل العصبي أسيتيل كولين (AChE) التي تسمح بالتواصل بين خلايا العصب.

يعمل ريفاستيجمين عن طريق إعاقة الإنزيمات المفكرة للأسيتيل كولين:

أسيتيل كولين إستيراز وبوتيريل كولين إستيراز، من خلال إعاقة هذه الإنزيمات، يتيح إكسيليون ارتفاع مستويات الأسيتيل كولين في المخ ويساعد في تقليل أعراض مرض الزهايمر.

الفصيلة العلاجية:

من مثبطات الإنزيم كولين إستيراز.

Brain selective cholinesterase inhibitor

٢) قبل إستعمال الدواء


يجوز إستعمال الدواء إذا:

- وجدت لديك حساسية مفرطة (أлерجي) لل المادة الفعالة ريفاستيجمين أو لمشتقات أخرى لكتارامات أو لمركبات الدواء الأخرى المفصلة في البند ١ 'معلومات إضافية'.
- إذا حدث لديك رد فعل جلدي الذي انتشر بما يتجاوز حجم اللصقة، إذا حدث رد فعل موضعي قوي (مثل حبوبلات، التهاب متزايد في الجلد، إنتفاخ) وإذا لم يتحسن هذا الوضع خلال ٤٨ ساعة بعد إزالة اللصقة.
- إذا كانت هذه الحالات تتطابق عليك، يجب إبلاغ الطبيب دون إستعمال المستحضر.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء:

- قبل العلاج بـ إكسيليون لصقة، إحك للطبيب: إذا وجدت لديك أعراض في الجهاز الهضمي مثل غثيان، تقيؤ وإسهال. من الجائز أن تصاب بالجفاف (فقدان كثير للسوائل) إذا استمر التقيؤ أو الإسهال.
- إذا كنت تعاني أو عانيت في الماضي من نبض غير منتظم، ضيق معدية، من صعوبات في النبول. من تشنجات. من رو أو من مرض تنفسى شديد.
- إذا كنت تعاني من رجفان. من إنخفاض في وزن الجسم (أقل من ٥٠ كغ) أو من خلل في وظيفة الكبد.
- في هذه الحالات، على الطبيب مراقبة ومتتابعة وضعك بصورة حثيثة أكثر أثناء العلاج بالدواء.
- يجب إبلاغ الطبيب حالاً إذا كان لديك إتهاب في الجلد، حبوبلات أو إنتفاخ في الجلد حيث تکبر وتتشدد.
- في حالة عدم إستعمالك إكسيليون لصقة لفترة تزيد عن ثلاثة أيام، لا يجوز تجديد لصقة اللصقة التالية بدون إستشارة الطبيب المعالج.

- (موصوف في الرسوم أدناه):
- القسم العلوي من الذراع، جانب أيسر أو أيمن، أو الصدر، جانب أيسر أو أيمن (يجب الإمتناع عن اللصق على الثدي). أو منطقة أعلى الظهر، جانب أيسر أو أيمن، أو منطقة أسفل الظهر، جانب أيسر أو أيمن، يجب الإمتناع عن اللصق في الأماكن التي يمكن فيها للصقة أن تختك وتتسقط نتيجة لباس مشدود.



عند تبديل اللصقة يجب عليك نزع لصقة اليوم السابق قبل لصقة اللصقة الجديدة في مكان آخر على الجلد (متلاً على الجانب الأيمن للجسم في اليوم الأول وعلى الجانب الأيسر في اليوم التالي). لا يجوز لصق لصقة جديدة في نفس المكان لفترة أسبوع على الأقل.


كيف يجب لصق إكسيليون لصقة؟

إن اللصقة دقيقة، غير شفافة، مصنوعة من البلاستيك وتلتصق على الجلد. كل لصقة مغلفة بكيس مغلق يحميها حتى تكون جاهزة للصقة. لا يجوز فتح الكيس أو إخراج اللصقة إلا فقط قبل الاستعمال فعلاً كل ٤٤ ساعة. يجب نزع اللصقة الحالية بلطف قبل لصق لصقة جديدة. إذا أقصقت على جسمك عدة لصقات، فإن جسمك قد يكون معرضًا لكميّة دواء زائدة، الأمر الذي قد يكون خطيراً.

- كل لصقة مغلفة بكيس مغلق يحميها.
- يجب فتح الكيس فقط عندما تكون جاهزة للاستعمال اللصقة.
- يجب تمزيق أو قص الكيس على طول الخط المنقط وإخراج اللصقة.



- هناك طبقة تحمي الطرف اللاصق للصقة.
- يجب نزع طرف واحد من الطبقة الواقية وعدم ملامسة القسم اللاصق للصقة بالأصبع.



- يجب وضع القسم اللاصق للصقة على المنطقة العليا أو السفلية من الظهر، في القسم العلوي من الذراع أو على الصدر ومن ثم نزع القسم الثاني للطبقة الواقية.



- الآن يجب الضغط على اللصقة بشدة لمدة ٣٠ ثانية على الأقل بمساعدة كف اليد من أجل التأكد من إلتصاق كل الأطراف كما ينبغي.



إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخرًا أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب وإضافات غذائية، إحك للطبيب أو للصيدلي عن ذلك.

لا يجوز إستعمال إكسيليون لصقة سوية مع: أدوية ذات تأثير مشابه (أدوية ذات تأثير كوليبي).

أدوية مضادة لفراز الكوليدين (مثل الأدوية لتخفيف تشنجات أو تقلصات المعدة، لعلاج مرض الباركيتنيسون أو لمنع «مرض دوار السفر»)

لا يجوز إستعمال إكسيليون لصقة بصورة متزامنة مع ميتووكلوراميد (دواء يستعمل لتخفيف أو لمنع الغثيان والتقيّبات). من الجائز حدوث تأثيرات إضافية كتضليل الأطراف وإرتجاف الددين

إذا كنت على وشك إنجاز عملية جراحية أو أي نشاط منوط بتخدير يجب إبلاغ الطبيب المخدر عن إستعمال هذا الدواء، حيث أن إكسيليون لصقة قد تزيد خلال التخدير من تأثير مرحيات عضلية معينة.

يجب اتخاذ جانب الحذر عند إستعمال إكسيليون لصقة بالتزامن مع حاجيات بيتكا (أدوية مثل أتبولول المستعملة لعلاج ارتفاع ضغط الدم، الذبحة الصدرية وحالات قلبية أخرى). من الجائز حدوث تأثيرات إضافية مثل براديكارديا (نبض بطيء) حيث قد تسبب إغماء (فقدان الوعي)

إستعمال إكسيليون لصقة والطعم ليس هناك تأثير للخداء أو الشراب على إكسيليون لصقة. لأن المادة الفعالة ريفاستيجمين تمتص إلى جهاز الدم عن طريق الجلد.

٣) الأطفال والمراهقين
إكسيليون لصقة غير مخصص للاستعمال لدى الأطفال.

الحمل والإرضاع

إذا كنت في فترة الحمل، على الطبيب تقييم الفوائد د إكسيليون لصقة مقابل التأثيرات الممكنة على الجنين.

يجب إبلاغ الطبيب إذا كنت حاملًا أو تخططين للحمل لا يجوز الإرضاع أثناء العلاج بـ إكسيليون لصقة.

يجب إستشارة الطبيب أو الصيدلي قبل تناول أي دواء خلال الحمل أو أثناء الإرضاع.

السيارة واستعمال الماكولات

عليك إستشارة الطبيب إذا كان مرضك يسمح لك بقيادة السيارة وتشغيل ماكولات بصورة آمنة وممارسة أي نشاطات أخرى تتطلب البقاء. من شأن إكسيليون لصقة أن يسبب الدوار والمبلل إلى النوم، خاصة عند بدء العلاج أو عند زيادة المقدار الدوائي. إذا كنت تشعر بدوافع أو نعاس، يجب الإمتناع عن قيادة السيارة أو تشغيل ماكولات أو ممارسة أي نشاطات تتطلب البقاء.

٣) كيفية إستعمال الدواء؟

يجب الإستعمال حسب تعليمات الطبيب دائمًا. عليك الإستياضاح من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً. المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.

بعد العلاج والإشراف عليه يتمان من قبل طبيب ذو خبرة بتشخيص وعلاج الخرف بمرض الزهايمر. يجب إجراء تشخيص حسب توجيهات آئية. كما هو عليه في كل عملية بدء علاج بمعالجين مصايبين بخرف. يجب بدء العلاج بـ ريفاستيجمين فقط إذا وجد معالج جاهز لإعطاء ومراقبة متظمين للعلاج.

كم عدد لصقات إكسيليون يجب لصقها؟

هام: يجب إستعمال لصقة واحدة فقط كل مرة. يجب نزع لصقة اليوم السابق قبل لصقة اللصقة الجديدة. لا يجوز قص اللصقة إلى قطع.

كيف يتم بدء العلاج؟

يشير لك طبيبك أي لصقة إكسيليون الأكثر ملائمة لك. يبدأ العلاج عادة بإستعمال لصقة إكسيليون ٥ ملغ في ٤٤ ساعة. المقدار الدوائي اليومي المعتمد هو لصقة إكسيليون ١٠ ملغ في ٤٤ ساعة، إذا كان التحمل جيداً. فيمكن للطبيب أن يرفع المقدار الدوائي إلى لصقة إكسيليون ١٥ ملغ في ٤٤ ساعة.

يجب إستعمال لصقة واحدة فقط كل مرة وتبدل اللصقة بلصقة جديدة بعد ٤٤ ساعة.

من الجائز أن يلائم لك الطبيب المقدار الدوائي أثناء العلاج ليناسب إحتياجاتك الشخصية.

في حالة عدم إستعمالك إكسيليون لصقة لفترة تزيد عن ثلاثة أيام، لا يجوز تجديد لصقة اللصقة التالية بدون إستشارة الطبيب المعالج.

أين يجب لصق إكسيليون لصقة؟

قبل لصق إكسيليون لصقة يجب التأكد من أن الجلد:

- نظيف، جاف، وبدون شعر
- خال من أي مسحوق، زيت، مترطب (كريم الترطيب) أو غسول (التي يمكنها أن تؤثر على التصاق اللصقة للجلد بصورة سليمة)
- بدون جروح، طفح، وأو تهيجات

- كل ٤٤ ساعة، يجب نزع اللصقة الحالية بلطف قبل لصق لصقة جديدة.
- إذا أقصقت على جسمك عدة لصقات، فإن جسمك قد يكون خطيراً.
- يجوز لصق لصقة واحدة فقط في اليوم، في أحد الأماكن التالية فقط

