

الكوسبيت

محلول

التركيب:

المادة الفعالة والتركيز:

جلوكونات كلورهكسيدين ٠.٥٪

(Chlorhexidine gluconate 0.5%)

(Alcohol 70%)

كحول ٧٧٪

لائحة المواد غير الفعالة: انظر البند ١
معلومات إضافية:

اقرأ النشرة بامان حتى نهايتها قبل استعمال

الدواء.

تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء.

إذا كانت لديك استثناء إضافية، توجه إلى الطبيب أو إلى

الأخصائي.

عليك استخدام المستحضر بشكل صحيح.

استشر صيدليًا إذا كنت بحاجة إلى معلومات إضافية.

١. لماذا معد الدواء؟

الدواء معد لتطهير الجلد.

الفصيلة العلاجية

مصنوعات تطهير.

٢. قبل استخدام الدواء

منع استخدام الدواء:

إذا كانت لديك حساسية للمادة الفعالة أو لأي من

المكونات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء، لائحة

المواد غير الفعالة انظر البند ١

معلومات إضافية".

عن الأنسجة الدماغية، غشاء المخ والأذن

الوسط.

هذا الدواء ليس مخصصاً للرضع دون عمر شهرين.

٣. خذيرات خاصة متعلقة باستخدام الدواء

• يجب الامتناع عن ملامسة العينين، في حال الملasseة،

يجرب القليل باستخدام الكثير من الماء.

• إذا كانت لديك حساسية لطعم أو دواء أيًا كان، عليك

ابلاغ الطبيب قبل تناول الدواء.

• لا يشكل استخدام المستحضر بديلاً لللقفازات المغمقة.

• يمنع اشعال سيجارة أو التعرض للنار قبل جفاف المستحضر بشكل تام.

٤. إذا كنت تتناول، أو تتناول مؤخرًا، أدوية أخرى، بما فيها أدوية دون وصفة طبية ومكمّلات غذائية، أخبار الطبيب أو الصيدلي بذلك.

معلومات هامة عن قسم من مكونات الدواء يحتوي على الكحول، مادة قابلة للاشتعال.

٣. كيف تستخدم الدواء؟

عليك أن تقصص مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متاكلاً.

لا تتجاوز الجرعة الدوائية الموصى بها.

يمنع الابتلاع، الدواء معد لاستخدام الخارجي فقط.

طريقة الاستعمال:

يجب تنظيف المنطقة المعدة للتقطير بقطن طبي منقوص بالكوسبيت سائل كل مرة يُطلب فيها ذلك.

إذا أفرغت في استعمال الجرعة الدوائية أو إذا أبتلع الولد بالخطأ من هذا الدواء، توجه حالاً إلى الطبيب أو إلى عيادة الطوارئ التابعة للمستشفى مصطحبًا معك عينة الدواء.

لا تتناول الدواة في الظلمة؛ افحص الاصقة والوجبة في كل مرة تتناول فيها الدواء. استخدم النظارات إذا كنت تتحمّلاها.

إذا كانت لديك استثناء آخر فيما يتعلق باستخدام الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

٤. الأعراض الجانبية:

مثل أي دواء، يمكن أن يسبب استخدام الكوسبيت أعراضًا جانبية لدى بعض المستخدمين. لا تفزع لدعي قراءة قائمة الأعراض الجانبية. فقد لا تعلمي من أي منها.

٥. يجب التوقف عن الاستخدام والتوجه للطبيب:

• في حالة حدوث حساسية في الجلد (نادر)

• في حالة حدوث حكة أو انفاسة متواصلين (نادر)

٦. أعراض جانبية أخرى:

طفح جلدي، أحمرار، وإثارة موضعية.

إذا تفاقم أي من الأعراض الجانبية، أو حين تعلمي من عارض جانبي لم يذكر أعلاه، عليك استشارة الطبيب.

٧. الأعراض الجانبية لدى الأولاد:

على الوالدين الاتباع للطبيب المعالج بأي عارض جانبي، وكذلك بباقي دواء آخر يتناولونه الولد. انتظر أعلاه تفصيل الأعراض الجانبية الخاصة.

الإبلاغ عن الأمراض الجانبية
يمكن إبلاغ وزارة الصحة عن الأعراض الجانبية عبر
الإسماء الإلكترونية للتخلص عن أمراض جانبية.
الموجودة في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة:
www.health.gov.il

٥. كيف يجب تخزين الدواء؟

• امنع التسليم: يجب حفظ هذا الدواء وأي دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال وأداً الرضيع، وذلك لتفادي التسليم. لا تسبب التغير دون تعليمات سريحة من الطبيب.

• يمنع استخدام الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. Date) المأهول على الدبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية هو اليوم الأخير من الشهر المفترض عليه.

• احفظه في درجة حرارة الغرفة، في درجة حرارة تقل عن ٢٥ درجة مئوية.

• أغسله بأحكام، وامنع تسرب الهباء والرطوبة.

• تخزينه ماءة قابلة للاشتعال، أبعد عن النار!

• احفظه في العبوة الأصلية.

• يمكن استخدام المنتج بعد فتحه، حتى تاريخ انتهاء الصلاحية.

٦. معلومات إضافية

فضلًا عن المواد الفعالة، يحتوي الدواء أيضًا على Tartrazine, Purified water

كيف يبدو الدواء، وماذا تحتوي العبوة
 محلول كحولي بلون أصفر.

المحتوى: ١٠٠ مليلتر، ٣٠٠ ملilitر، ٥٠٠ ملilitر،
١٠٠٠ ملilitر.

٧. المنشق وصاحب التسجيل:

بن شمعون فلوريش. م.ض.، المنطقة الصناعية
مسفاف، بريد متجر. مسافاف ٢٠١٧٤٠٠.

فحصت هذه النشرة وصادقت عليها وزارة الصحة
باتاريخ: ٣١.٢٠٢٠١٥.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة
الصحة: ١٢٩٦٧٣٠٨٦٠٠

من أجل تيسير وتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه
النشرة بصيغة المذكر. رغم ذلك، فهي موجهة إلى
أبناء الجنسين على حد سواء.