

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ז - 1986

התרופה משווקת ללא מרשם רופא

אלכוספט

תמיסה

הרכב:

החומרים הפעילים וריכוזם:
כלורהקסידין גלוקונט 0.5%

(Chlorhexidine gluconate 0.5%)
אלכוהול 70% (Alcohol 70%)
לרשימת החומרים הבלתי פעילים:
ראה סעיף 6 "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.

עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש
לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
עליך להשתמש בתכשיר בצורה נכונה. היוועץ
ברוקח אם הנך זקוק למידע נוסף.

1. למה מיועדת התרופה?

התרופה מיועדת לחיטוי העור.

קבוצה תרפויטית - תכשירים אנטיספטיים.

2. לפני שימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה:

- אם אתה רגיש (אלרגי) לחומרים הפעילים או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה. לרשימת החומרים הבלתי פעילים - ראה סעיף 6 "מידע נוסף".
- על רקמות המוח, קרום המוח והאוזן התיכונה.
- בתינוקות מתחת לגיל חודשיים.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש

בתרופה:

- יש להימנע ממגע עם העיניים.
- במקרה של מגע, יש לטוֹפֵף עם הרבה מים.
- אם הנך רגיש למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עליך להודיע על כך לרופא לפני נטילת התרופה.
- השימוש בתכשיר אינו מהווה תחליף לכפופות טוטורילית.

• אין להדליק סיגריה או להיחשף לאש עד ייבוש מוחלט של התכשיר.

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם. ותוספי תזונה, סופר על כך לרופא או לרוקח.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה מכיל אלכוהול, חומר דליק.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח.

אין לעבור על המנה המומלצת.

אין לבלוע.

התרופה מיועדת לשימוש חיצוני בלבד.

אופן השימוש:

יש לנגב את האזור המיועד לחיטוי בצמר גפן ספוג באלכוספט נוזלי כל פעם שנדרש. אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא ארזית התרופה איתך.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התוויות והמנה בכל פעם שהנך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם. אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי:

כמו בכל תרופה, השימוש באלכוספט עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

יש להפסיק את השימוש ולפנות לרופא:

- במקרה של רגישות בעור (נדיר)
- במקרה של גירוי או נפיחות מתמשכים (נדיר)

תופעות לוואי נוספות:

פריחה, אדמומיות וגירוי מקומי. אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעות לוואי שלא הזכרנה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

תופעות לוואי בילדים:

על ההורים לדווח לרופא המטפל על כל תופעות לוואי וכן על כל תרופה נוספת הניתנת לילד. ראה לעיל תופעות לוואי מיוחדות שפורטו.

דיווח על תופעות לוואי:

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות הטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות www.health.gov.il

5. איך לאחסן את התרופה:

מנע הרעלה!

תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך מנעו הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

• אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה.

• תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

• אחסן במקום קריר, בטמפרטורה הנמוכה מ-25°C.

• גמור היטב ומנע חדירת אוויר ורטיבות.

• זהירות חומר דליק, הרוקח מאש.

• אחסן באריזה המקורית.

• ניתן להשתמש במוצר לאחר הפתיחה, עד ששג תוקפו.

6. מידע נוסף:

נוסף על החומרים הפעילים התרופה מכילה גם Tartrazine, Purified water

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

תמיסה אלכוהולית בצבע צהוב.
תכולה: 100 מ"ל, 300 מ"ל, 500 מ"ל, 1000 מ"ל.

היצרן ובעל הרישום:

בן-שמעון פלוריש בע"מ, פארק תעשייה משגב, ד.ב. משגב 2017400.

פורמט עלון זה נבדק ע"י משרד הבריאות

ותוכנו אושר על ידו בתאריך: 2015.02.11

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 129 67 30806 60

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

