

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدالة (مستحضرات) ١٩٨٦
يُسوق الدواء وفق وصفة طبيب، فقط

أكنيميسين

محلول للاستعمال الجلدي – للاستعمال الخارجي
١٠ غرامات محلول / ٠,٢ غرام إريثروميسين

التركيب:

المادة الفعالة وتركيزها –

١٠ غرامات محلول للدهن على الجلد تحتوي على إريثروميسين ٢,٠ غرام Erythromycin 0.2g

المواد غير الفعالة والمثيرة للحساسية: أنظر البند "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها، وذلك قبل البدء باستعمال الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية فتوجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي.

وصف هذا الدواء لك لعلاجك. لا تعطه لاستعمال الآخرين؛ لأنه قد يضرّ بهم، حتى لو بدا لك تشابه بين مرضك ومرضهم.

١. لم أعد هذا الدواء؟

علاج مضاد حيويّ خارجيّ لحبّ الشباب (العُد) بجميع أشكاله، وخصوصًا الأشكال الالتهابية المصحوبة بالحطاطات والبثرات.

المجموعة العلاجية: إريثروميسين – مضاد حيويّ من عائلة الماكروليدات.

٢. قبل البدء باستعمال الدواء

X يُمنع استعمال الدواء إذا:
وُجدت لديك حساسية للمادة الفعالة أو لأحد المركبات الأخرى التي يحتويها الدواء، المواد غير الفعالة تظهر في البند "معلومات إضافية".

! تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال الدواء

قبل بدء العلاج بأكنيميسين، أعلم الطبيب إذا:

- إذا كانت لديك حساسية لنوع معين من الطعام أو العقاقير
المواد المؤكيدة والماء تُضرّ بكفاءة المستحضر.

يُمنع إشعال سيجارة أو التعرض لمصدر نار حتى جفاف المستحضر بشكل تام.

إذا كنت تتناول أو تناولت، مؤخرًا، أدوية أخرى، بما في ذلك الأدوية بدون وصفة طبية والمكملات الغذائية، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك.

الحمل والإرضاع

إذا كنت حاملًا، أو إذا كنت مرضعًا يجب أن تستشيري الطبيب أو الصيدلي قبل استعمال الدواء.

٣. كيف تستعمل الدواء؟

يجب استعمال الدواء حسب تعليمات الطبيب، دائمًا. يجب عليك أن تفحص مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا.
الجرعة وطريقة العلاج سيحددهما الطبيب، فقط.
الجرعة المُتبعة، عادة، هي: الدهن المباشر على مناطق الجلد المصابة، مرتين في اليوم.

يُمنع تجاوز الوجبة الموصى بها.

البلع ممنوع. للاستعمال الخارجي، فقط.

طريقة الاستعمال:

تعليمات الفتح – في الطرف العلويّ لقارورة المستحضر يوجد مطباق؛ حيث يُمكن بمساعدته دهن المستحضر على الجلد مباشرة.

قبل استعمال المستحضر أول مرة، يجب فصل الغطاء الملولب، قلبه، والضغط بمساعدته في اتجاه الأسفل، بصورة ضدية للمطابق (كما يظهر في الصورة).

ومن خلال ذلك سيفتح صمام الأمان وسيصبح بالإمكان استعمال المستحضر.



العلاج بمساعدة أكنيمايسين لن يستمر أكثر من ٤ - ٦ أسابيع.

إذا لم يطرأ تحسن على حالتك يجب التوجه إلى الطبيب.

إذا تناولت جرعة إضافية أو إذا قام طفل بابتلاع كمية من الدواء عن طريق الخطأ فتوجه، فوراً، إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى، وأحضر علبه الدواء معك.

يجب الاستمرار في تناول الدواء حسب توصية الطبيب. قم باستشارة الطبيب إذا كنت ترغب بالتوقف عن العلاج.

كيف في إمكانك أن تساعد في نجاح العلاج؟

خلال العلاج، من المفضل الامتناع عن استخدام مواد تجفف الجلد، كما أنه من المفضل الامتناع عن شطف الأماكن المصابة في أحيان متواترة، وذلك من أجل منع الجفاف في الجلد ومفاومة وضعه بالإضافة إلى ذلك، يجب الانتظار مدة ساعة من الزمن على الأقل، بين دهن هذا الدواء ودهن أدوية أخرى، أو استعمال مستحضرات أخرى، مثل: مستحضرات التجميل، العطور، الصوابين، كريم الحلاقة، ماء الحلاقة، وما شابه.

يُمنع تناول الدواء في الظلام! تحقق من المصق على الدواء ومن الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا كانت لديك أسئلة إضافية بالنسبة إلى استعمال الدواء فاستشير الطبيب أو الصيدلي.

٤. الأعراض الجانبية

كجميع الأدوية، قد يسبب استعمال أكنيمايسين أعراضاً جانبية لدى قسم من متناولي الدواء. لا تصدم عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. من المحتمل ألا تعاني من أي منها.

يجب التوجه إلى الطبيب فوراً، في حال أن الأعراض الجانبية التالية، النادرة جداً، ظهرت:

- فرط جفاف الجلد
- احمرار الجلد
- تهيج موضعي (الشعور بالحكة والوخز)
- تقشر الجلد بكثرة
- الطفح في مكان العلاج

إذا ظهر عارض جانبي، إذا تقادم أحد الأعراض الجانبية، أو إذا عانيت من أعراض جانبية غير مذكورة في النشرة، فعليك استشارة الطبيب.

من الممكن تبليغ وزارة الصحة عن أعراض جانبية من خلال الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية نتيجة علاج بالأدوية" الموجود على الصفحة الرئيسية في موقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يحوّلك إلى إستمارة خاصة معدة للتبليغ عن الأعراض الجانبية، أو عبر دخول الرابط التالي:

<https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il>

٥. كيف يُخزن الدواء؟

- تتجنّب التسمّم! يجب حفظ هذا الدواء، وكلّ دواء آخر، في مكان مغلق، بعيداً عن متناول أيدي الأولاد و/أو الأطفال، وهكذا تتجنّب التسمّم. لا تسبّب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- يُمنع استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على ملصق العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية يُنسب إلى اليوم الأخير في الشهر.
- شروط الخزن: احفظ في درجة حرارة تحت الـ 25°C.
- عمر الخزين بعد الفتح الأول للقارورة:
يُمنع استعمال هذا الدواء لأكثر من 6 أشهر من لحظة فتح القارورة.

احذر! مادة قابلة للاشتعال، أبعد عن النار!

٦. معلومات إضافية

بالإضافة إلى المادة الفعّالة، يحتوي الدواء، أيضاً:

9.25g ethanol anhydrous, lauryl polyglycol phosphate, glycerol, povidone.

كيف يبدو الدواء وماذا تحوي العبوة:

محلول أكنيميابين هو محلول صافٍ، لا لون له.

تحتوي رزمة الكرتون على قارورة تحتوي على ٢٥ مل محلول أكنيميابين.

صاحب التسجيل وعنوانه: نيوفارم م.ض.، ص.ب. ٧٠٦٣، بيتاح تيكفا، ٤٩١٧٠

رقم الفاكس: ٠٣-٩٣٧٣٧٧٤-٠٣ عنوان البريد الإلكتروني: drugsafety@neopharmgroup.com

اسم المنتج وعنوانه: ألميرال هيرمل م.ض.، ألمانيا.

تمّ فحص هذه النشرة والتصديق عليها من قبل وزارة الصحة في تاريخ: ٠٣/٢٠١٦.

رقم تسجيل الدواء في سجلّ الأدوية الرسمي في وزارة الصحة: ٠٦٤,٧٠,٢٢٦٥٣

لتبسيط قراءة هذه النشرة وتسهيلها ورد النصّ بصيغة المذكّر. مع هذا فالدواء معدّ لكلا الجنسين.