

חומר פעיל וכמותו ביחידת מינון:

טרבינאפין 10 מ"ג / גרם Terbinafine 10 mg/g

לרשימת החומרים הבלתי פעילים ולארגונים בתכשיר – אנא ראה סעיף 6. **קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.** עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

התרופה מיועדת למטופלים מעל גיל 12, מתחת לגיל זה יש להתייעץ ולפנות לרופא.

עלך להשתמש בצורה נכונה. היועץ ברוקח אם היך זקוק למידע נוסף. עלך לפנות אל הרופא באם סימני המחלה (סימפטומים) מחמירים או אינם משתפרים לאחר 4 שבועות.

1. למה מיועדת התרופה

התרופה מיועדת לטיפול בפרטת העור.

קבוצה תרופית: אנטי פטרית לשימוש מקומי.

2. לפני שימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

התכשיר מיועד לשימוש חיצוני בלבד, ויש להמנע ממגע עם העיניים. במידה יש מגע עם העיניים, יש לשטוף היטב במים.

יש להשתמש בהירות על פצעים פתוחים היות והתכשיר מכיל אלכוהול שעלול לגרום לגירוי.

אין למרוח התכשיר על הפנים.

לפני הטיפול בלמיסיל דרמג'ל ספר לרופא אם:

הפטרט מחמור או כשש פטרטל ביציפורניים.

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

הריגון והנקה

אם הנך בהריון או מניקה יש להיוועץ ברופא לפני השימוש בלמיסיל דרמג'ל.

נהיגה ושימוש במכונית

ללמיסיל דרמג'ל אין השפעה על היכולת לנהוג ולהפעיל מכונית.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

למיסיל דרמג'ל מכיל אלכוהול העלול לגרום לגירוי על פצעים פתוחים.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עלך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח.

המינון המוקבל בדרך כלל הוא:

פטרט כף הרגל, פטרט המפשעה, פטרט הגוף – למרוח פעם ביום למשך שבוע ימים.

פיטיריאסיס וריסקולור – למרוח פעם ביום, למשך שבוע ימים.

יש לרוחן ולייבש בייסודיות את האזור הנגוע לפני כל מריחה של התרופה. יש לטווח את התכשיר בעדינות על האזור הנגוע ומסביבו.

המידה והטיפול הינו בקפלי עור, ניתן לכסות האזור בחבישת גזה, במיוחד בלילה. יש להחליף הגזה בכל מריחה.

אין לעבור על המנה המומלצת.

אם יש לך שיפור במצבך מעל גיל 12.

יש לחל שיפור במצבך תוך 4 שבועות יש לפנות לרופא.

יש למרוח את הג'ל למשך התקופה המומלצת גם אם נראה שיפור במצב לאחר מספר ימים. בדרך כלל הטבה נראית כבר לאחר מספר ימים, אולם היועץ עלול לחזור אם לא מורחים את התכשיר כפי שממולץ או למשך הזמן המומלץ.

גם כשהטבה נראית לאחר מספר ימים, ריפוי מוחלט של העור הפגוע לאחר העלמות הפטירה יכול לקחת זמן מה. עד 4 שבועות.

לבלוע, התרופה מיועדת לשימוש חיצוני בלבד.

אם נטלת מנת יתר או אם טעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לחבר מיון של בית החולים, והבא אריזת התרופה איתך. אין לגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא!

אם שכחת למרוח את התרופה בזמן הדרוש, אין למרוח מנה כפולה. מרח את המנה הבאה בזמן הרגיל והיוועץ ברופא.

כיצד תוכל לסייע בהצלחת הטיפול?

לחות מעודדת את צמיחת הפטריות, לכן יש לשמור על יובש במקום הנגוע. יש לרוחן ולייבש בייסודיות את האזור הנגוע לפני כל מריחה של התרופה. יש להמנע מלגרום לחיכוך כיוון שהדבר עלול להזיק ולהאט את קצב ההחלמה או לגרום להתפשטות הזיהום.

אם הטיפול ברגליים – רצוי להשתמש ברגבים מכותנה, ויש להמנע מלבלוש רגליים מצמר או מחומרים סינתטיים. רצוי להחליפם מספר פעמים ביום (לפי כמות הזיעה). בעונות מתאימות מומלץ לנעול סנדלים ללא רגבים.

מיוון שזיהום עלול להיות מידבק, יש להקפיד על מגבת אישית וכדי למנוע זיהום חוזר, יש לכבס אותה בתכיפות.

אין לטווח תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהיך נטל תרופה. הרכב משקפיים אם היך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בלמיסיל דרמג'ל עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

יש להפסיק את השימוש ולפנות מיד לרופא אם הנך חש באחת מהתופעות הבאות, היכולות להעיד על תגובה אלרגית:

• קשיי נשימה ובליעה

• תגובות של הפנים, שפתיים, לשון או גרון

• גרד חמור בעור בליווי אדמומיות או שפוחיות מרומות

תופעות לוואי המופיעות לעיתים קרובות, שכיחות של עד 1:10:

• קילוף בעור.

תופעות לוואי המופיעות לעיתים רחוקות, שכיחות 1:100:

• גירוי ועקצוץ מקומי, אדמומיות.

אם התופעות הנ"ל ממשיכות ואו מטרידות יש לפנות לרופא.

אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא הזכרנו בעלון, עלך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות הטופס המקוון בקישור הבא:

<http://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic%40moh.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

• מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ולא תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

• אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה והתווית. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

• תנאי איחסון: אין לאחסן בטמפרטורה העולה על 30°C.

ניתן להשתמש בתכשיר במשך 4 חודשים לאחר פתיחה ראשונה.

6. מידע נוסף

נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם –

Purified water, ethanol 96%, isopropyl myristate, polysorbate 20, carbomer, sorbitan laurate, benzyl alcohol, sodium hydroxide, butylhydroxytoluene.

כיצד נראית התרופה ומה תוקן האריזה

למיסיל דרמג'ל הינו ג'ל בצבע לבן – שמת.

בעל הרישום ותכונות: NCH בע"מ, רחוב המפליסים 14, פתח-תקוה.

יש היעזר ותכונות: מורטיס פארמה, שוויץ.

עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות בתאריך: יולי 2015.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

132193105311

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.