

פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר על ידו

## אמוקסיצילין 15% וטרינרי AMOXYCILLIN 15 % VETERINARY לשימוש וטרינרי בלבד

**אמוקסיצילין 15%** הינו תרחיף סטרילי, מוכן להזרקה תוך שרירית, המכיל אמוקסיצילין טריהידראט.

**תכולה:** כל 1 מ"ל מכיל:

מרכיב פעיל: אמוקסיצילין (כטריהידראט) 150 מ"ג

מרכיבים בלתי פעילים: Benzyl alcohol (משמר), Fractionated coconut oil

**התוויות:** נגד אינפקציות מעורבות של גורמי מחלה הרגישים לאמוקסיצילין בסוסים, בקר, תרנגולות פטם והודיים, כלבים וחתולים

**התוויות נגד:** אין לטפל בבע"ח בעלי רגישות ידועה לפניצילינים, אשר לגביהם ייתכנו תופעות אנאפילקטיות כתוצאה מרגישות זו. אין להשתמש במקרה של אי ספיקת כליות.

### תופעות לוואי:

תגובות חמורות של רגישות יתר הופיעו במספר מקרים לאחר הזרקה (או אפילו לאחר מגע בעור) של אמוקסיצילין. תגובות כאב נראתה במספר מקרים במהלך ומיד אחרי המתן של התכשיר. אם הנך מבחינה/ה בתופעת לוואי חמורה כלשהי או תופעות אחרות שאינן מוזכרות בעלון זה, יש ליידע את הווטרינר.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי,

או ע"י כניסה לקישור :

<https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il>

### מינון והוראות השימוש:

#### להזרקה תוך-שרירית או תת-עורית.

סוסים	20	מ"ל	לכל	400	ק"ג
בקר	16	מ"ל	לכל	400	ק"ג
עגלים	6	מ"ל	לכל	100	ק"ג
עופות והודים	0.4-0.2	מ"ל	לכל	1	ק"ג
כלבים וחתולים	0.5	מ"ל	לכל	10	ק"ג

המנה היומית המירבית לסוסים ובקר היא 20 מ"ל. במקרים של אינפקציה חריפה ניתן לחזור על הטיפול כעבור 10-12 שעות ובמידת הצורך, ניתן לחזור על הטיפול מדי יום, אך לא יותר מ- 5 ימי טיפול ברציפות. יש לנער את הבקבוק לפני השימוש.

### **הערות:**

- יש לשמור על התכשיר מתחת ל-25°C.
- לאחר פתיחה ראשונה ניתן להשתמש עד 4 שבועות
- הרחק מילדים.
- יש להפסיק את הטיפול באמוקסיצילין 15% בבקר 25 יום, בתרנגולות פטם 14 יום ובתרנגולי הודו 21 יום לפני השחיטה לצרכי אדם ויש להימנע משימוש בחלב לצרכי אדם 48 שעות לאחר הטיפול.
- חייב מרשם רופא וטרינרי.

### **אזהרות מיוחדות:**

#### **אזהרות עבור השימוש בבעלי חיים:**

יש להשתמש בזהירות ביילודים. כתוצאה משינוי אפשרי (במשך הזמן או גאוגרפי) ברגישות החיידקים לאמוקסיצילין, מומלץ לבצע בדיקה בקטריוולוגית ובדיקת רגישות של החיידק.

#### **אזהרות למטפל הנותן את התרופה לבעלי החיים:**

עקב סיכון לרגישות ולהופעת תגובה דלקתית בעור במגע עם התכשיר, יש להימנע ממגע ישיר עם התכשיר בעת המתן. יש ללבוש כפפות.

#### **שימוש עם תרופות אחרות:**

אין להשתמש בתכשיר ביחד עם אנטיביוטיקות בקטריוסטטיות מסוג טטרציקלינים, כלורמפניקול וסולפונאמידים. כאשר אמוקסיצילין משולב עם אמינוגליקוזידים, מופיע סינרגיזם במיוחד נגד חיידקים גראם-חיוביים.

#### **ערבוב עם תרופות אחרות**

אין לערבב עם תרופות אחרות

מספר רישום: 077-34-91883-01

אריזה: 100 מ"ל בבקבוק

מיוצר ע"י: ירווט, הולנד

בעל הרישום: אביק תוצרים וטרינריים בע"מ, ת"ד 489, בית שמש 99100