

## עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו-1986

### התרופה משווקת ללא מרשם רופא

# ספירט סליציל 2%

הרכב:

חומצה סליצילית 2 גר' 100 מ"ל (SALICYLIC ACID 2G/100 ML)

לרשימת החומרים הבלתי פעילים בתכשיר ראה סעיף 6 – "מידע נוסף"

**קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.** עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה,

תרופה זו משווקת ללא מרשם רופא. התרופה מיועדת למבוגרים, ילדים ומתבגרים. עליך להשתמש בה בצורה נכונה. היוועץ ברוקח אם הינך זקוק למידע נוסף. עליך לפנות לרופא באם סימני המחלה מחמירים או אינם משתפרים.

### 1. למה מיועדת התרופה?

קרטוליטי - לטיפול בחטטת (ACNE).

### 2. לפני שימוש בתרופה

- **אין להשתמש בתרופה אם:** ידועה רגישות לאחד ממרכיבי התרופה! אין להשתמש על בהרות, כתמי לידה ויבלות שעירות.

**! אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:**

- אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול אם הינך סובל או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד כלי הדם או סוכרת
- אם הינך רגיש למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, במיוחד סליצילטים!, עליך להודיע על-כך לרופא לפני השימוש בתרופה.
- אין למרוח על פני שטח גדול של עור או על עור פצוע!
- אין להדליק סיגריה או להיחשף לאש עד לייבוש מוחלט של התכשיר. התכשיר מכיל למעולה מ-20% אלכוהול.

**! אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.**

**! אין להשתמש בו זמנית ב: סבוני לחיטוי העור, תכשירים לפצעי בגרות או כל תכשיר חיצוני המבוסס על אלכוהול שעלול ליבש את העור.**

### 3. כיצד תשתמש בתרופה?

**שים לב לא לבלוע!**

## תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד.

- **המינון המקובל בדרך כלל הוא:** למרוח על המקום הנגוע מספר פעמים ביום או לפי הוראות הרופא. במידה ואינך בטוח, עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח.
- אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שאתה משתמש בתרופה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם.

## 4. תופעות לוואי:

- כמו בכל תרופה, השימוש בספיריט סליציל עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.
  - עלולות להופיע השפעות לוואי כגון: רגישות בעור. במקרה של רגישות בעור, יש להפסיק את השימוש ולפנות מיד לרופא.
- אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.
- ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי.

## 5. איך לאחסן את התרופה?

- זהירות! חומר דליק, הרחק מאש!
  - **אחסן בטמפרטורה הנמוכה מ 25°C**. סגור היטב!
  - גם לפי תנאי האריזה ואחסנה המומלצים, תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד. בכל מקרה של ספק, עליך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופה.
  - אין להשתמש בתרופה יותר מ-6 חודשים לאחר פתיחת הבקבוק לראשונה.
  - אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (Exp.date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- אין להשתמש בתרופה אם אתה מבחין בשינויים במראה התמיסה העלולים להעיד על קלקול התרופה.

- אחסן באריזה המקורית. אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.
- **מנע הרעלה!** תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה.
- אם בטעות בלעת או בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לחדר המיון של בית החולים והבא איתך את אריזת התרופה.
- אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא!

**6. מידע נוסף:** נוסף על החומרים הפעילים התרופה מכילה גם את החומרים הלא פעילים הבאים:

ALCOHOL 95%

PURIFIED WATER

התרופה היא תמיסה צלולה שקופה, ארוזה בבקבוק לבן וסגורה בפקק לבן.

גודל האריזה 100 מ"ל.

מספר רישום התרופה: 643028131. מק"ט 03-610159

יצרן: ויטאמד תעשיות פרמצבטיות בע"מ, ת"ד 114 בנימינה 30550, ישראל.

עלון זה נבדק ואושר על ידי משרד הבריאות בתאריך: נובמבר 2015

התרופה מיועדת לבני שני המינים. לשם הפשטות והקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר.