

פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות
ותוכנו נבדק ואושר על ידו באוגוסט 2010

שימוש וטרינרי בלבד חייב מרשם רופא וטרינרי

מיקוטייל 300 וטרינרי

Solution for injection
For S.C. use only

תמיסה להזרקה
למתן תת עורי בלבד

הרכב:

כל בקבוק של 50 מ"ל או 25 מ"ל להזרקה מכיל:
Tilmicosin 300 mg/1 ml

קבוצה תרופוית:

אנטיביוטיקה ממשפחת המקרולידיים החצי-סינטטיים.

התוויה:

לטיפול בדלקת ריאות בבקר צעיר הנגרמת ע"י מיקרו-
אורגניזמים הרגישים לטילמיקוסין. בכבשים: לטיפול בדלקת
עטניים של כבשים (ovine mastitis), enzootic abortion,
footrot pneumonia-i.

התוויות נגד:

- אין להזריק לכבשים מתחת למשקל 15 ק"ג.
- אין להזריק לתוך הוריד - התרופה רעילה ביותר לאחר
מתן תוך-וריד, לכל סוגי בעלי החיים.

- אין להזריק לחזירים וסוסים, גם לא במתן תת-עורי.
- אין להזריק לפרות חולבות - שימוש בתרופה עלול לגרום
לשאריות בחלב.
- אין להזריק לעגלים מתחת לגיל חודש ועגלי חלב בכל
גיל. שימוש בגיל זה עלול לגרום לשאריות מעבר לזמן
ההמתנה המומלץ.
- אין להשתמש בעיזים.

דרך המתן והמינון:

טילמיקוסין שייך למשפחת המקרולידיים החצי-סינטטיים, ומיועד
להזרקה תת-עורית בעגלים ועגלות בשר, המיועדים לפיטום.
הזרקה חד-פעמית במינון של 10 מ"ג ל-1 ק"ג משקל גוף
(כלומר: 1 מ"ל של מיקוטייל 300 וטרינרי ל-30 ק"ג משקל
גוף), במתן תת-עורי, מאחורי השכמות - מעל הצלעות.
בבקר אין להזריק יותר מ-20 מ"ל לאתר הזרקה אחד.
במידה ולא חל שיפור תוך 48 שעות מזמן המתן - נדרשת
אבחנה נוספת.

אזהרות:

- אין לערבב תכשיר זה עם תמיסות אחרות להזרקה. הדבר
עלול לגרום לשקיעת החומר הפעיל.
- התכשיר אינו מיועד לשימוש בבני-אדם.
- הזרקה לאדם עלולה לגרום למוות. במקרה של הזרקה
בתאונה יש לפנות מיד לעזרה רפואית.
- הרופא המטפל יוודא כי המזריק מודע למידע זה וכי הינו
מודע לצורך להימנע מתאונת הזרקה עצמית.
- יש לשמור הרחק מהישג ידם של ילדים.

- יש להימנע ממגע בעיניים.
- התכשיר עלול לגרום לרגישות בעור. יש לשטוף היטב ידיים לאחר השימוש.
- אין להשתמש במזרק אוטומטי.
- יש לנקות זehירות מירבית בכדי למנוע הזרקה עצמית בתאונה: אין לעבוד לבד עם התכשיר; אין לשאת את המזרק עם התכשיר כאשר מחוברת אליו מחט, אלא לחבר את המחט רק בעת מילוי המזרק וההזרקה; יש לוודא שבעל החיים המטופל מרוסן וכן בעלי חיים אחרים בסביבה הקרובה.
- בטיחות השימוש בפרות הרות ובפרי הרבעה לא הוכחה.

תופעות לוואי

ניתן נפיחות באזור המתן התת-עורי, אך תופעה זו הינה זמנית ובדרך כלל קלה.

הערה לרופא המטפל באדם במקרה של פגיעה בתאונה:

מערכת הלב וכלי הדם עשויה להיות מושפעת מטילמיקוסין. הרעילות למערכת זו עשויה לבנוע מחסימת תעלות סידן. רק אם זוהתה באופן ודאי חשיפה טילמיקוסין, ניתן לשקול הזרקה תוך-ורידית של קלציום-כלוריד.

Dobutamine משמש לטיפול בסימנים אינטרופיים שליליים, בעוד שחוסמי ביטא (β -blockers) יגבירו את הפעילות האינטרופית השלילית. במספר בעלי חיים עלולה מערכת הלב וכלי הדם להיפגע עקב מתן טילמיקוסין.

זמן מחצית החיים של טילמיקוסין בסרום של בקר הוא

מספר שעות, ותרופה זו נמצאת ברקמות מספר ימים. אי לכך מומלץ לעקוב אחר מערכת הלב וכלי הדם ולתת טיפול תומך בהתאם.

מיניסין שהצטבר נראה, כי **שימוש באפינפרין או אנטגוניסטים בטא-אדרנרגיים כגון פרופרנולול מהווה התווית נגד**, שכן הוא עלול להגביר את האפקט הקטלני של מיקוטיל.

זהירות:

הזרקה תוך שרירית עלולה לגרום לרגישות מקומית ונזק.

זמן המתנה לפני שחיטה:

אין לשחוט בעל חיים המיועד למאכל אלא לאחר 28 יום מיום הפסקת הטיפול בתרופה.

זמן המתנה לחלב בכבשים: 15 ימים.

אין להשתמש בפרות חולבות.

חומרים בלתי פעילים:

Propylene glycol, Phosphoric acid 75%, Water for injection

אחסון:

מתחת לטמפ' 30°C.

יש להגן מפני קרינת שמש ישירה.

לאחר פתיחה ראשונה ניתן להשתמש בתכשיר למשך 28 יום.

היצרן: אלנקו (אלי-לילי), ליברפול, אנגליה.

הסוכן ובעל הרישום: יורומר בע"מ,

ת.ד. 1064, רמת השרון 47110, ישראל.

מס' רישום התרופה: 081 60 92117.