

<div></div>	<div>עלון לצרכן לפי תקנת הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו – 1986</div>
<div>התרופה משווקת ללא מרשם רופא</div>	

N–אלרגיה טבליות

כל טבליה מכילה צטיריזין דיהידרוכלוריד (Cetirizine dihydrochloride) במינון 10 מ"ג.

מרכיבים בלתי פעילים מופיעים בסעיף 6.

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

התרופה אינה מיועדת לילדים מתחת לגיל 6

עלֵיך להשתמש בתרופה בצורה נכונה. היוועץ ברוקח אם הנך זקוק למידע נוסף. עלֵיך לפנות אל הרופא באם סימני המחלה (סימפטומים) מחמירים או אינם משתפרים לאחר מספר ימים.

- למה מיועדת התרופה?**

לטיפול במזלז אלרגית עונתית ורב שנתיים ולטיפול באורטיקריה (סרפדת) כרונית אשר מתאפיינת בגירוי בעור (כגון: גירוד, פריחה). למבוגרים ולילדים מעל גיל 6 שנים.

קבוצה תרפויטית: אנטיהיסטמינים.

- לפני השימוש בתרופה**

⚠️ אין להשתמש בתרופה אם הנך:

- רגיש (אלרגי) לחומר הפעול, לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6), לתרופה אחרת ממשפחת האנטיהיסטמינים המכילה הידרוקסיזין או לתרופות אחרות ממשפחת הפיפרזין, לדוגמא: בוקליזין, ציקליזין, מקלוזין, לבוצטיריזין.
- מניקה.
- סובל ממחלת כליות חמורה או מכשל כליתי חמור (פינוי קראטינין נמוך מ- 10 מ"ל לדקה).
- סובל מבעיות של אצירת שתן.
- בעל אי סבילות לסוכרים מסוימים (תכשיר זה מכיל לקטוז).

אזהרה מיוחדת הנוגעות לשימוש בתרופה:

⚠️ לפני הטיפול בתרופה יש לשפר לרופא ולהיוועץ בו אם:

- הנך בהריון, חושבת שהנך בהריון או מנסה להיכנס להריון (ראי סעיף הריון והנקה).
- הנך רגיש למזון כלשהו או לתרופה כלשהי.
- הנך סובל או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד הכליה/מערכת השתן, בלוטת הערמונית, הכבד, הלב ו/או כלי הדם, מאמפיזמה או ברונכיטיס כרונית.
- הנך סובל מאפלפסיה או הנך בסיכון לפרוסים.
- הנך סובל מגורמים המשפיעים על נטייה לאצירת שתן (כגון: פגיעה בחוט השדרה, הגדלת בלוטת הערמונית), מכיוון שצטיריזין מגביר את הסיכון לאצירת שתן.
- לפני בדיקה לאבחון אלרגיה, הפסק את נטילת התרופה 3 ימים לפני הבדיקה כיוון שנטילת התרופה יכולה להשפיע על תוצאות הבדיקה.
- אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או תקופה ממושכת בלי להיוועץ ברופא.
- טיפול ממושך בתרופה מעלה את הסיכון לזיהומי שיניים או חניכיים, יש לדאוג להגיגנת פה הולמת.

⚠️ אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד יש ליידע את הרופא או הרוקח אם הנך נוטל תרופות המשפיעות על מערכת העצבים המרכזית כגון תרופות לשינה, לטיפול בדיכאון, להרגעה, ריטובנבר (לטיפול ב- HIV, נגיף השלד החיסוני האנושי) או תיאופילין.

• אין להשתמש ב-N–אלרגיה יחד עם תרופות אחרות ממשפחת הפיפרזין לדוגמא: בוקליזין, ציקליזין, מקלוזין, לבוצטיריזין.

⚠️ שימוש בתרופה מזון

ניתן ליטול את התרופה עם אוכל.

⚠️ שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול

אין לשתות יינות, או משקאות אלכוהוליים בתקופת הטיפול עם התרופה.

⚠️ הריון והנקה

אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול אם הנך בהריון, חושבת שהנך בהריון או מנסה להיכנס להריון.

כמו בתרופות אחרות, יש להימנע משימוש ב-N-אלרגיה במהלך תקופת ההריון. שימוש בטבעות בתרופה בזמן ההריון, ככל הנראה לא יגרום מק לעובר. יחד עם זאת, יש להפסיק את השימוש בתרופה.

אין להשתמש בתרופה כאשר הנך מניקה.

⚠️ נהיגה ושימוש במכוונת

לאנשים מסוימים תרופה זו יכולה לגרום לנמנום, עייפות. אם חשת בתופעה זו לאחר השימוש ב- N-אלרגיה יש להימנע מכל פעילות המחייבת ערנות כגון: נהיגה ברכב או הפעלת מכוונת מסוכנות. באשר לילדים, יש להזהיבם מרכיבה על אופניים או ממשחקים בקרבת הכביש וכדומה.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

N-אלרגיה מכילה בעתד הוראה אחרת מהרופא:
לסוכרים מסוימים, יש להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול בתרופה זו.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עלֵיך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח.

תכשיר זה אינו מיועד לילדים מתחת לגיל 6 שנים.

המינון המקובל בהעדר הוראה אחרת מהרופא:
ילדים בגיל 12-6 שנים: חצי טבליה פעמיים ביום בבוקר ובערב או טבליה אחת פעם ביום.

ילדים השוקלים פחות מ- 30 ק"ג: חצי טבליה פעם ביום.

מבוגרים וילדים מגיל 12 שנים: טבליה אחת ליום לכל היותר.

מבוגרים מעל גיל 65 ומטופלים בעלי תפקוד כבדי או כליתי לקוי: יש להיוועץ ברופא.

אם אתה מרגיש מנומנם או מסחרר, נטילת חצי טבליה פעמיים ביום יכולה להפחית תופעות אלו.

יש לבלוע את התרופה עם כוס מים, אפשר עם אוכל. מותר לכתוש/לחצות. אין מידע לגבי לעסה.

אין לעבור על המנה המומלצת. היוועץ ברופא אם אתה מרגיש שהשפעת התרופה N-אלרגיה חלשה או חזקה מדי. אם התסמינים מחמירים או אינם משתפרים לאחר מספר ימים, יש להיוועץ ברופא.

אם נטלת בטעות מנת יתר או אם בטעות ילד בלע מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא את אריזת התרופה איתך.

אם נטלת מינון גבוה מהמותר, תיתכנה תופעות כגון: ישנוניות, אי שקט, נמנום, רגנונת, עייפות, בלבול, שלשול, סחרחורת, כאב ראש, הרגשת חולי, הרחבת האישונים, גירוד, הרגעה (סדציה), ערפול חושים, קצב לב מהיר לא תקון, רעד ואצירת שתן. זכור לא לנהוג במצבים אלה.

אם שכחת ליטול את התרופה בזמן הדרוש, אין ליטול מנה כפולה. קח את המנה הבאה בזמן הרגיל והוועץ ברופא.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק תוויות והמנה בכל פעם שהנך נוטל תרופה. הרכיב משקפיים אם הנך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש ב- N-אלרגיה עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

יש להפסיק את הטיפול ולפנות מיד לרופא אם מתפתחות התופעות הבאות:

- מופיעים תסמינים של שוק או תגובה אלרגית חמורה (נדיר מאוד) כגון: קוצר/קשיי נשימה, פריחה, גרד, חום, נפיחות של הגרון, הפנים, העפעפיים, הצוואר, הלשון, השפתיים ו/או בחלקים אחרים בגוף. תגובה זו יכולה להופיע מיד בנטילת התרופה בפעם הראשונה או להופיע מאוחר יותר.
- נטייה להיפצע ו/או לדמם יותר מהרגיל.
- פרוסים/עוויותו.
- חוסר מנוחה, רגישות העור למגע, נמנום, אי נוחות בקיבה.
- כאבי ראש, שלשול בילדים, יובש בפה, סחרחורת, עייפות. תופעות אלה שכוחות.
- חולשה או הרגשה כללית לא טובה, שלשול, תופעות אלה אינן שכוחות.
- מחשבות אובדניות (נדיר מאוד).
- הזיות, בלבול, שינוי בתפקודי כבד כגון תוצאות לא תקינות של תפקודי כבד, קצב לב מאץ (מופיעות לעיתים נדירות), עילפון.

תופעות לוואי נוספות:

תופעות לוואי שכיחות – תופעות שמופיעות ב- 10–1 משתמשים מתוך 100: ישנוניות, בחילה, כאב בטן, סחרחורת, דלקת הלוע (כאב גרון), תסמינים דמויי הצטננות באף (בילדים בלבד), נפיחות או גירוי באף (דלקת אף), דימום מהאף.

תופעות לוואי שאינן שכיחות– תופעות שמופיעות ב- 10–1 משתמשים מתוך 1,000: גירוד ו/או פריחה, תחושת נימול, עקצוצים בכפות הידיים והרגליים, חוסר מנוחה, שלפוחיות בעור, עצבנות, נדודי שינה.

תופעות לוואי נדירות – תופעות שמופיעות ב- 10–1 משתמשים מתוך 10,000: בצקת (נפיחות כללית עקב אצירת נוזלים), דלקת כבד, עלייה במשקל, תופקנות, דיכאון, ראיית או שמיעת דברים שלא קיימים (הזיות), סרפדת (נפיחות, אדמוניות וגירוד העור), עמנון מרה (כולסטזיס), דלקת קעינית הכליה, אגמיה המוליטית, תנועות לא רצוניות בפנים, תת לחץ דם חמור, מיעוט טסיות דם (טרומבוציטופניה), הפרעות בתנועה, נוקשות שרירים, רעד, טיקום (תנועות שרירים פתאומיות, לא רצוניות, חוזרות), בעיות בראייה כגון ראייה מטושטשת, בריחת שתן, כאב ו/או קושי במתן שתן, שינויים בחוש הטעם, עלייה במשקל.

תופעות לוואי נדירות מאוד – תופעות שמופיעות בפחות ממשתמש אחד מתוך 10,000: קושי במיקוד הראייה, תנועת שיבוב לא רצונית של העיניים, דימום או חבורות חריגות, טעם רע בפה, תנועות לא רצוניות או יוצאות דופן של הגפיים, עוויותו ברשרי הצוואר והכתפיים, נפיחות העור בייחוד בפנים, עילפון, פריחה חוזרת, הרטבת לילה, פריחה טבעתית אליפסית בגוון אדום, הפרשת שתן לא תקינה.

תופעות לוואי נוספות: אובדן זיכרון ו/או הפרעה בזיכרון, קושי בריכוז, אנורקסיה, הסמקה, ריור, אצירת שתן, אי-ספיקת לב, יתר לחץ דם, פגיעה בקואורדינציה, קושי בשליטה בתנועה, ליקוי בהוצאת קול, יתר תנועה, מתח שריר גבוה, רגישות נמוכה לכאב, התכווציות ברגליים, מיגרנה, דלקת בעצבי חוט השדרה, שיתוק, צניחת עפעפיים, עוויותו, ורטיגו, ליקויים בשדה הראייה, החמרה בעששת, עצירות, קשיי עיכול, גיהוק, גזים, דלקת בקיבה, סחרוים, עלייה בתאבון, צואה שחורה, דימום רקטלי, דלקת הפה (סטומוטיטיס) כולל דלקת כיבית, שינוי בצבע הלשון, בצקת בלשון, דלקת שלפוחית השתן, דם בשתן, דחיפות במתן שתן, השתנת יתר, אי שליטה במתן שתן, זיהומים בדרכי השתן, חרשות, כאב אזניים, רעילות לאוזן, טנטון, התייבשות, סוכרת, צמא, כאב מפרקים, דלקת מפרקים, מחלת מפרקים ניוונית, חולשת שרירים, כאב שרירים, מחשבות חריגות, חשק מיני יתר, ביטול עצמי (דפרסונליזציה), אי יציבות רגשית, התרוממות רוח, חלומות רעים, הפרעות שינה, דלקת סמפונות (ברונכיטיס), קוצר נשימה, נשימת יתר, ליחה מוגברת, דלקת ריאות, הפרעות נשימה, סינוסיטיס, זיהום בדרכי הנשימה העליונות, כאבי מחזור, כאב בחזה (בנשים), דימום בין-מחזורי, הפרשה לבנה מהנרתיק, דימום יתר בזמן הווסת, דלקת נרתיק, הגדלת בלוטות הלימפה, אקנה,



התקרחות, דלקת עור, יובש בעור, אקזמה, הופעת מורסות מוגלתיות, התקרנות יתר (היפוקרטוזיס), שיעור יתר, הזעה מוגברת, תגובת רגישות לאור, תגובה רעילה לרגישות לאור, ארגמנת, הפרשת חלב (סבוראה), הפרעות עוריות, קשירת עורי, פגיעה בחוש הריח, איבוד טעם, עיוורון, דלקת לחמית, כאב בעין, גלאוקומה, אובדן יכולת מיקוד הראייה, דימום עיני, יובש עין, פגיעה לא מכוונת, תשישות, כאב גב, כאב חזה, הגדלת הבטן, הבזקי חום, בצקת ברגל, פולפיס באף, כאב, בצקת מסביב לעיניים, קשיחות.

תופעות לוואי ותגובות בין תרופתיות בילדים:

דלקת הלוע, שיעול, דימום אפי, כיווץ סמפונות, הקאות.

על ההורים לדווח לרופא המטפל על כל תופעת לוואי וכן על כל תרופה נוספת הניתנת לילד!

ראה לעיל תופעות לוואי ותגובות בין תרופתיות מיוחדות שפורטו.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית, עלֵיך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות הטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות www.health.gov.il או ע"י כניסה לקישור:

<https://forms.gov.il/globaldata/getsequence?getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

• מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך למנעו הרעלה. אין לגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא!

• אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp.date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

- יש לאחסן במקום יבש מתחת ל- 25°C.
- אחסן באריזה המקורית. אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.

6. מידע נוסף

• נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:

Microcrystalline cellulose, lactose anhydrous, magnesium stearate, colloidal silicon dioxide, HPMC, titanium dioxide, Polyethylene glycol 400.

כל טבליה מכילה 35 מ"ג לקטוז.

• כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

כל אריזה מכילה 20 טבליות בצבע לבן עם קו חציה בצד אחד.

• יצרן ובעל הרישום: תרימה תוצרי רפואה ישראלים מעברות בע"מ, מעברות 4023000 ישראל.

• עלון זה נבדק ואושר על ידי משרד הבריאות בתאריך: ינואר 2016.

• מספר רישום התרופה פננסק התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 155.16.34652.00

• לשם הפשטות ולהקלת הקריאה עלון זה נוסח בלשון זכר, אולם המידע בעלון והתרופה מיועדים לבני שני המינים.

<div></div>	<div>מעברות 4023000</div>
<div>תרימה</div>	<div>תוצרי רפואה ישראלים</div>
<div>מעברות בע"מ</div>	

101108011

