



نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) - ١٩٨٦  
يسوق الدواء من دون وصفة طبيب

## أليرجي - كير أعراض

لا يجوز استعمال أليرجي - كير سوية مع أدوية أخرى من مجموعة الـ بيبيرازين مثلاً: بوكليزين، سيلكليزين، ميكلوزين، ليغوسينيريزين.

**١. استعمال الدواء والطعام**  
بالإمكان تناول الدواء مع الطعام.

**٢. استعمال الدواء واستهلاك الكحول**  
لا يجوز شرب النبيذ، أو المشروبات الكحولية خلال فترة العلاج بالدواء.

**٣. الحمل والإرasmus**  
لا يجوز استعمال الدواء بدون استشارة الطبيب قبل بدء العلاج إذا كنت في فترة الحمل، تعتدين بذلك حامل أو تحواليين الحمل.

بالمشابه للأدوية الأخرى، يجب الامتناع عن استعمال أليرجي - كير خلال فترة الحمل. إن استعمال الدواء بالاختصار مثلاً خلال فترة الحمل، لن يسبب ضرراً للجنين على ما يديو. مع ذلك، يجب التوقف عن استعمال الدواء.

لا يجوز استعمال الدواء إذا كنت مرضعة.

**٤. السياقة واستعمال الماكنات**  
يمكن أن يسبب هذا الدواء بعض الأشخاص لتعانس، إرهاق. إذا كنت تشعر بهذا العرض بعد استعمال أليرجي - كير فيجب الامتناع عن أي نشاط يتطلب البصرة مثل: سياقة المركبات أو تشغيل الماكنات الخطرة. بالنسبة للأطفال، يجب تجنبهم من ركوب الدراجات أو اللعب بالقرب من الشارع وما شابه.

**٥. معلومات هامة عن بعض مكونات الدواء**  
البارجي - كير يحتوي على الـ لكتون، إذا قيل لك في الماضي من قبل طبيب بأنه لديك عدم تحمل لسكريات معينة، فيجب استشارة الطبيب قبل بدء العلاج بهذا الدواء.

**٦. كثيفة استعمال الدواء؟**  
عليك الاستفهام من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكون واثقاً.

هذا المستحضر غير مخصص للأطفال دون عمر ٦ سنوات.

القدر الدوائي الـ ايتامي في حال عدم وجود تعليمات أخرى من الطبيب: الأطفال بعمر ١٢-١٦ سنة: نصف قرص مرتبن باليوم في الصباح وفي المساء أو قرص واحد مرة في اليوم.

الأطفال الذين يزنون أقل من ٣٠ كغم: نصف قرص مررة في اليوم.  
الكبار والأطفال من عمر ١٢ سنة: قرص واحد في اليوم على الأكثر.  
الكبار ما فوق عمر ٦٥ سنة والمعالجون لديهم خلل في وظيفة الكبد أو الكلية: يجب استشارة الطبيب.

إذا كنت تشعر ببعض أو دوار، فإن تناول نصف قرص مرتبن في اليوم يمكن أن يقلل من هذه الأعراض.

يجب بلع الدواء مع كأس من الماء، بالإمكان مع الطعام، يسمح بسحق/ بشطر القرص.

لا توجد معلومات بالنسبة لاضغط القرص.

لا تتجاوز المقدار الدوائي الموصى به. استشر الطبيب إذا كنت تشعر بآلام تاثير الدواء أليرجي - كير أضعف أو أقوى من الآلام. إذا تفاقمت الأعراض أو إذا لم تتحسن بعد عدة أيام، يجب استشارة الطبيب.

إذا تناولت بالخطأ مقداراً دوائياً مفرطاً أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه في الحال إلى الطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى وأخضير معد عليه الدواء.

إذا تناولت مقداراً دوائياً أكبر من المسموح به، فمن الجائز أن تحدث أعراض مثل: الميل للنوم، قلة هدوء، تعانس، سخط، إرهاق، ارتباك، إسهال، دوار، صداع، الشعور بوعكة، توسيع الحدقةين، حكة، تهدّه (sedation)، ضبابية الحواس، نظم قلب سريع وغير منتظم، رجفة وإنحباس البول. تذكر

بعدم السياقة في هذه الحالات.

إذا تسببت تناول الدواء في الوقت المطلوب، لا يجوز تناول مقداراً دوائياً مضاعفاً. تناول المقدار الدوائي القائم في الوقت الـ ايتامي وإشتشر الطبيب.

لا يجوز تناول الأدوية في اللقمة، يجب تشخيص طابع الدواء والتتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء، ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توقفت لديك أسلطة إضافية حول استعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

يحتوي كل قرص على سيتيريزين ديهيدروكلورايد (Cetirizine dihydrochloride) من عيار ١٠ ملجم.

المركبات غير الفعالة تظهر في الفقرة ٦

إن الشرة تتبعن حتى نهايتها قبل استعمال الدواء، تحتوى هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء إذا توفرت لديك أسلطة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

يجب عليك استعمال الدواء على الشكل الصحيح، استشر الصيدلي إذا كنت بحاجة لمعلومات إضافية، عليك مراجعة الطبيب إذا تفاقمت علامات المرض (الأعراض) أو إذا لم تتحسن بعد عدة أيام.

### (١) لأي غرض مخصص الدواء؟

المعالجة الرشيق التحسسي الموسبي ومعدن السنين ولمعالجة الشرى (urticaria) المزمن الذي يتغير بتبييض الجلد (مثل: حكة، فطح). للأكتار والأطفال ما فوق عمر ٦ سنين.

الفصيلة العلاجية: من مضادات الهيستامين.

### (٢) قبل استعمال الدواء

#### لا يجوز استعمال الدواء إذا كنت:

• حساساً (الـ ايتجي) لل المادة الفعالة، لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (انظر الفقرة ٦) للدواء آخر من مجموعة مضادات الهيستامين التي تحتوي على ديهيدروـكسيزين أو لأدوية أخرى من مجموعة الـ بيبيرازين، مثلاً: بوكليزين، سيلكليزين، ميكلوزين، ليغوسينيريزين.

في فترة الرضاعة.  
تعاني من مرض شديد في الكلى أو من فشل كلوي خطير (تصفية الكرياتينين أقل من ١٠ مل

ل في الدقيقة).  
تعاني من مشكل لاحتباس البول.  
تعاني من عدم تحمل لسكريات معينة (هذا المستحضر يحوي لكتون).

#### تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء:

**١. قبل العلاج بالدواء يجب إبلاغ الطبيب واستشارته إذا:**  
كنت في فترة الحمل، تعتدين بذلك حامل أو تحواليين الحمل (أنظر فقرة الحمل والإرasmus)

كنت حساساً لأي طعام أو لأي دواء.  
كنت تعاني من آلام في الماخي من خلل في وظيفة الكلية / المussels البولية، غدة البروستات، الكلب، الرئوية المزمن.

كنت تعاني من عامل مؤثر على قابلية حدوث اختلالات.  
تضخم غدة البروستات، وذلك لأن سيتيريزين يزيد من خطرة إحتباس البول.

قبل إجراء فحص شخص شخيصي الحساسية، توقف عن تناول الدواء قبل ٣ أيام من الفحص وذلك لأن تناول الدواء يمكن أن يؤثر على نتائج الفحص.

لا يجوز استعمال هذا الدواء في أوقات مقترنة أو لفترات طويلة بدون استشارة الطبيب.

العلاج المطول بالدواء يزيد من خطرة حدوث تلقيث في الأستان أو اللثة، يجب الحرص على وقاية مناسبة لللقف.

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وأدوية أخرى، أخذ الطبيب أو الصيدلي عن ذلك، يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي بالخصوص.

إذا كنت تتناول الأدوية التي تؤثر على الجهاز العصبي المركزي مثل أدوية البنوم، لعلاج الإكتئاب، للهستير، ريتونافير (المعالجة HIV) فيروس شلل المناعة البشري أو تيوليفلين.

