

أنهيدرول فورته

محلول ضمن قنينة «رول أون»

المادة الفعالة وتركيزها:

المادة الفعالة هي ألومينيوم كلوريد هيكساهيدرات

(Aluminum Chloride Hexahydrate) 20% w/v

المواد غير الفعالة ومولدات الحساسية: أنظر الفقرة ٦ «معلومات إضافية».

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

الدواء مخصص للأطفال، للكبار وللمسنين. عليك إستعماله بطريقة صحيحة. إستشر الصيدلي إذا كنت بحاجة لمعلومات إضافية. عليك التوجه إلى الطبيب في حال تفاقم الأعراض.

١) لأي غرض مخصص الدواء؟

الدواء، أنهيدرول فورته هو لعلاج التعرق المفرط: في منطقة الإبط، في اليدين أو في القدمين. إن المادة الفعالة ألومينيوم كلوريد هيكساهيدرات تقلل من التعرق عن طريق سد غدد التعرق في الجلد وتعمل أيضاً كمزيل للروائح عن طريق إبادة البكتيريا التي تسبب رائحة الجسم.

الفصيلة العلاجية: مركبات ألومنيوم وكلور.

٢) قبل إستعمالك أنهيدرول فورته

❌ لا يجوز استعمال أنهيدرول فورته

- إذا كنت حساساً (ألرجي) للمادة الفعالة أو لأحد المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء. أنظر الفقرة ٦ للمركبات غير الفعالة في الدواء.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

- يجب أن يكون الدهن محصوراً فقط في المناطق المتعركة، في منطقة الإبط، في اليدين أو القدمين.
- قبل الإستعمال إحرص بأن تكون مناطق الجلد التي سوف يتم معالجتها جافة تماماً (أنظر الفقرة ٣).
- لا تدهن على جلد متشقق أو متهيج.
- أثناء العلاج في منطقة الإبط لا تحلق شعر الإبط ولا تستعمل أي مستحضر لإزالة الشعر عن هذه المنطقة، خلال ١٢ ساعة قبل أو بعد إستعمال أنهيدرول فورته.
- تجنب التماس مع العينين، الأنف والفم.
- إحرص بأن لا ينسكب محتوى القنينة لأن ذلك قد يلحق الضرر بك، بملابسك وبأغراضك (أنظر الفقرة ٤).
- لا تخض القنينة.
- لا تحاول إزالة الكرة المستديرة التي تغطي فتحة القنينة.
- إحرص على إبقاء غطاء القنينة مغلقاً في الوقت الذي لا تستعملها.
- تحذير! المادة قابلة للإشتعال بسرعة. لا يجوز الإستعمال بالقرب من النار أو مصدر إشتعال.

❶ حلق الإبط / إزالة الشعر

أثناء العلاج في منطقة الإبط لا تحلق شعر الإبط ولا تستعمل أي مستحضر لإزالة الشعر عن هذه المنطقة، خلال ١٢ ساعة قبل أو بعد إستعمال أنهيدرول فورته.

❷ إستعمال أدوية أخرى

أنهيدرول فورته لا يؤثر أو يتأثر نتيجة إستعمال أدوية أخرى.

❸ الحمل والإرضاع

بالإمكان إستعمال المستحضر أثناء فترة الحمل والرضاعة. مركبات الدواء في هذا المستحضر وفي مستحضرات مشابهة تستعمل بشكل واسع منذ عدة سنوات دون أي إبلاغ عن مشاكل. مع ذلك لم تجرى تجارب أمان على الدواء.

❹ السياقة وإستعمال الماكينات

غير معروف إذا كان إستعمال الدواء يؤثر على قدرتك على السياقة أو إستعمال الماكينات.

٣) كيفية إستعمال أنهيدرول فورته؟

للأطفال، الكبار والمسنين:

- لا يجوز البلع، للإستعمال الخارجي فقط.
- يجب دهن المستحضر فقط في منطقة الإبط، اليدين أو القدمين.
- قبل إستعمال أنهيدرول فورته تأكد بأن تكون مناطق الجلد التي سوف يتم معالجتها جافة تماماً.
- من أجل أن تكون مناطق العلاج جافة تماماً:
- لا تستحم/أو لا تأخذ دوش مباشرة قبل العلاج.
- يجب دهن المستحضر في الليل فقط قبل ذهابك للنوم، قبل الإستلقاء في الفراش (ذلك لأن غدد التعرق لديك تكون أقل نشاطاً أثناء النوم).
- قبل إستعمال الدواء تأكد من أن غطاء الدواء ملولباً بشكل جيد، بعد ذلك عليك إمالة القنينة من أجل ترطيب الكرة المستديرة. لا تخض القنينة.
- إفتح غطاء القنينة وإدهن السائل كما يجب في المناطق المتعركة.

- ينتظر حتى يجف السائل بنفسه (يستغرق بضع دقائق معدودة)، بعدها اغسل يديك (إلا إذا كان العلاج في منطقة اليدين).
- يجب البقاء مع العلاج كل الليل، و فقط في الصباح يجب غسل المناطق المعالجة جيداً.
- يجب إستعمال أنهيدرول فورته بنفس الطريقة لمدة ليلتين متتاليتين وبعدها يجب التوقف عن العلاج لمدة الليلتين القادمتين.
- يجب معاودة الدهن لمدة ليلتين وبعد ذلك التوقف مرة أخرى لمدة ليلتين. يجب مواصلة العلاج الدوري حسب الحاجة.
- قلل أو قم بزيادة وتيرة العلاج لتلائم وحاجاتك (إنته، إذا كنت تقاسي من أعراض جانبية، من المحتمل بأن وتيرة العلاج أعلى من اللازم - (أنظر الفقرة ٤).
- إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشر الصيدلي أو الطبيب.

إستعمال مزيلي الروائح أو مضادات التعرق الأخرى

- إن إستعمال مزيلي الروائح أو مضادات التعرق العادية غير ضروري أثناء إستعمال أنهيدرول فورته. إذا رغبت في مواصلة الإستعمال بهذه المستحضرات عليك:
- إستعمالهم فقط في الأيام التي لا تستعمل فيها أنهيدرول فورته أو
- إستعمالهم في صباح اليوم التالي فقط بعد غسل أنهيدرول فورته. قبل الإستعمال التالي ب أنهيدرول فورته يجب التأكد، من أنك غسلت مزيلي الروائح أو مضادات التعرق جيداً، وأن جلدك جاف تماماً قبل إستعمال أنهيدرول فورته.

إذا دخل المستحضر في العينين أو الفم

قد يسبب المستحضر الضرر إذا دخل في عينيك أو فمك. أشطف عينيك أو فمك بكثير من الماء. في الوقت الذي تقوم به بشطف إحدى العينين، إنته بأن لا تشطف الدواء للعين الأخرى. بعد ذلك توجه مباشرة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

إذا إستعملت المستحضر بوتيرة أعلى من اللازم

قد يؤدي الإستعمال المفرط إلى تهيج في المناطق المعالجة. إذا كنت تعاني من تهيج، إستعمل المستحضر بوتيرة أقل وعالج علامات التهيج المفصلة في الفقرة ٤.

إذا نسيت إستعمال المستحضر

لا تقلق إذا نسيت أحياناً إستعمال الدواء، واصل العلاج حال تذكر ذلك.

٤) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال أنهيدرول فورته قد يسبب أعراضاً جانبية عند بعض المستعملين. لا تندش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أياً منها. رد فعل شائع لمثل هذا النوع من العلاج هو تهيج جلدي وإحمرار في المنطقة المعالجة. رد الفعل هذا يكون عادة بسيطاً ومؤقتاً. إذا كان التهيج مزعجاً، حاول التخفيض من وتيرة العلاج، أو بالإمكان إستعمال كريم هيدروكورتيزون بتركيز منخفض من أجل إيقاف التهيج. إن هذا المستحضر قد يسبب الضرر، إذا إنسكب على: الملابس، القماش، المجوهرات أو المعادن، أو سطوح لامعة.

توقف عن إستعمال الدواء، توجه إلى الطبيب أو الصيدلي إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة.

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط «تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي» الموجود على الصفحة الرئيسية لوزارة الصحة (www.health.gov.au) الذي يوجهك للنموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية.

٥) كيفية تخزين أنهيدرول فورته

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال و/أو الرضع وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب!
- أغلق غطاء القنينة جيداً بعد الإستعمال.
- خزّن الدواء بشكل عامودي لتجنب الإنسكاب.
- لا يجوز تخزين الدواء بدرجة حرارة تزيد عن ٢٥ درجة مئوية.
- المستحضر قابل للإشتعال بسرعة، يجب التخزين بعيداً عن النار أو مصادر إشتعال.
- لا يجوز استعماله بجانب لهب النار أو مصادر اشتعال (سجائر مشتعلة، أو أي شيء قد يؤدي للإشتعال حتى الجفاف الكامل للمستحضر).
- لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العبوة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- لا يجوز رمي الدواء في المراض أو في القمامة المنزلية. إسأل الصيدلي خاصتك عن كيفية التخلص من مستحضرات لا حاجة لها. هذه الوسائل تحافظ على البيئة.

٦) معلومات إضافية

- يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً على: Industrial Methylated Spirit. 95%
- كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة
- تحتوي القنينة على ٦٠ ملل محلول جلدي من أنهيدرول فورته. للقنينة يوجد كرة مستديرة - رول أون وغطاء لولبة. المحلول رائق بدون لون ولا يحتوي على مواد معطرة.
- إسم صاحب الإمتياز وعنوانه: تروفارم للتسويق ١٩٨٥ م.ض.، المنطقة الصناعية پولج، ص.ب. ٨١٠٥، المنطقة الصناعية. جنوب نانتانيا.
- إسم المنتج وعنوانه: مختبرات درمال م.ض.، جوسمور هيرتس، إنكلترا.
- رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: ٦٠٣٨٢٧٢٥٢
- أقرت وزارة الصحة صيغة هذه النشرة ومحتواها فحص ورخص في تاريخ: أيار ٢٠١٣
- من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكور. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.