

אנהידרול פורטה

תמיסה בבקבוק "רול און"

חומר פעיל וריכוז:

החומר הפעיל הוא אלומיניום כלוריד הקסאהידראט
20% w/v (Aluminum Chloride Hexahydrate)

חומרים בלתי פעילים ואולרגנים: ראה פרק 6 "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תומצת על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

התרופה מיועדת לילדים, למבוגרים ולקשישים. עליון להשתמש בה בצורה נכונה. היועץ ברוקח אם הנך זקוק לפגישה נוסף. עליון לפנות לרופא באם הסימפטומים מחמירים.

1. למה מיועדת התרופה?

התרופה, אנהידרול פורטה הינה טיפול בהזעת יתר: בבית השחי, בידים או ברגלים.

החומר הפעיל אלומיניום כלוריד הקסאהידראט מפחית את הזיעה על-ידי חסימת בלוטות הזיעה בעור ופועל כדאדורנט על-ידי השמדת הבקטריות שגורמות לריח הגוף.

קבוצת תרופות: תרכובות אלומיניום וכלור.

2. לפני שהנך משתמש באנהידרול פורטה

⚠ אין להשתמש באנהידרול פורטה

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל או לאחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה. ראה פרק 6 למרכיבים בלתי פעילים בתרופה.

⚠ אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

- יש להגביל את המריחה לאזורים המזיעים בלבד, בבית השחי, בידים או ברגלים.
- הקד שאזורי העור שטיפולים יהיו **יבשים לחלוטין** לפני השימוש (ראה פרק 3).
- אל תמרח על עור סדוק או מגורה.
- בזמן הטיפול בבית השחי אל תגלה את השיער שבעת השחי ואל תשתמש בתכשיר כלשהו להורדת שיער מאזור זה, בתוך 12 שעות לפני או אחרי השימוש באנהידרול פורטה.
- המגע ממגע עם העיניים, האף והפה.
- **קרא שתוכן הבקבוק לא יישפך** שכן זה עלול לפגוע בך, בבגדיך ובחפצייך (ראה פרק 4).
- אל תנער את הבקבוק.
- אל תנסה להסיר את הגולה שמכסה את פי הבקבוק.
- הקד על סגירת מכסה הבקבוק בזמן שאינך משתמש בו.
- זיהורל החומר דליק מאוד. אין להשתמש ליד אש או מקור הצתה.

⚠ גילוח בית השחי/הסרת שיער

בזמן הטיפול בבית השחי אל תגלה את השיער שבעת השחי ואל תשתמש בתכשיר כלשהו להורדת שיער מאזור זה, בתוך 12 שעות לפני או אחרי השימוש באנהידרול פורטה.

⚠ שימוש בתרופות אחרות

אנהידרול פורטה אינו משפיע או מושפע משימוש בתרופות אחרות.

⚠ היריון והנקה

ניתן להשתמש בתכשיר בזמן ההיריון והנקה. מרכיבי התרופה בתכשיר זה ובתכשירים דומים הם בשימוש נרחב הרבה שנים ללא דיווחים על בעיות. עם זאת ניוסיו בטוחות לא בצבעה בתרופה.

⚠ נהיגה ושימוש במכוניות

לא ידוע כי השימוש בתרופה משפיע על יכולתך לנהוג או להשתמש במכונית.

3. כיצד להשתמש באנהידרול פורטה?

ילידים, מבוגרים וקשישים:

- אין לבלוע, לשימוש חיצוני בלבד.
- יש למרוח את התכשיר רק בבתי השחי, בידים או ברגלים.
- ווד שאזורי העור שטיפולו יהיו **יבשים לחלוטין** לפני השימוש באנהידרול פורטה.
- קד שאזורי הטיפול יהיו יבשים לחלוטין:

אד תתקח/אי לא תעשה אמצעים מיד לפני הטיפול.

- **יש למרוח את התכשיר בלילה רק לפני שהנך הולך לישון.** לפני כניסתך למיטה (זאת מכיון שבלוטות הזיעה שלך נטות להיות פחות פעילות כשהנך ישן).
- לפני השימוש בתרופה וודא שמכסה התרופה מוברג היטב, אחר-כך הטה את הבקבוק כדי להרטיב את הגולה שברול. **אל תנער את הבקבוק.**
- פתח את מכסה הבקבוק ומרח את הגולה באזורים המזיעים כנדרש.
- המתן עד שהגול יתייבש מעצמו (זה ייקח מס' דקות ספורות), אחר-כך רחץ את ידיו (אלא אם הטיפול הוא בידים).

- יש להישאר עם הטיפול כל הלילה, ורק בבוקר יש לרוחץ את האזורים המטופלים היטב.
- יש להשתמש באנהידרול פורטה באותו אופן במשך שני לילות רצופים ולאחר מכן להפסיק את ההמשך למשך שני הלילות הבאים.
- יש לחזור ולמרוח במשך שני לילות עם הפסקה נוספת למשך שני לילות לאחר מכן. יש להמשיך בטיפול המחזורי ככל שדרוש.
- פתח את הגבר, את תדירות הטיפול כדי להתאימה לצרכיך (שים לב, אם הנך חווה תופעות לוואי, כנראה שתדירות הטיפול גדולה מדי - ראה פרק 4).
- אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברוקח או ברופא.

שימוש בדאדורנטים או אנטיפרספירנטים אחרים

- השימוש בדאדורנטים או אנטיפרספירנטים רגילים **אינו הכרחי** בזמן השימוש באנהידרול פורטה. אם הנך רוצה להשתמש בתכשירים אלו עליו: **להשתמש בהם בלילה** בזמן שבהם **אין** משתמש באנהידרול פורטה **או** להשתמש בהם בבוקר שלמחרת **לא** לאחר שרצת את האנהידרול פורטה. יש לוודא שלפני השימוש הבא באנהידרול פורטה, רצת היטב את הדאדורנטים או האנטיפרספירנטים, ועורך **יבש לחלוטין** לפני השימוש באנהידרול פורטה.

אם התכשיר נכנס לעיניים או לפה

התכשיר עלול לגרום נזק אם הוא נכנס לעיניך או לפיך. שטוף את עיניך או פיך עם הרבה מים. בזמן שטוף פיך, שים לב שלא תשתמש בתרופה עליון השנייה. מיד אחר-כך פנה לבית חולים לטיפול.

אם השתמש בתכשיר בתדירות גבוהה מדי

שימוש יתר עלול לגרום לגירוי באזורים המטופלים. אם הנך סובל מגירוי, השתמש בתכשיר בתדירות נמוכה יותר וטפל בתסמיני הגירוי המתוארים בפרק 4.

אם שכחת לטול את התכשיר

אל תדאג אם שכחת לעיתים להשתמש בתרופה, המשך את הטיפול אחרי שמנחת.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש באנהידרול פורטה עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרה רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

תגובה שכחה לסוג טיפול כזה הינה **גירוי עורי ואדמומיות** באזור המטופל. תגובה זו בדרך-כלל קלה וזמנית. אם הגירוי מזיק, נסה להפחית את תדירות הטיפול, או שניתן להשתמש בקרם הידרוקורטיזון בריכוז נמוך כדי להפסיק את הגירוי.

התכשיר עלול לפגוע, אם הוא נשפך לך על: בגדים, בדים, תכשיטים או מתכות, או משטחים מבריקים.

הפסק את השימוש בתרופה. פנה לרופא או לרוקח אם אחת מתופעות הלוואי החמירות או אם אחת סובל מתופעת לוואי שלא הוזכרה בעלון זה.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי" עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il). המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי.

5. אין לאחסן את אנהידרול פורטה

מעט הערעלה והרפא וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל-ידי כך תימנע הערעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא!

- סגור את המכסה היטב לאחר השימוש.
- אחסן את התרופה במצב ניצב כדי למנוע שפיכה.
- אין לאחסן את התרופה בטמפרטורה העולה על 25°C.
- התכשיר **דליק מאוד**, יש לאחסן הרוקח מאש או מקורות הצתה.
- אין להשתמש בו ליד להבות או מקורות הצתה (סיגריות, בעורות, או כל דבר אשר עלול לגרום להצתה) עד ליבוש מוחלט של התכשיר.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date). המופיע על גבי האריזה.
- תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותה החודש.
- אין להשליך את התרופה לשירותים או לאשפה הביתית. שאל את הרוקח שלך כיצד להיפטר מתכשירים שאין בהם צורך. צעדים אלה יגנו על הסביבה.

6. מידע נוסף

- נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם: Industrial Methylated Spirit. 95%

- **כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:** הבקבוק מכיל 60 מ"ל תמיסה ערירית של אנהידרול פורטה. לבלבוק יש גולה - רול און ומכסה הברגה. התמיסה צלולה ללא צבע ואיננה ממיסה מכלי חומרי בישום. שם בעל הרישום וכתובתו: א.ת.א.ר.ת. שיווק 1985 בע"מ, פאקת תעשיות פולת, ת"ד 8105, א.ת.א.ר.ת. דרום תניה.
- שם יצרן ותכולתו: דרמל לברטוריום בע"מ, סמסור הרטס, אנגליה.
- מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות 603827252
- עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות בתאריך: מאי 2013.
- לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר.
- על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.