

يوليسكين محلول محلول

التركيب:

المواد الفعالة والتركيز: بوفيدون يودي 10% يعادل يود 1% (Povione Iodine 10% equivalent to iodine)
لقائمة المواد غير الفعالة: انظر البند ٦ "معلومات إضافية".
اقرأ النشرة بإمعان حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء.
حتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء.
إذا كانت لديك أسئلة إضافية، توجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي.
عليك استخدام المستحضر بشكل صحيح.
استشر صيدليًا إذا كنت بحاجة إلى معلومات إضافية.

لماذا مُعدّ الدواء؟

الدواء مُعدّ لتطهير التلوثات الجلدية، الجروح والحروق السطحية.
الفصيلة العلاجية مستحضرات تطهير.

٢. قبل استخدام الدواء

ⓧ يُمنع استخدام الدواء:

إذا كانت لديك حساسية للمادة الفعالة يود أو لأي من المكونات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء. لقائمة المواد غير الفعالة - انظر البند ٦ "معلومات إضافية".

تحذيرات خاصة متعلقة باستخدام الدواء

- يجب الامتناع عن الاستعمال على جلد مُصاب في مناطق واسعة.
- عليك استشارة الطبيب قبل بدء علاج جروح عميقة.
- إذا كانت لديك حساسية لطعام أو دواء أياً كان، عليك إبلاغ الطبيب قبل تناول الدواء.
- عليك استشارة الطبيب إذا كنت تعاني حالياً أو عانيت سابقاً من اضطراب في أداء الغدة الدرقية (التايروئيد) قبل بدء العلاج.
- ⓘ إذا كنت تتناول، أو تناولت مؤخراً، دواءً أخرى، بما فيها أدوية دون وصفة طبية ومكملات غذائية، أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك.
- ⓘ معلومات هامة عن قسم من مكونات الدواء
قد تترك مادة بوفيدون يودي الموجودة في المستحضر بقعاً على الملابس.

٣. كيف تستعمل الدواء؟

عليك أن تفحص مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا.

طريقة الاستعمال المتبعه غالبًا:

يجب دهن يودينور محلول على الجلد المُصاب ؛ حتى ٥ مرات يوميًا، حتى شفاء الجرح. لا تتجاوز الجرعة الدوائية الموصى بها. يُمنع الإلتعاقب الدواء مُعدّ للاستخدام الخارجي فقط. إذا أفرطت في استعمال الجرعة الدوائية أو إذا ابتلع الولد بالخطأ من هذا الدواء، توجهُ حالاً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ التابعة للمستشفى مصطحباً معك عبوة الدواء. لا تتناول الدواء في الظلمة! افحص اللاصفة والوجبة في كل مرة تتناول فيها الدواء. استخدم النظارات إذا كنت تحتاجها. إذا كانت لديك أسئلة أخرى فيما يتعلق باستخدام الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

٤. الأعراض الجانبية:

مثل أي دواء، يمكن أن يسبب استخدام يودينور محلول أعراضاً جانبية لدى بعض المستخدمين. لا تفزع لدى قراءة قائمة الأعراض الجانبية. فقد لا تعاني من أي منها.

يجب التوقف عن الاستخدام والتوجه للطبيب:

- في حالة حدوث تهيج أو انتفاخ متواصلين (نادر)
- أعراض جانبية أخرى: طمخ. إذا تفاقم أي من الأعراض الجانبية، أو حين تعاني من عارض جانبي لم يُذكر أعلاه، عليك استشارة الطبيب.
- يمكن إبلاغ وزارة الصحة عن الأعراض الجانبية عبر الاستمارة الإلكترونية للتبليغ عن أعراض جانبية، الموجودة في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة:
www.health.gov.il

أو عبر النقر على الرابط:

<https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il>

٥. كيف تخزن الدواء؟

- امنع التسعم! يجب حفظ هذا الدواء وأي دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال والرضع، وذلك لتفادي التسعم. لا تسبب التفوي دون تعليمات صريحة من الطبيب.
- يُمنع استخدام الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على ظهر العبوة.
- تاريخ انتهاء الصلاحية هو اليوم الأخير من الشهر المُشار إليه.
- احفظه في مكان بارد، في درجة حرارة تقل عن ٢٥ درجة مئوية.
- أغلقه بإحكام، وامنع تسرب الهواء والرطوبة.
- احفظه في العبوة الأصلية.
- يمكن استخدام المنتج بعد فتحه، حتى تاريخ انتهاء الصلاحية.

٦. معلومات إضافية

فضلاً عن المواد الفعالة. يحتوي الدواء أيضاً على Purified water, Disodium Hydrogen Phosphate, Citric Acid

كيف يبدو الدواء، وماذا تحوي العبوة. محلول صافٍ ذو لون بني غامق

المحتوى: ٢٠ مل

المنتج وصاحب التسجيل:

بن شمعون فلوريش م.ض.، المنطقة الصناعية مسغاف، بريد منجول مسغاف ٢٠١٧٤٠٠.
تم فحص هذه النشرة والمصادقة عليها من قبل وزارة الصحة بتاريخ: ١٧،٨،٢٠١٥
رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة: ١٣٤٠٧٣١٣٦٧
من أجل التبسيط وتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المنكر. على الرغم من ذلك،
الدواء معد لأبناء كلا الجنسين.