

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים

(תכשירים) התשמי"ז - 1986

התרופה משוקת ללא מרשם רופא

פוליסקין תמיסה

תמיסה

הרכב: החומרים הפעילים וריכוזם:

פובידון יודין 10% (שווה ל- יודין 1%
(Povione Iodine 10% equivalent to iodine 1%)

לרשימת החומרים הבלתי פעילים:

ראה סעיף 6 "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.

עלון זה מביא מידע מצייתי על התרופה. יש אם לך שאלות נוספות,
פנה אל הרופא או אל הרוקח. עליך להשתמש בתכשיר בצורה נכונה.
היוועץ ברוקח אם הנך זקוק למידע נוסף.

1. למה מיועדת התרופה?

לחיטוי בדיהומה העור - לפצעים וכוויות שטחיות.

קבוצה תרופטית - תכשירים אנטיספטיים (מחטאים).

2. לפני שימוש בתרופה

X אין להשתמש בתרופה:

• אם אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל יוד או לכל אחד
מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה. לרשימת
החומרים הבלתי פעילים - ראה סעיף 6 "מידע נוסף".

! אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

- יש להימנע משימוש על איזורים נרחבים של עור פגוע.
- יש להיוועץ ברופא לפני טיפול בפצעים עמוקים.
- אם הנך רגיש למזון כלשהו או לתרופה כלשהי,
עליך להודיע על כך לרופא לפני נטילת התרופה.

אין להשתמש מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול אם הנך
סובל או סבלת בעבר. • מליקוי בתפקוד בלוטת התריס (תירואיד).

! אם אתה לוקח, או אם לוקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל
תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

! מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה:

החומר פובידון יודין הנמצא בתכשיר עלול להכתים את הבגדים.

! הריון והנקה:

• אם הינך בהריון או מניקה, יש להיוועץ ברופא או לרופא לפני
השימוש בתרופה.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח.

המינון המקובל בדרך כלל הוא: יש למרוח פוליסקין תמיסה
על עור פגוע 4-5 פעמים ביום, עד ריפוי הפצע.

אין ללבוש על המנה המומלצת. אין לבלוע.

התרופה מיועדת לשימוש חיצוני בלבד.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד
לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך. אין
ליטול לתרופות בחוש! בדוק התוויות והמנה בכל פעם שהנך נוטל
תרופה. הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם. אם יש לך שאלות נוספות
בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי:

כמו בכל תרופה, השימוש בפוליסקין תמיסה עלול לגרום לתופעות
לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי.
ייתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

יש להספיק את השימוש ולפנות לרופא:

• במקרה של גירוי או נפיחות מתמשכים (דיר).

תופעות לוואי נוספות: פריחה. אם הופיעה תופעת לוואי, אם
אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי
שלא הזכרנה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא מיד. ניתן לדווח על

תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות הטופס המקוון לדיווח על
תופעות לוואי שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות
www.health.gov.il

5. אין לאחסן את התרופה?

• מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור
מחוץ לרישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה.
אל לגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

• אין להשתמש בתרופה אחרת תאריך התפוגה (exp. date) המופיע
על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

• סגור היטב ומנע חדירת אוויר ורטיבות.
• אחסן באריזה המקורית • אחסן במקום קריר, מתחת ל- 25°C.

• ניתן להשתמש במוצר לאחר הפתיחה, עד שפג תוקפו.
6. מידע נוסף: נוסף על החומרים הפעילים התרופה מכילה גם:
Purified water, Disodium Hydrogen Phosphate, Citric Acid

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

תמיסה צלולה בצבע חום כהה • תכולה: 20 מ"ל

היצרן ובעל הישום: בן-שמעון פלוריש בע"מ,

פארק תעשייה משגב, ד.ב. משוב 2017400.

עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות בתאריך: 17.08.2015.
מספר ירושם התרופה בפקנס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

1340731367

לשם הפרשתו ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר.

על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

