

Инструкция по применению в соответствии с Положениями фармацевтов (препараты) 1986 г.
Безрецептурный препарат

Раствор “Полискин”

Раствор

Состав:

Активные ингредиенты и их концентрация:
Повидон-йод 10%, аналогичен йоду 1% (Povidone Iodine 10% equivalent to iodine 1%).
Для ознакомления со списком неактивных ингредиентов см. пункт 6: “Дополнительная информация”. **Перед применением препарата внимательно прочтите инструкцию полностью.**
Данный вкладыш содержит краткую информацию о препарате. Если у вас имеются дополнительные вопросы, обращайтесь к врачу или к фармацевту.
Предназначен для взрослых, детей и подростков. Используйте данный препарат надлежащим образом. Если вам необходима дополнительная информация, проконсультируйтесь с фармацевтом.

1. Для чего предназначен препарат?

Для дезинфекции кожных инфекций: ран и поверхностных ожогов.

Терапевтическая группа

Антисептические препараты (дезинфицирующие).

2. Перед применением препарата

Не применяйте препарат:

- если у вас имеется чувствительность (аллергия) к активному ингредиенту или к любому из дополнительных ингредиентов, содержащихся в препарате. Для ознакомления со списком неактивных ингредиентов см. пункт 6: “Дополнительная информация”

Особые предостережения относительно использования данного препарата

- Избегайте применения на обширных участках поврежденной кожи.
- Перед обработкой глубоких ран необходимо проконсультироваться с врачом.
- Если у вас имеется чувствительность к какому-либо пищевому продукту или лекарству, сообщите об этом врачу перед приемом препарата.

Не использовать без предварительной консультации с врачом, если вы страдаете или страдали в прошлом от:

- нарушения функции щитовидной железы

⚠ Если вы принимаете или недавно принимали другие препараты, включая безрецептурные препараты и пищевые добавки, сообщите об этом врачу или фармацевту

⚠ Важная информация о некоторых ингредиентах лекарства: Повидон-йод, который содержится в препарате, может оставлять пятна на одежде.

• **Беременность и грудное вскармливание:** проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом перед использованием препарата, если вы беременны или кормите грудью.

3. Как применять лекарственный препарат?

Если вы не уверены в том, как следует применять препарат, обращайтесь к врачу или фармацевту.
Стандартная дозировка: Наносите раствор “Полискин” на поврежденный участок кожи 4-5 раз в день до заживления.

Не превышайте рекомендуемую дозу. Не глотать. Препарат предназначен только для наружного применения. В случае передозировки или если препарат случайно проглотил ребенок, немедленно обратитесь к врачу или в приемный покой больницы и принесите с собой упаковку препарата. Не принимайте лекарства в темноте!

Проверяйте этикетку и дозу при каждом приеме препарата. Наденьте очки, если вы в них нуждаетесь. Если у вас имеются дополнительные вопросы в отношении применения препарата, обращайтесь к врачу или к фармацевту.

4. Побочные явления

Как и любое другое лекарство, раствор “Полискин” может вызвать у некоторых людей побочные явления.

Не пугайтесь, читая список побочных явлений. Возможно, ни одно из них у вас не проявится.

Прекратите применение и обратитесь к врачу:

- в случае длительного раздражения или отека (редко).

Дополнительные побочные явления: Сыпь. Если развилось новое побочное явление, если одно из побочных явлений ухудшается или если вы страдаете от побочных явлений, не упомянутых в инструкции, просьба незамедлительно проконсультироваться с врачом.

О побочных явлениях можно сообщить посредством специализированной он-лайн формы, которая находится на домашней странице сайта Министерства здравоохранения www.health.gov.il или по следующей ссылке:

<https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il>

5. Как хранить препарат?

- Избегайте отравления! Данный препарат и любые другие лекарства необходимо хранить в закрытом и недоступном для детей и/или младенцев месте во избежание отравления. Не вызывайте рвоту без четкого указания врача.
- Не используйте лекарство после истечения срока годности (exp. date), указанного на упаковке. Срок годности относится к последнему дню указанного месяца.
- Храните препарат в прохладном месте при температуре не выше 25°С.
- Плотно закрывайте, чтобы избежать проникновения воздуха и влажности.
- Хранить в оригинальной упаковке.
- После вскрытия упаковки можно использовать препарат до истечения срока годности

6. Дополнительная информация

Помимо активных веществ, препарат содержит также следующие: дистиллированная вода, гидрофосфат натрия, лимонная кислота.

Внешний вид препарата и содержание упаковки
Прозрачный раствор темно-коричневого цвета
Содержимое: 20 мл

Производитель и владелец лицензии:
“Бен-Шимон Флориш” Лтд., промышленный парк Мисгав, полевая почта: Мисгав 2017400.

Данная инструкция была проверена и утверждена Министерством здравоохранения 17.08.2015

Номер регистрации фармацевтического препарата в государственном реестре лекарств Министерства здравоохранения: 1340731367