نشرة للمستهلك وفق أنظمة الصيدلة (مستحضَرات) ١٩٨٦

يجري تسويق الدواء دون وصفة طبيّة

سيبتادين
محلول

التركيب:

المواد الفعالة والتركيز:
غلوكُونات كلورهكسيدين 0.5% w/v
(Chlorhexidine gluconate 0.5% w/v)
كحول 70% v/v (Alcohol 70% v/v)

لقائمة الموادّ غير الفعالة: انظر البند 6 "معلومات إضافيّة".

اقرأ النشرة بإمعان حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء.

تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدّواء.

إذا كانت لديك أسئلة إضافيّة، توجّه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي.

عليك استخدام المستحضَر بشكل صحيح.

استشر صيدليًا إذا كنتَ بحاجة إلى معلومات إضافيّة.

١. لماذا مُعدّ الدواء؟

الدواء مُعدّ لتطهير اليدين بسرعة.

الفصيلة العلاجية مستحضَرات تطهير.

٢. قبل استخدام الدواء

☒ **يُمنع استخدام الدواء:**

- **إذا كانت لديك حساسيّة للموادّ الفعالة أو لأيّ من المكوّنات الإضافيّة التي يحتوي عليها الدواء. لقائمة الموادّ غير الفعالة - انظر البند 6 "معلومات إضافيّة".**
- عن الأنسجة الدماغية، غشاء المخ، والأذن الوسطى
- **هذا الدواء ليس مخصصاً للرضّع دون عمر شهرين**

تحذيرات خاصّة متعلّقة باستخدام الدّواء

- يجب الامتناع عن ملامسة العينين.

في حال الملامسة، يجب الغسل باستخدام الكثير من الماء.

إذا كانت لديك حساسية لطعام أو دواء أيًّا كان.

عليك إبلاغ الطبيب قبل تناول الدواء.

- يمنع اشعال سيجارة او التعرض للنار قبل جفاف المستحضر بشكل تام.

إذا كنتَ تتناول، أو تناولتَ مؤخرًا، أدوية أخرى، بما فيها أدوية دون وصفة طبية ومكمّلات غذائيّة، أخبِر الطبيب أو الصيدلي بذلك.

معلومات هامّة عن قسم من مكوّنات الدواء
يحتوي على الكحول، مادّة قابلة للاشتعال.

٣. كيف تستعمل الدواء؟

عليك أن تفحص مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكّدًا.

طريقة الاستعمال المتبعه غالبًا:

ضع ٣ مليلتر من المُستحضَر على يدَين نظيفتَين،
قم بنثر السائل على مسطحات اليدين،
وبفرك اليدين معًا حتى تتطاير المادة كليًا.

لا تتجاوز الجرعة الدوائية الموصى بها.

يُمنع الابتلاع. الدواء مُعدّ للاستخدام الخارجي فقط.

إذا أفرطت في استعمال الجرعة الدوائية أو إذا ابتلع الولد بالخطأ من هذا الدواء، توجّهْ حالًا إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ التابعة للمستشفى مصطحِبًا معك عبوة الدواء.

لا تتناول الدواء في الظلمة! افحص اللاصقة والوجبة في كل مرّة تتناول فيها الدواء. استخدم النظارات إذا كنتَ تحتاجها.

إذا كانت لديكَ أسئلة أخرى فيما يتعلّق باستخدام الدواء، استشِر الطبيب أو الصيدلي.

٤. الأعراض الجانبية:

مثل أيّ دواء، يمكن أن يسبّب استخدام سيبتادين أعراضًا جانبية لدى بعض المستخدِمين. لا تفزع لدى قراءة قائمة الأعراض الجانبيّة. فقد لا تعاني من أيٍّ منها.

يجب التوقّف عن الاستخدام والتوجّه للطبيب:

- في حالة حُدوث حساسية في الجِلد (نادر)

أعراض جانبية أخرى

احمرار وتهيّج موضعي.

إذا تفاقم أيٌّ من الأعراض الجانبية.

أو حين تعاني من عارِض جانبيّ لم يُذكر أعلاه.

عليك استشارة الطبيب.

الإبلاغ عن الأعراض الجانبية

يمكن إبلاغ وزارة الصحّة عن الأعراض الجانبية عبر الاستمارة الإلكترونية للتبليغ عن أعراض جانبية. الموجودة في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحّة:
www.health.gov.il

أو عبر النقر على الرابط:
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il

٥. كيف تخزّن الدواء؟

- امنع التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وأيّ دواء آخر في مكان مغلق بعيدًا عن متناول أيدي الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي التسمم. لا تسبب التقيؤ دون تعليمات صريحة من الطبيب.
- يُمنَع استخدام الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. Date) الظاهر على ظهر العبوّة. تاريخ انتهاء الصلاحية هو اليوم الأخير من الشهر المُشار إليه.
- احفظه في مكان بارد، في درجة حرارة تقلّ عن ٢٥ درجة مئويّة.
- أغلِقه بإحكام ، وامنع تسرّب الهواء والرطوبة.
- تحذير! مادة قابلة للاشتعال، أبعِد عن النار!
- احفظه في العبوة الأصلية.
- يمكن استخدام المنتج بعد فتحه، حتى تاريخ انتهاء الصلاحية.

٦. معلومات إضافيّة

فضلًا عن الموادّ الفعالة، يحتوي الدواء أيضًا على

Glycerin, Propylene Glycol,
Methylene Blue, Purified water.

كيف يبدو الدواء، وماذا تحوي العبّوة

محلول ذو لون أزرق
المحتوى: ٥٠٠ مليلتر، ١٠٠٠ مليلتر

المُنتِج وصاحب التسجيل:

بن شمعون فلوريش م.ض.، المنطقة الصناعية مسغاف، بريد متجوّل مسغاف ٢٠١٧٤٠٠.

فحصت هذه النشرة وصادقت عليها وزارةُ الصحة بتاريخ: ٣١,١٢,٢٠١٥

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة: ١٠٨٥٨٢٩٢٥٣

من أجل التبسيط وتسهيل القراءة، تمّت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكّر.

على الرغم من ذلك، الدواء معد لأبناء كلا الجنسين.