

**Инструкция по применению в  
соответствии с Положением  
о фармацевтах (препараты) 1986 г.**

Препарат распространяется без  
рецепта врача

## **Септадин**

Раствор

**Состав:**

**Активные ингредиенты и их концентрация:**  
Хлоргексидина биглюконат 0,5%  
(Chlorhexidine Digiunconate w/v 0.5%)  
Спирт 70% (Alcohol 70%).

**См. список неактивных ингредиентов  
в п. 6: "Дополнительная информация".**  
**Перед использованием  
препарата внимательно прочтите  
инструкцию до конца.**

Данный вкладыш содержит краткую  
информацию о препарате.  
Если у вас имеются дополнительные  
вопросы, обращайтесь к врачу или к  
фармацевту. Вы должны использовать  
данный препарат правильным  
образом. Если вам необходима  
дополнительная информация,  
проконсультируйтесь с фармацевтом.

**1. Для чего предназначен данный  
препарат?**

Препарат предназначен для быстрой  
дезинфекции рук.

**Терапевтическая группа**

Антисептические препараты.

**2. Перед использованием препарата**

**☒ Не используйте препарат:**

- если у вас имеется чувствительность (аллергия) к активному ингредиенту или к любому из дополнительных ингредиентов, содержащихся в препарате.

Для информации о неактивных ингредиентах см. пункт 6:  
**"Дополнительная информация"**

- на мозговой ткани, мозговой оболочке и в среднем ухе.
- Младенцам в возрасте до двух месяцев.

**☐ Особые предостережения  
относительно применения данного  
препарата**

- Избегайте контакта с глазами. В случае контакта с глазами тщательно промойте глаза большим количеством воды.
- Если у вас имеется чувствительность к какому - либо пищевому продукту или лекарству, сообщите об этом врачу перед применением препарата.
- Не зажигать сигарету и не подвергать воздействию огня до полного высыхания продукта.

**☐ Если вы принимаете или недавно  
принимали другие препараты,  
включая безрецептурные препараты  
и пищевые добавки, сообщите об  
этом врачу или фармацевту.**

**☐ Важная информация о некоторых  
ингредиентах лекарства**

Содержит спирт - горючий материал.

**3. Использование лекарственного  
препарата**

Если вы не уверены в том, как надо  
использовать препарат, обращайтесь  
к врачу или фармацевту.

**Инструкция по применению:**

Налейте 3 мл препарата на чистые  
руки, распределите его по всей  
поверхности рук и растирайте до  
полного испарения.

**Не превышайте рекомендуемую дозу.**

Не глотать. Препарат предназначен  
только для наружного применения.  
В случае передозировки или если  
препарат случайно проглотил ребенок,  
немедленно обратитесь к врачу или  
в приемный покой больницы и  
принесите с собой упаковку препарата.  
Не принимайте лекарства в темноте!  
Проверяйте этикетку и дозу при каждом  
приеме препарата. Наденьте очки,  
если вы в них нуждаетесь.

Если у вас имеются дополнительные  
вопросы в отношении использования  
препарата, обращайтесь к врачу или  
к фармацевту.

**4. Побочные явления:**

Как и любое другое лекарство,  
"Септадин" может вызвать у некоторых  
людей побочные явления.

Не пугайтесь, читая список побочных  
явлений. Возможно, ни одно из них у  
вас не проявится.

**Прекратите использование и  
обратитесь к врачу:**

- в случае чувствительности на коже (редко).

**Дополнительные побочные явления:**  
покраснение и местное раздражение.

Если одно из побочных явлений  
усиливается или если вы страдаете от  
побочных явлений, не упомянутых в  
инструкции, просьба  
проконсультироваться с врачом.  
О побочных явлениях можно сообщить  
посредством специализированной  
он-лайн формы, которая находится  
на домашней странице сайта  
Министерства здравоохранения  
[www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)

или по следующей ссылке:

<https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdverseEffectMedic@moh.gov.il>

**5. Как хранить препарат?**

- Избегайте отравления! Данный препарат и любые другие лекарства необходимо хранить в закрытом и недоступном для детей и/или младенцев месте во избежание отравления. Не вызывайте рвоту без четкого указания врача.
- Не используйте лекарство после истечения срока годности (exp. date), указанного на упаковке. Срок годности относится к последнему дню указанного месяца.
- Храните препарат в прохладном месте при температуре ниже 25°C.
- Плотно закрывайте, чтобы избежать проникновения воздуха и влажности.
- Осторожно! Горючее вещество.  
Хранить вдали от огня.
- Хранить в оригинальной упаковке.
- После вскрытия упаковки можно использовать препарат до истечения срока годности.

**6. Дополнительная информация**

Помимо активных веществ, препарат  
содержит также:

Глицерин, пропиленгликоль,  
метиленовый синий,  
дистиллированная вода.

**Внешний вид раствора и содержание упаковки**  
Раствор синего цвета  
Упаковка по 500 мл, 1000 мл

**Производитель и владелец лицензии:**  
"Бен - Шимон Флориш" Ltd.,  
промышленный парк Мисгав,  
ПОС: Мисгав 2017400.

Данная инструкция была проверена и  
утверждена Министерством

здравоохранения Израиля 31.12.2015

Номер регистрации фармацевтического  
препарата в государственном  
реестре лекарственных препаратов

Министерства здравоохранения  
Израиля: 1085829253