

טאף 25% וטרינרי TAF 25 % Veterinary תמיסה למי שתייה

1. הרכב: Thiamphenicol 250 mg/ml

2. התוויות:

בפטמים: לטיפול בזיהומים של מערכות הנשימה והמעיים, הנגרמים בעיקר ע"י חיידקים גרם חיוביים וגרם שליליים, מיקופלסמה וכלמידיה.

3. תופעות לוואי:

יתכנו תופעות לוואי במערכת העיכול כגון: בחילה, הקאה, שלשול וכן תופעות לוואי עוריות (פריחה). הסימפטומים נעלמים בסוף הטיפול.

4. התוויות נגד:

- אין לטפל בתרופה זו במקביל לאנטיביוטיקות אחרות בעלות פעילות בקטריצידיית כגון פניצילינים וצפלוספורינים.
- אין להשתמש בתרנגולות מטילות.
- אין להשתמש אם ידועה רגישות יתר לחומר הפעיל, או לחומרים הבלתי פעילים שבתכשיר. לרשימת החומרים הבלתי פעילים עיין בסעיף 11
- אין להשתמש במקרים של עמידות ל Thiamphenicol
- אין לעבור על המנה המומלצת

5. מינון ודרך מתן התרופה:

- יש לתת את התרופה במי השתיה, על פי הוראות הוטרינר, יש להקפיד לא לעבור על המנה היומית המומלצת של מ"ג חומר פעיל/לק"ג משקל גוף. יש לקבוע את משקל הגוף במדויק בכדי להבטיח מינון מתאים.
- יש למהול בזהירות את התרופה במי השתיה על פי ההנחיות הבאות:
 - המנה המומלצת היא 1.6–2.0 מ"ל של טאף 25% ל-10 ק"ג משקל גוף (שווה ערך ל-40–50 מ"ג של Thiamphenicol לק"ג משקל גוף, אשר הם כ-80–125 מ"ל ל-100 ליטר מים) למשך 3–5 ימים רצופים.
 - שפוך את תכולת המים הקודמת ותן את המים שעברו מיהול עם התכשיר כמקור שתייה יחיד. כאשר נצרכו כל המים עם התרופה, מלא מחדש את המיכל עם מים ללא התרופה.
 - מומלץ להשאיר את הפטמים ללא מים לכמה שעות לפני מתן הטיפול.

אין לעבור על המנה המומלצת!

6. זמן המתנה לשחיטה לבשר: 4 ימים.

7. אזהרות מיוחדות:

בליעת התרופה על ידי החיות עשויה להשתנות כתוצאה ממחלתן. בפרטים אשר צורכים כמות קטנה של מי שתייה, יש לעבור לטיפול בהזרקה באמצעות תכשיר אחר המתאים לכך.

יש להימנע ממתן טיפולים ממושכים, או חזרה על טיפולים, באמצעות שיפור תחזוקת בעלי החיים וכן ניקיון וחיטוי יסודיים של סביבתם.

אמצעי זהירות מיוחדים בשימוש בתכשיר בבעלי חיים:

בשל שוני אפשרי במידת הרגישות של החיידקים ל Thiamphenicol, מומלץ לבצע בדיקה בקטריולוגית ובדיקת רגישות. שימוש לא מתאים בתכשיר עלול להביא לעליה בשכיחות הימצאותם של חיידקים עמידים ל Thiamphenicol. אין לאפשר גישה של בעלי חיים אחרים למים המכילים את התרופה.

על המטפל לנקוט באמצעי הזהירות המיוחדים הבאים:
מומלץ להימנע ממגע ישיר עם התכשיר במהלך הטיפול בו. אם ידועה רגישות יתר של האדם לחומר הפעיל Thiamphenicol – עליו להימנע מכל מגע עם התכשיר הוטרינרי.
אין לבלוע את התכשיר; במקרה שהדבר קרה בטעות – יש לפנות לקבלת עזרה רפואית מיידית ולהציג את תווית התכשיר לרופא.

8. תגובות בין תרופתיות:

אין לטפל בתרופה זו במקביל לאנטיביוטיקות אחרות בעלות פעילות בקטריצידיית כגון פניצילינים וצפלוספורינים.

אין לערבב תרופה זו עם תרופות אחרות – היות ולא קיימים מחקרים בנושא זה.

9. חיי מדף: 36 חודשים. אין להשתמש לאחר תאריך התפוגה המופיע על האריזה. לאחר הפתיחה הראשונה ניתן להשתמש במשך 3 חודשים

10. אחסון:

- בטמפרטורת החדר מתחת ל- 25°C. יש לשמור את התכשיר סגור באריזתו המקורית.
- הרחק מהישג ידם של ילדים.
- המנע ממגע ישיר עם התכשיר בזמן השימוש.

Storage: Store at a room temperature not exceeding 25°C.

Keep the medicine closed in its original package.

Keep out of reach of children.

Avoid direct contact with the product while handling it.

After first opening of pack, use within three months.

11. רשימת החומרים הבלתי פעילים: N,N Dimethylacetamide, Propylene glycol

היצרן: Chemifarma S.P.A, Forly, Italy

היבואן ובעל הרישום: רומט בע"מ, המעפילים 39/104, הרצליה 46543.

מספר הרישום: 142-30-92419-00

פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר על ידו

לשימוש וטרינרי בלבד

1 ליטר

