

دكسامول كولد للعلاج في النهار، حبسولات

نَشْرَةٌ طَبِيعَةٌ لِلْمُسْتَهَلِكِ بِمَوْجَبِ أَنْظَمَةِ الصِّيَادَلَةِ (مُسْتَحْضَرَاتٍ) - ١٩٨٦

يُسوق الدواء بدون وصفة طبية
كل حسولة تحتوي على:

- أو مضادات احتقان أخرى.

 - كُنت مُعَالَجًا في نفس الوقت بأدوية من المجموعات التالية: مثبطات مونامين أوسيكسازان MAOIs (على سبيل المثال لعلاج الاكتئاب) أو خلال ١٤ يوم من إيقاف العلاج بها: **SSRIs** (مثباتات امتصاص السيروتونين الإنقلياني)، مثباتات احتقان، أدوية أخرى ضد السعال ونزلات البرد، محصرات بيتا (على سبيل المثال لعلاج مشاكل القلب أو فرط ضغط الدم).
 - لا يجوز استعمال المستحضر الخفيف للسعال المزمن.
 - لا يجوز استعمال هذا المستحضر في نفس الوقت مع مستحضرات أخرى التي تحتوي على ياراسيتامول. (إذا لم تكن متأكداً بأن الدواء الذي تتناول يحتوي على ياراسيتامول، اشتظر الطبيب أو الصيدلي).
 - كانت تعاني من الأمراض أو الأعراض التالية: فرط ضغط الدم، مرض قلبي أو في الأوعية الدموية، ضرر وحش في القلب أو الكلية، نشاط مفرط لغدة الدرقية (التيروكوريد)، ضغط مرتفع داخل العين (جلوكونما)، مشاكل في غدة الپروستات، سعال مصحوب ببلغم زاند أو يسمى اللكتير من الوقت، صعوبات تنفس، مرض رئوي أو سكري.

يُسوق الدواء بدون وصفة طبيب كل جبسولة تحتوي على:

باراسيتامول	٣٢٥ ملجم
جو أفيبرين	٢٠٠ ملجم
بِسُوسُوْدِينْ هِيدِرُوكُلُورِيد	٢٥ ملجم
دِكْسْتِرُوْبِرِوْفِانْ هِيدِرُوبِرِوْمِيد	١٦ ملجم
Paracetamol	325 mg
Guaifenesin	200 mg
Pseudoephedrine HCl	25 mg
Dextromethorphan Hydrobromide 10 mg	

لائمة المواد المفعالة في المستحضر - انظر بند ٦.

اقرأ النشرة يماعن حتى نهايتها قبل أن تستعمل الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخصة عن الدواء إذا كانت لديك أسئلة إضافية، اسأل الطبيب أو الصيدلي.

هذا الدواء مخصوص للبالغين والأطفال فوق جيل ١٢. يقتضي تناول هذا الجيل يجب صحّي استشر الطبيب أو عليك استعماله بشكل صحيح استشر الطبيب أو الصيدلي إذا كنت بحاجة لمعلومات إضافية.

يجب التوجه إلى الطبيب إذا ساءرت السخونة أكثر من ٣ أيام أو إذا ثقلت أعراض المرض أو أنها لا تتحسن بعد ٤ أيام بل على عزم استعمال الدواء أو في

١. لأي غرض مخصص الدواء؟

لتحفيظ أعراض نزلات البرد، السعال واحتقان الأنف المصحوب بسخونة وألم، للعلاج النهار.

الفصيلة العلاجية:

- مسكن الام وحاف
للسخونة .
الغثيان .

- جوافييرين - مادة معتفعة ساسع
- التخلص من البغum والإفرازات التي تتدلى في المجرى التنفسية نتيجة لنزلات البرد
- سودوافييرين هيدروكلوريد - أمين
- للأعصاب الوبية يعمل على تخفيف الرعشة
- احتقان الأنف والأذنين، المصحوبة بتنفس

٢. قبل استعمال الدواء:

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- كنت حامل أو مرضعة.
- كنت تحت جيل ١٢ سنة.
- كنت حساس للمواد الفعلية (باراسيتامول، بسوسودافيردين، جوفافينزرين أو دكسترونتورفان)، أو لأحد من كات الدو

- لا يجوز استعمال هذا الدواء بفترات متقاربة دون استشارة الطبيب.
 - امتنع عن تناول جرعة عالية (حتى ضمن الحدود الموصى بها) من هذا الدواء وقت الصوم.
 - تحتوى المستحضر على باراسيتوالون الذي قد سبب ضرر الكبد والثدي في الحالات التالية: أطعى بجرعة أعلى من الموصى بها أو لفترة متواصلة شرب مشروبات كحولية خلال فترة العلاج أو عند تناول الوجبة الإضافية التي توفر في كل الكبد.
 - لا يجوز تناول أدوية إضافية لتخفيض السخونة، وتسكين الآلام، أو أدوية للشيخ بدون إستشارة الطبيب أو الصيدلي - لمنع جرعة مفرطة يتسم من الباراسيتوالون.
 - لا يجوز تناول أدوية إضافية من عائلة "الكلاميدين" وإن مستحضرات إضافية التي تحتوى على باراسيتوالون.
 - إذا طرأت في الماضي اعراض جانبية جانبية نتيجة تناول مستحضرات التي تحتوى على باراسيتوالون، لا يجوز تناول مستحضرات التي تحتوى على باراسيتوالون، لكنكي لا تحدث مجددًا اعراض جانبية وخيبة.
 - إذا كنت بصدى إجراء فحص بول، عليك اعلام الطبيب عن تناول هذا الدواء بما ان العلاج بالوالق قد يشوّش نتائج الفحص، يجب اعلام الطبيب أياً إذا أتيت بمخرجاً العلاج بالداء.
 - إذا كنت تتناول، أو تناولت في الأونة الأخيرة أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة، واسفافات، تقنية، أغير الطبيب أو الصيدلي بذلك، على وجه السرعة يجب اعلام الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تتناول:
 - أدوية التي تحتوى على الجهاز العصبي المركزي (مثل: مستحضرات منظمة الشهادة، مستحضرات لعلاج الاختناق أو الرغبة، أدوية للحساسية أو أدوية التي تسبب التعرض المزمن للجلد مثل: أدوية ضد الاكتمال مثل: من فصيلة الالاتية، الفلقة Tricyclic، الادميوكلينتين، والترم.
 - أمونيوماً، أو أدوية تدخل الماء (وارفارين).
 - ميلتوكاربولاً، أو أدوية أخرى تحتوى على مثبطات الماء ولعلاج مشكلات قلب (مثل: محمرات القاء، أمونوران، ديجوكسين أو كوبينين)، أو أدوية التي تسترخ، فيتوريوت، أو كاريلمازرين (المستعملة بشكل محدود في الأدوية الصدرية، التي تتضمن مشكلات قلبية، أو أدوية إضافية لعلاج الشذوذات التي يسببها الباراسيتوالون: ريفايسين (ضد حيوى)، بروبيسيدين (ضد الفرجون)،
 - سبيرون، و سالبيلات، آخر أدوية إضافية لتكمين الآلام أو تخفيف السخونة، مضادات التهاب غير سteroidية، أو أدوية للإسهاب، المفاصل، أدوية لعلاج الصداع النصفي (Ergot, alkaloids).
 - ميتووكيراميد أو دوميربيديون (العلاج العقلي، التقييم، ومشكلة مزيدة أخرى)، كوليستيرلين، التي تحتوى على كوليستيرول في الماء، التي قد تسبب حفنة في الوجه جبوب لمنع الحبل، أو كوكسيتون، (التسرع واللاؤة، ووقف النزف المفاجئ بعد الالهاد).
 - لا يجوز تناول هذه الأدواء سوية مع مستحضرات أخرى تحتوى على باراسيتوالون، من حيثات SSRLs، (MAOIs)، أو كوكسيدان.

- أعراض جانبية اضافية:**

الم رأس، غثيان، تقيؤ، سعال، أحلام سيئة، رئتين في الآخرين، شعور بالتوتر، رجفة.

إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية، أو عندما تتعافى من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليه استشارة الطبيب.

٥. كيفية تخزين الدواء؟

 - تجنب التسمم: يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال، لا الرضيع ونظرهم، وبذلك تمنع التسمم، لا تسبب التخدير دون تعليمات صريحة من الطبيب.
 - لا يجوز استعمال الدواء بعد انتهاء الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية يرجع إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
 - يجب تخزين الدواء بدرجة حرارة أقل من 25 درجة مئوية.
 - خزن بالعبوة الأصلية.

٦. معلومات إضافية

اضافة إلى المادة الفعالة، بحتوي الدواء
أيضاً على:

Croscarmelloose sodium, talc, povidone, hypromellose, magnesium stearate, titanium dioxide, silica colloidal anhydrous, methylcellulose, macrogol, carnauba wax, pigments: E-133, E-124, E-104.

كل حبسولة تحتوي على ما يقارب ٣ ملجم صوديوم.

كيف يبدو الدواء وما تحتوى العبوة:

حبسولة بلون أزرق سماوي مع خط شطرنج على الجهة.

كل عبوة تحتوي على ١٠، ١٦، ٣٠، ٤٨، ٥٠، ١٠٠ حبسولة بعووات لولحة (استر). قد لا تكون جميع أحجام العبوة موسقة.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

٢٠١٤٠٣ ٤٢٦٧٨٠ ٠٥٧

Rachfus هذه النشرة وته المصادقة عليها من قبل وزارة الصحة في

التبسيط وتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر، لكن الدواء مخصوص لكلا الجنسين.

المنتج وصاحب التسجيل: دكسل ص

شارع دكسل ١، أور- عيّفيا ٣٠٦٠٠٠ إسرا

البطلن، التهاب حد في البكريات ومن الممكن أنها لا تتمكن من التضليل.

بالإضافة قد تظهر أعراض جانبية مثل: ضبابية الرؤية، ارتباك، مصروفات في التبول، تنفس طبيعية، عصبية مفرطة، نعاس.

لا يجوز تناول أدوية في الظلام! تتحقق من الصدق والبراعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

٤. الأعراض الجانبية:

كلكيلى أي دواء، قد بسبب استعمال بكميات كبيرة للعلاج في المهاجر، أعراض جانبية لدى جزء من المستخدمين. لا تتفز من قراءة قائمة الأعراض الجانبية. من الممكن أن لا تصاب بأي واحدة منها.

الأعراض الجانبية قد تكون وخيمة أكثر لدى المسنين.

يجب ايفاق استعمال الدواء والتوجه إلى الطبيب فوراً لدى ظهوره:

 - علامات الحساسية الشديدة: طفح حكة في الجلد، اللسان، الحق، التي قد تؤدي لبعض المصروفات.
 - تنفس صيف نفس، انتفاخ الأطراف.
 - قلة التهوية حفاف في الدم الذي قد يسبب ارتفاع باللوكوس (لوصي) باستعمال لاعب أسطوانة والحفاظ على نظافة الفم.
 - عصبية، تعب، شعور بالقلق عدم هدوء.
 - رُؤيا (ذهان كيراري)، ارتباك أو انفلونزا، مفرط اضطرابات نوم، دوار، مشكلات لدى الرجال الذين يعانون من مشكلات في البروستات، اصابة في الكلى (عد استعمال الم sisten)، عدم انتظام نبض القلب، خفقان قلب، فرط ضبط الدم.
 - باراسيتامول قادر على التسبب في حالات نادرة يظهرها، اعراض جلد شديدة التي غالباً ما تكتون، اعراض حادة اصابة شديدة في الدم، تفسر الحال اصابة جلدية واسعة.
 - إذا تناولت في الماضي مستحضرات التي تحتوي على المركب الفعال باراسيتامول بدون شكل، تعب مترافق ميل لكمات، انزيف، وميل أعلى من المعتاد للأصابة بتلوثات هذه الأعراض قد تدل على اضطرابات في جهاز الدم (انخفاض عدد خلايا الدم مثل فقر الدم، كلة المنيفات، كلة الكريات الشائنة (pancytopenia)، ندرة المنيفات أو كلة الكريات البيض (neutropenia)، كلة الدلات (leukopenia).
 - غثيان، انتفاخ فرجاني بالوزن، شهية متدينة واصغرار الجلد والعينين.
 - سعال أو احتقان في الأنف الذي يستمر أكثر من ٧ أيام، يتذكر أو مصحوب بسخونة طفيف، احتقان ورن، ضيق نفس، الم صدر أو الم رأس مستمر.
 - أعراض جانبية الناتجة عن حرج عة مفرطة (أنظر بند "إذا أفرطت بالخطأ في الجرعة").