

أكويمود ٥٪، كريم

المادة الفعالة وكميتها:

كل كيس ٠,٢٥ غرام يحتوي على:

١٢,٥ ملغ إيميكيومود (Imiquimod 12.5 mg)

لقائمة المواد غير الفعالة، الرجاء أنظر الفقرة ٦.

اقرأ النشرة يتتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء، تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وصف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطيه للآخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن مرضهم مشابه لمرضك.

- الدواء غير مخصص لمعالجين دون عمر ١٢ سنة، لمعالجة التآليل الدرنية.
- الدواء غير مخصص لمعالجين دون عمر ١٨ سنة، لمعالجة تقرن الجلد الشعاعي و سرطان الجلد السطحي للخلايا القاعدية.

١) لأي غرض مخصص الدواء؟

- لمعالجة التآليل الدرنية (Condylomata Acuminata) خارجياً وموضعيأ في منطقة الأعضاء التناسلية وفي منطقة فتحة الشرج لدى الكبار.
- لمعالجة تقرن الجلد الشعاعي (Solar Keratosis) لدى كبار ذوي جهاز مناعة سليم.
- لعلاج سرطان الجلد السطحي للخلايا القاعدية (Superficial Basal Cell Carcinoma) لدى كبار ذوي جهاز مناعة سليم في الحالات التي تكون فيها الإجراءات الجراحية أقل ملائمة.

إيميكيومود يساعد الجهاز المناعي على إنتاج مواد طبيعية التي تساعد الجسم على محاربة مسببات الآفات الجلدية.

ملاحظة: إن طريقة العلاج بأكويمود ٥٪ تختلف بالنسبة لكل إستطباب من الإستطبابات الثلاثة التي خصص لأجلها المستحضر. من المهم جدا متابعة تعليمات الطبيب حسب غاية الإستعمال التي من أجلها خصص الكريم.

الفصيلة العلاجية: مضاد فيروسى، مضاد للسرطان.

٢) قبل إستعمال الدواء

⚠ لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

- كنت حساسأ (أليرجي) للمادة الفعالة (إيميكيومود) أو لأحد مركبات الدواء الأخرى (الرجاء أنظر الفقرة ٦).

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء:

قبل العلاج بأكويمود ٥٪ إحك للطبيب إذا:

- إستعملت في الماضي أكويمود ٥٪ أو مستحضرات مشابهة.
- كنت تعلم بوجود خلل في الجهاز المناعي لديك.
- لديك تعداد غير سليم للدم.

- لا يجوز إستعمال الكريم قبل شفاء الجلد من علاج دوائي سابق أو من علاج جراحي.

يجب تجنب الإتماس مع العينين، الشفتين أو المنخرين. في حالة تماس الدواء مع العينين، الشفتين أو المنخرين - يجب شطف هذه المناطق جيدا بالماء.

- الدواء مخصص للإستعمال على الجلد فقط وغير مخصص للإستعمال الداخلي.
- لا يجوز إستعمال الكريم بما يتجاوز فترة العلاج، الكمية والوتيرة الموصى بها.
- لا يجوز تضميد أو سد المنطقة المعالجة بواسطة ضمادات أو عصائب أخرى.
- إذا كنت تشعر بإلتهاب عااج أكثر مما ينبغي في المنطقة المعالجة، فقم بشطف الكريم بواسطة صابون لطيف وماء. حالأ بعد زوال المشكلة، بإمكانك معاودة إستعمال الكريم.
- عند إستعمال أكويمود ٥٪ لعلاج تقرن الجلد الشعاعي أو سرطان الجلد السطحي للخلايا القاعدية يجب التصرف بحسب التحذيرات

الإضافية التالية:

- يجب الإمتناع عن إستعمال مصابيح التسفع أو فراش التسفع والإمتناع قدر الإمكان عن التعرض للشمس طوال فترة العلاج بأكويمود ٥٪. يجب إستعمال كريم وقاية ضد الشمس وإرتداء ملابس واقية وقبعات واسعة الأطراف عند الخروج إلى الخارج خلال اليوم.

- عندما يكون العلاج مخصص للتآليل الدرنية في الأعضاء التناسلية يجب التصرف حسب التحذيرات الإضافية التالية:

- على الذين لم يُختنوا والذين يعالجون التآليل من تحت القلفة، كشف الحشفة (طرف القضيب) وشطف المكان بشكل يومي.
- إذا لم يتم شطف المكان جيدا كل يوم، فإن القلفة يمكن أن تضيق الشد حول الحشفة، تسبب إنتفاخها وتضررها - بحيث يصعب من الصعب سحبها إلى الخلف. إذا لاحظت هذه الأعراض - توقف عن العلاج حالا وتوجه للطبيب.
- إن التآليل في الأعضاء التناسلية مُعدية، لذا يجب التأكد من فحص شريك/شريكتك من قبل الطبيب.
- إذا وجدت لديك جروح مفتوحة - فلا يجوز إستعمال أكويمود ٥٪ حتى بعد شفاء الجروح.
- إذا وجدت لديك تآليل داخلية - لا يجوز إستعمال أكويمود ٥٪ في الإحليل (المنفذ الذي يمر منه البول)، المهبل (قناة الولادة) عنق الرحم (عضو نسائي داخلي)، أوفي أي مكان داخل فتحة الشرج (rectum).
- لا يجوز إستعمال هذا الدواء لأكثر من دورة علاجية واحدة إذا وجدت لديك مشاكل في الجهاز المناعي جراء مرض أو بسبب الأدوية التي تتناولها. إذا كنت تعتقد بأن ذلك ينطبق عليك، راجع الطبيب.
- إذا حصلت على نتيجة إيجابية في فحص HIV عليك إبلاغ الطبيب نظرا لأن أكويمود ٥٪ ليس ناجعأ بنفس الدرجة لدى مرضى لديهم فحص HIV إيجابي.
- إذا قررت ممارسة العلاقات الجنسية في الوقت الذي ما تزال فيه التآليل موجودة، قم بدهن أكويمود ٥٪ بعد النشاط الجنسي وليس قبله. من شأن أكويمود ٥٪ أن يضعف الكوندوم والديافراغما، لذا لا يجوز إبقاء الكريم أثناء النشاط الجنسي. تذكر، بأن إستعمال أكويمود ٥٪ لا يحمي من نقل فيروس HIV أو أمراض أخرى التي تنتقل بالإتصال الجنسي إلى شخص آخر.
- على المعالجين أن يعلموا بأنه من الجائز حدوث تقاقم أثناء فترة العلاج في الإلتهابات الموجودة في منطقة الآفات وذلك بسبب طريقة عمل أكويمود ٥٪.
- أثناء فترة إستعمال أكويمود ٥٪ وحتى الشفاء، منطقة العلاج من شأنها أن تبدو مختلفة بشكل ملحوظ عن المعتاد.

⚠ إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخرأ، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحك للطبيب أو الصيدلي عن ذلك.

لا تعرف أدوية غير ملائمة للإستعمال مع أكويمود ٥٪

⚠ الحمل والإرضاع:

لا يجوز إستعمال الدواء بدون إستشارة الطبيب قبل بدء العلاج إذا كنت في فترة الحمل أو الرضاعة.

بلغي الطبيب إذا كنت في فترة الحمل أو تخططين للحمل. يناقشك الطبيب حول الفوائد والمخاطر من إستعمال أكويمود ٥٪ خلال فترة الحمل. لم تبين الأبحاث التي أجريت على الحيوانات تأثير ضار مباشر أو غير مباشر، أثناء فترة الحمل.

لا يجوز الإرضاع أثناء فترة العلاج بأكويمود ٥٪، لأنه لا يعرف فيما إذا كان الدواء يطرح في حليب الام.

⚠ السياقة وإستعمال الماكينات:

لا يؤثر الدواء على القدرة على السياقة أو تشغيل الماكينات.

⚠ معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء:

قد يسبب ميتيل -بارابين وپروپيل-بارابين ردود فعل تحسسية (من الجائز حدوث ردود فعل متأخرة). قد يسبب سيتيل وستيثيريل الكحول ردود فعل جلدية موضعية (مثل: إلتهاب الجلد بالتماس).

٣) كيفية إستعمال الدواء؟

يجب الإستعمال حسب تعليمات الطبيب دائماً. عليك الإستيضاح من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن واثقأ.

أشطف يديك جيدا قبل وبعد إستعمال الكريم. لا تقم بتغطية المنطقة المعالجة بضمادات أو عصائب أخرى بعد إستعمال أكويمود ٥٪.

• افتح كيس جديد في كل مرة تستعمل فيها الكريم. إرمي بقايا الكريم المتبقية في الكيس بعد الإستعمال. لا يجوز حفظ الكيس مفتوح للإستعمال فيما بعد.

المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.

إن فترة ووتيرة العلاج تختلف لكل من علاج التآليل الدرنية في الأعضاء التناسلية، علاج تقرن الجلد الشعاعي أو علاج سرطان الجلد السطحي للخلايا القاعدية. أنظر التعليمات الخاصة بكل إستطباب.

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

- لا يجوز البلع. الدواء مخصص للإستعمال الخارجي فقط.

إرشادات الإستعمال - تعليمات عامة:

لعلاج التآليل الدرنية في الأعضاء التناسلية (أيام الإثنين، الأربعاء والجمعة):

١) قبل النوم إغسل اليدين والمنطقة المعالجة بالماء والصابون اللطيف وجفف جيدا.

٢) إفتح كيس جديد، إضغط على الكيس وضع أكويمود ٥٪ على طرف الأصبع.

٣) إدهن طبقة رقيقة من أكويمود ٥٪ على المنطقة المخصصة عندما تكون نظيفة وجافة. ذلك بلطف داخل الجلد حتى إختفاء الكريم.

٤) بعد الإستعمال قم برمي الكيس المفتوح وأشطف اليدين بالماء والصابون.

٥) أترك أكويمود ٥٪ على المكان المعالج لمدة ٦- ١٠ ساعات. لا يجوز الإستحمام في الوقت الذي يكون فيه الكريم على الجلد.

٦) بعد مرور ٦- ١٠ ساعات، يجب شطف المنطقة التي دهنت عليها أكويمود ٥٪ بالماء والصابون اللطيف.

إستعمل أكويمود ٥٪ ثلاثة مرات في الأسبوع. مثلا: إستعمل الكريم في أيام الإثنين، الأربعاء والجمعة. كيس واحد يحوي ما يكفي من الكريم لتغطية مساحة تؤلول بحجم ٢٠ سم².

إذا وجدت تآليل من تحت القلفة، يجب سحب القلفة إلى الخلف وشطف المنطقة التي من تحتها كل يوم (أنظر فقرة «تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء»).

إستمر في إستعمال أكويمود ٥٪ حسب التعليمات حتى إختفاء التآليل تماماً (لدى نصف من النساء، تختفي التآليل خلال ٨ أسابيع، لدى نصف من الرجال فإن التآليل تختفي خلال ١٢ أسبوعا، لكن لدى بعض المعالجين يمكن أن تختفي التآليل خلال ٤ أسابيع فقط).

لا يجوز إستعمال أكويمود ٥٪ لفترة تزيد عن ١٦ أسبوعا لكل دورة علاج بالتآليل.

إذا كنت تشعر بأن تأثير الدواء أقوى أو أضعف من اللازم، راجع الطبيب أو الصيدلي.

لعلاج سرطان الجلد السطحي للخلايا القاعدية (أيام الإثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس والجمعة):

١) قبل النوم قم بشطف اليدين والمنطقة المعالجة بالماء والصابون اللطيف وجفف جيدا.

٢) إفتح كيس جديد، إضغط على الكيس وضع أكويمود ٥٪ على طرف الإصبع.

٣) إدهن أكويمود ٥٪ على المنطقة المخصصة وعلى حوالي سنتيمتر واحد من حولها. ذلك بلطف لداخل الجلد حتى إختفاء الكريم.

٤) بعد الإستعمال قم برمي الكيس المفتوح وأشطف اليدين بالماء والصابون.

٥) أترك أكويمود ٥٪ على المكان المعالج لمدة حوالي ٨ ساعات. لا يجوز الإستحمام طوال الفترة التي يكون فيها الكريم على الجلد.

٦) بعد مرور حوالي ٨ ساعات، يجب شطف المنطقة التي دهنت عليها أكويمود ٥٪ بالصابون اللطيف والماء.

إدهن كمية كافية من أكويمود ٥٪ على المنطقة المخصصة وعلى حوالي سنتيمتر واحد من حولها لمدة ٥ أيام متتالية كل أسبوع لمدة ٦ أسابيع. مثال: إدهن كريم من يوم الإثنين حتى يوم الجمعة. لا تدهن الكريم يوم السبت والأحد.

لعلاج تقرن الجلد الشعاعي (أيام الإثنين، الأربعاء والجمعة):

١) قبل النوم أشطف يديك والمنطقة المعالجة بالماء والصابون اللطيف وجفف جيداً.

٢) إفتح كيس جديد، إضغط على الكيس وضع أكويمود ٥٪ على طرف الإصبع.

٣) إدهن أكويمود ٥٪ على المنطقة المخصصة. ذلك بلطف لداخل الجلد حتى إختفاء الكريم.

٤) بعد الإستعمال قم برمي الكيس المفتوح وأشطف اليدين بالماء والصابون.

٥) أترك أكويمود ٥٪ على المكان المعالج لمدة حوالي ٨ ساعات. لا يجوز الإستحمام طوال الفترة التي يكون فيها الكريم على الجلد.

٦) بعد مرور حوالي ٨ ساعات، يجب شطف المنطقة التي دهنت عليها أكويمود ٥٪ بالصابون اللطيف والماء.

إدهن أكويمود ٥٪ ثلاثة مرات في الأسبوع. مثال: إدهن الكريم في أيام الإثنين، الأربعاء والجمعة. كيس واحد يحوي ما يكفي من الكريم لتغطية مساحة قدرها ٢٥ سم^٢. واصل العلاج لمدة ٤ أسابيع. بعد مرور ٤ أسابيع، يفحص الطبيب حالة جلدك. إذا لم تختفي كافة الآفات، فمن الجائز أن يحتاج الأمر لدورة علاجية إضافية ذات ٤ أسابيع.

إذا إستعملت بالخطأ كمية أكبر من المطلوب أشطف الكمية الزائدة بالصابون اللطيف والماء. بعد زوال رد الفعل الجلدي، بالإمكان مواصلة العلاج. إذا بلغت أنت أو طفلك بالخطأ من الدواء، توجه حالا للطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى، وأحضر علبة الدواء معك.

إذا نسيت إستعمال هذا الدواء في الوقت المطلوب، فقم بالدهن لحظة تذكرك بذلك وأستمر وفقاً للجدول الزمني الإعتيادي. لا يجوز الدهن أكثر من مرة واحدة في اليوم.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

لا يجوز التوقف عن إستعمال الدواء بدون إستشارة الطبيب، حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية.

• لا تتناول الأدوية في العتمة؛ يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي **في كل مرة** تتناول فيها دواء.

ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

٤) الأعراض الجانبية

إن شيوع الأعراض الجانبية هو كالأتي:

أعراض جانبية شائعة جداً (قد تحدث لدى أكثر من ١ من بين ١٠ معالجين)

أعراض جانبية شائعة (قد تحدث لدى أقل من ١ من بين ١٠ معالجين)

أعراض جانبية غير شائعة (قد تحدث لدى أقل من ١ من بين ١٠٠ معالج)

أعراض جانبية نادرة (قد تحدث لدى أقل من ١ من بين ١٠٠٠ معالج)

أعراض جانبية نادرة جداً (قد تحدث لدى أقل من ١ من بين ١٠٠٠٠ معالج)

كما بكل دواء، إن إستعمال أكويمود ٥٪ قد يسبب أعراضاً جانبية عند بعض المستعملين. لا تندهش من قائمة الأعراض الجانبية.

من الجائز ألا تعاني أياً منها.

يجب التوقف عن إستعمال الدواء ومراجعة الطبيب فوراً:

• إذا كنت تعاني من ردود فعل جلدية شديدة (نادرًا): ظهور كدمات أو نقاط على الجلد التي تبدأ بظهور مناطق حمراء وتتطور لما يبدو كعلامة «هدف»، من الجائز أن يترافق ذلك بحكة، سخونة، شعور عام سيء، آلام في المفاصل، إضطرابات في الرؤية، حرقه، ألم أو حكة في العينين، وتقرحات في الفم.

• عندما يستعمل أكويمود ٥٪ لعلاج التآليل الدرنية في الأعضاء التناسلية. لدى الرجال الذين لم يُختنوا -إذا لاحظت بإحكام القلفة من حول الحشفة، وانتفاخها.

يجب مراجعة الطبيب بأسرع وقت ممكن:

• إذا لم تشعر بشكل جيد خلال فترة العلاج بأكويمود ٥٪

• لدى النساء المعالجات من التآليل الدرنية في الأعضاء التناسلية -إذا كنت تعانين من رد فعل جلدي شديد ومؤلم في فتحة المهبل الذي يجعل التبول صعباً (نادر جداً).

• إذا لاحظت ميل لحدوث تلوثات، ظهور كدمات في الجلد وإرهاق. الأمر الذي يمكن أن يدل على حدوث إنخفاض في نتائج تعداد الدم.

• في حال حدوث تهيج أو رد فعل شديد يجب الشطف جيداً بالماء والصابون ومراجعة الطبيب. إذا حصل إنزعاج أشد مما ينبغي خلال العلاج وذلك جراء رد الفعل الجلدي، فمن شأن الطبيب أن يوصي بالتوقف عن العلاج لعدة أيام.

• في حال ظهور قيع أو علامات أخرى لتلوث.

إعراض جانبية إضافية:

• تغيرات في لون الجلد في المنطقة المعالجة. عادة ما تتحسن هذه التغيرات مع مرور الوقت، لكن من شأنها أن تكون دائمة لدى بعض المعالجن.

• من الجائز حدوث تساقط للشعر في المنطقة المعالجة أو من حولها.

إذا كنت تستعمل الدواء لعلاج التآليل الدرنية في الأعضاء التناسلية:

أعراض جانبية كثيرة لأكويمود ٥٪ تحدث نتيجة ردود فعل جلدية موضعية.

أعراض جانبية شائعة جداً: إحمرار، تآكل الجلد، قشرة في الجلد وانتفاخ. قساوة من تحت الجلد، جروح صغيرة مفتوحة، غشاء يتكون خلال الشفاء وقد تتشكل أيضاً حويصلات صغيرة تحت الجلد. كذلك، قد تشعر بحكة، حرقه أو ألم في المنطقة التي دهنت فيها الكريم. غالبية هذه الأعراض هي معتدلة حيث يعود الجلد إلى حالته الإعتيادية بعد حوالي أسبوعين من التوقف عن العلاج.

أعراض جانبية شائعة: صداع.

أعراض جانبية غير شائعة: سخونة وأعراض شبيهة بالإنفلونزا، آلام في المفاصل والعضلات، هبوط الرحم، ألم عند ممارسة العلاقات الجنسية لدى النساء، صعوبات في إنتصاب العضو الذكري، تعرق زائد، غثيان. أعراض في المعدة والأمعاء، طنين في الأذنين، تورد، إرهاق، دوام، ميغريما، الشعور بوخز، أرق، إكتئاب، فقدان الشهية للطعام، إنتفاخ الغدد، تلوثات جراثيمية، فيروسية أو فطرية (مثل: تقرحات البرد)، تلوث في المهبل يشمل الفطر، سعال ورشح مع ألم في الحنجرة.

أعراض جانبية نادرة جداً: لقد حدثت ردود فعل خطيرة ومؤلمة، خاصة عند إستعمال كمية أكبر من المطلوب من الكريم.

إذا كنت تستعمل الدواء لعلاج سرطان الجلد السطحي للخلايا القاعدية:

أعراض جانبية كثيرة لأكويمود ٥٪ تحدث نتيجة ردود فعل جلدية موضعية. ردود فعل جلدية موضعية يمكن أن تكون علامة بأن الدواء يعمل كما هو مخطط له.

أعراض جانبية شائعة جداً: حكة بسيطة في المنطقة المعالجة.

أعراض جانبية شائعة: الشعور بوخز، إنتفاخ مناطق صغيرة في الجلد، ألم، حرقه، تهيج، نزف، إحمرار أو طلع. إنتفاخ الغدد أو ألم في الظهر.

أعراض جانبية غير شائعة: تغيرات في المنطقة المعالجة (إفرازات، التهاب، إنتفاخ، تشكل قشرة كما في الجرح المندمل، نقصف الجلد، حويصلات، التهاب الجلد) أو عصبية، غثيان، جفاف الفم، أعراض شبيهة بالإنفلونزا وإرهاق.

إذا كنت تستعمل الدواء لعلاج تقرن الجلد الشعاعي:

أعراض جانبية كثيرة لأكويمود ٥٪ تحدث نتيجة ردود فعل جلدية موضعية. ردود فعل جلدية موضعية يمكن أن تكون علامة بأن الدواء يعمل كما هو مخطط.

أعراض جانبية شائعة جداً: حكة بسيطة في المنطقة المعالجة.

أعراض جانبية شائعة: ألم، حرقه، تهيج أو إحمرار، صداع، فقدان الشهية للطعام، غثيان، آلام في العضلات، آلام في المفاصل وإرهاق.

أعراض جانبية غير شائعة: تغيرات في المنطقة المعالجة (نزف، التهاب، إفرازات، حساسية، إنتفاخ. إنتفاخ مناطق صغيرة في الجلد، الشعور بوخز، تشكل قشرة كما في الجرح المندمل، تندب، تقرحات، الشعور بسخونة أو بانزعاج) أو التهاب الأغشية المخاطية للأنف، إحتقان الأنف، إنفلونزا أو أعراض شبيهة بالإنفلونزا، إكتئاب، تهيج العين، إنتفاخ الجفنين، ألم في الحنجرة، إسهال، تقرن الجلد الشعاعي، إحمرار، إنتفاخ الوجه، تقرحات، آلام في الأطراف، سخونة، ضعف أو رجفان.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

٥) كيفية تخزين الدواء؟

• تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

• لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنتقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية الى اليوم الأخير من نفس الشهر.

• يجب التخزين بدرجة حرارة دون ٢٥ درجة مئوية. يجب الحماية من التجميد.

• يجب رمي بقايا الكريم المتبقية في الكيس بعد الإستعمال. لا يجوز حفظ كيس مفتوح من أجل الإستعمال فيما بعد.

• لا يجوز رمي الأدوية إلى المجاري أو للقمامة. إسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من أدوية ليست قيد الإستعمال. تساعد هذه الوسائل على الحفاظ على البيئة.

٦) معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً:

Isostearic Acid, Benzyl Alcohol, Methylparaben (Methyl Parahydroxybenzoate), Propylparaben (Propyl Parahydroxybenzoate), Cetyl Alcohol, Stearyl Alcohol, White Petrolatum, Sorbitan Monostearate, Polysorbate 60 (Tween 60), Glycerin, Xanthan Gum (Xantural 75) and Purified Water.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:

كريم بلون أبيض - حتى مائل إلى الأصفر. الكريم معبأ ضمن أكياس ذات ٢٥، ٥٠ غرام.

المنتج وصاحب الإمتياز: تارو للصناعة الدوائية م.ض، شارع هيكيتور ١٤، خليج حيفا ٢٦٢٤٧٦١

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: ٣٣١١٤-٩٠-١٤٤

أقرت وزارة الصحة صيغة هذه النشرة ومحتواها فحّص ورُخص في أيار ٢٠١٥

من أجل سهولة وتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكّر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.