

עלון לרופא – חייב במרשם רופא וטרינר

פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר על ידו מרץ 2012

For veterinary use only

לשימוש וטרינרי בלבד

**Maxiban 160 G
Premix Veterinary**

**מקסיבן 160 ג'
פרמיקס וטרינרי**

Narasin 80 g/kg, Nicarbazin 80 g/kg

Granules

גרנולות

הרכב:

כל ק"ג של מקסיבן 160 ג' פרמיקס וטרינרי מכיל: Narasin 80g
Nicarbazin 80g

קבוצה תרפויטית:

קוקסידיוסטטים.

פעילות רפואית:

תוספת לתערובת מזון למניעת מחלת הקוקסידיוזיס הנגרמת ע"י אימיריות (Eimerias) הרגישות לתרופה, בתרנגולות פיתום.

התוויות נגד:

אין להשתמש במקסיבן 160 ג' פרמיקס וטרינרי בתערובת להאכלת הודים ובזני עופות אחרים, ובארנבות.

תגובות בין תרופתיות:

• אין להשתמש בתכשירים המכילים תיאמולין (Tiamulin) וטרולאנדומיצין (Troleandomycin), אלא מתום 7 ימים מסוף הטיפול במקסיבן 160 ג' פרמיקס וטרינרי.

יש להמתין 7 ימים לפני השימוש במקסיבן 160 ג' פרמיקס וטרינרי ולא להשתמש בתיאמולין וטרולאנדומיצין מחשש לעיכובי גדילה חמורים ואף תמותה.

• קיימת המלצה שלא להשתמש בקבוצות החומרים: ינופורים, סולפונאמידים, אריתרומיצין ופורלטדון ביחד עם מקסיבן 160 ג' פרמיקס וטרינרי עקב תגובות לא רצויות.

• אין להשתמש במקסיבן 160 ג' פרמיקס וטרינרי בו זמנית עם קוקסידיוסטט אחר.

הוראות שימוש:

הכנה: יש לערבב את מקסיבן 160 ג' פרמיקס וטרינרי עם תערובת מזון תחילה, כדי לגרום לערבוב הומוגני בתערובת הסופית, כדלהלן:

תערובת מזון בק"ג	מקסיבן 160 ג' פרמיקס וטרינרי משקל בק"ג	ריכוז רצוי בתערובת להגשה Narasin: Nicarbazin
999.500 kg	0.500 kg	40 ppm: 40 ppm
999.375 kg	0.625 kg	50 ppm: 50 ppm

הוראות למכיני(י) התערובת:

• בעת ערבוב מקסיבן 160 ג' פרמיקס וטרינרי, יש להקפיד ללבוש בגדי-מגן, כפפות ומסכת אבק.

• לאחר גמר ההכנה, יש לרחוץ היטב במים ובסבון.

• אם במקרה חדר החומר לעיניים, יש לשטוף העיניים מיידי במים זורמים.

• יש להשתמש במקסיבן 160 ג' פרמיקס וטרינרי תוך 24 חודשים מיום פתיחה השק.

אזהרות:

• אין להשתמש בתכשיר בתרנגולות מטילות.
• בעת הטיפול עלולות תרנגולות לפיטום לפתח רגישות לחום. יש לדאוג לאוורור נאות ולמי שתייה, ולהימנע מחמום ומלחות יתר.

סכנה:

• התכשיר אסור לשימוש בסוסים, שכן השימוש בו עשוי להיות קטלני!
• יש למנוע בהחלט גישה של סוסים, פרדות וחמורים לתערובת מזון המכילה מקסיבן 160 ג' פרמיקס וטרינרי.

זמן המתנה:

ניתן להמשיך בטיפול עד השחיטה. לא נדרשת תקופת המתנה לפני השחיטה.

חומרים בלתי פעילים:

Anti-dusting oil, Microtracer f-red, Rice hulls

אחסון:

יש לאחסן בטמפרטורת החדר מתחת ל-25°C. הרחק מהישג ידם של ילדים.

משקל נטו: 25 ק"ג

מספר רישום התרופה: 79-98-92087

היצרן: Elanco Animal Health A division of ELI LILLY AND COMPANY
500 East 96 Street, Indianapolis, Indiana, USA.

חייב מרשם רופא וטרינרי
ملزم بوصفة طبيب بيطري
P Veterinary Prescription Medicine

בעל הרישום:

ירומר בע"מ, ת.ד. 1064, רמת השרון 47110.