

Инструкция по применению в соответствии с Положением о фармацевтах (препараты) 1986 г.

Препарат распространяется без рецепта врача

Спирит Салицил 2%

Жидкость

FLORIS

Состав:

Активный ингредиент и его концентрация: салициловая кислота 2% (Salicylic acid 2%).

Неактивные ингредиенты: см. пункт 6 "Дополнительная информация".

Перед применением препарата внимательно прочтите инструкцию до конца.

Данный вкладыш содержит краткую информацию о препарате. Если у вас имеются дополнительные вопросы, обращайтесь к врачу или к фармацевту. Данный препарат распространяется без рецепта. Обычно он не предназначен для детей и младенцев в возрасте до двух лет. Вы должны использовать данный препарат правильным образом. Если вам необходима дополнительная информация, проконсультируйтесь с фармацевтом.

1. Для чего предназначен данный препарат?

Данный препарат предназначен для дезинфекции и отшелушивания кожи.

Терапевтическая группа кератолитический препарат из группы салицилатов.

2. Перед использованием препарата

Не используйте препарат:

- Если у вас имеется чувствительность (аллергия) к активному ингредиенту или к любому из дополнительных ингредиентов, содержащихся в препарате. Для информации о неактивных ингредиентах см. пункт 6: "Дополнительная информация"
- Не наносите препарат на обширную поверхность кожи, на поврежденную кожу, пигментные пятна, родинки и бородавки, полрытые волосами.

3. Особые предостережения относительно применения данного препарата

- Избегайте контакта с глазами и слизистыми оболочками. В случае такого контакта - тщательно промойте место контакта водой
- Не используйте одновременно с препаратами, подсушивающими кожу, например: препараты на спиртовой

основе, мыла или препараты для лечения акне.

- Не зажигать сигарету и не подвергать воздействию огня до полного высыхания продукта.

4. Перед использованием препарата "Спирит Салицил 2%" сообщите врачу, если:

- вы страдаете сахарным диабетом.
- у вас имеется чувствительность к какому-либо продукту питания или лекарственному препарату.

5. Если вы принимаете или недавно принимали другие препараты, включая безрецептурные препараты и пищевые добавки, сообщите об этом врачу или фармацевту.

Не подлежит использованию вместе с препаратами, оказывающими подсушивающее действие, например: препаратами на спиртовой основе, мылом или препаратами для лечения акне.

6. Беременность и грудное вскармливание

Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом перед использованием препарата, если вы находитесь в первом/последнем триместре беременности или кормите грудью.

7. Применение на детях

Обычно препарат не предназначен для детей и младенцев в возрасте до двух лет. Родители должны сообщать лечащему врачу о любом побочном явлении и о любом дополнительном препарате, который получает ребенок.

8. Важная информация о некоторых ингредиентах лекарства

Содержит спирт, горючее вещество.

9. Инструкция по применению

Если вы не уверены в том, как надо использовать препарат, обращайтесь к врачу или фармацевту.

Обычная доза при отсутствии иных указаний врача: Вымойте и осушите кожу. Наносите на кожу от одного до трех раз в день, с помощью ватного тампона, смоченного препаратом.

Не превышайте рекомендуемую дозу.

Не глотать. Препарат предназначен только для наружного применения.

В случае передозировки или если препарат случайно проглотил ребенок, немедленно обратитесь к врачу или в приемный покой больницы и принесите с собой упаковку препарата.

Не принимайте лекарства в темноте!

Проверяйте этикетку и дозу при каждом

приеме препарата. Наденьте очки, если вы в них нуждаетесь.

Если у вас имеются дополнительные вопросы в отношении использования препарата, обращайтесь к врачу или к фармацевту.

10. Побочные явления:

Как и любое другое лекарство, "Спирит Салицил 2%" может вызвать у некоторых людей побочные явления. Не пугайтесь, читая список побочных явлений. Возможно, ни одно из них у вас не проявится.

Прекратите использование и обратитесь к врачу в случае: воспаления или местного раздражения (редко).

Дополнительные побочные явления: сыпь.

Если одно из побочных явлений усиливается или если вы страдаете от побочных явлений, не упомянутых в инструкции, просьба проконсультироваться с врачом. О побочных явлениях можно сообщить посредством специализированной он-лайн формы, которая находится на домашней странице сайта Министерства здравоохранения www.health.gov.il или по следующей ссылке:

<https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il>

11. Как хранить препарат?

- Избегайте отравления! Данный препарат и любые другие лекарства необходимо хранить в закрытом и недоступном для детей и/или младенцев месте во избежание отравления.

Не вызывайте рвоту без четкого указания врача.

- Не используйте лекарство после истечения срока годности (exp. date), указанного на упаковке. Срок годности относится к последнему дню указанного месяца.
- Храните препарат при комнатной температуре, ниже 25°C.

- Плотно закрывайте, чтобы избежать проникновения воздуха и влажности.
- Осторожно! Горючее вещество.

Хранить вдали от огня.

- Хранить в оригинальной упаковке.

- После вскрытия упаковки можно использовать препарат до истечения срока годности.

12. Дополнительная информация

Помимо активных веществ, препарат

содержит также:

спирт 96%, дистиллированную воду.

Внешний вид раствора и содержание упаковок

Прозрачный спиртовой раствор.

Упаковка по 100 мл

Производитель и владелец лицензии:

"Бен - Шимон Флориш" Лтд, промышленный парк Мисгав, ПОС: Мисгав 2017400.

Данная инструкция была проверена и утверждена Министерством здравоохранения Израиля 12/2013.

Номер регистрации фармацевтического препарата в государственном реестре лекарств в Министерстве здравоохранения Израиля: 609227486