

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו-1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד.

דו קאר טיפות אוזניים

הרכב: כל 1 מ"ל מכיל:

Dexamethasone Sod. Phosphate	1 mg.	דקסמתזון סודיום פוספאט
Neomycin sulfate	5 mg.	נאומיצין סולפאט
Polymixin B sulfate	10000 I.U.	פולימיקסין B סולפאט

חומרים בלתי פעילים: ראה ס' 6 - מידע נוסף.

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

לטיפול בזיהומים דלקתיים שטחיים של האוזן החיצונית הנגרמים ע"י חיידקים הרגישים לתרופה.
קבוצה תרפויטית:

דקסמתזון סודיום פוספאט הוא בעל פעילות נוגדת דלקת. נאומיצין סולפאט ופולימיקסין B סולפאט הם בעלי פעילות אנטי בקטריאלית

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתכשיר אם:

הינך רגיש (אלרגי) לחומרים הפעילים או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה. במקרה שעור התוף מנוקב או קיים חשש למקרה כזה.

לפני השימוש בדו קאר, ספר לרופא אם:

הינך בהריון או מיניקה.

הינך סובל או סבלת בעבר מליקוי בתיפקודי שמיעה, שלבכת פשוטה (הרפס סימפלקס), אבעבועות רוח, שלבכת חוזרת של האוזן או שחפת האוזן, זיהומים וירליים ופטרייתיים של העור או האוזן, אם קיים חשש או ידוע לך שהנך סובל מעור תוף מנוקב של האוזן או במקרה של דלקות אוזניים כרוניות.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

אם הינך רגיש למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, כגון אמינוגליקוסידים, פולימיקסין או סולפיטיים, עליך להודיע על כך לרופא לפני נטילת התרופה.

שימוש ממושך או שימוש במינון גבוה בתכשיר זה על פצעים פתוחים או על עור פגום עלול לגרום לחירשות. זה חשוב במיוחד בשימוש בילדים.

אין לבלוע. במקרה של בליעה, במיוחד על ידי ילד, יש לפנות מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים.

אם אתה לוקח , או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

הריון והנקה

יש להתייעץ עם הרופא במקרה והנך בהריון, מנסה להרות או מניקה.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

תמיד יש להשתמש בתרופה לפי הוראות הרופא.

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.:

המינון המקובל בדרך כלל הוא: 2-3 טיפות לתוך האוזן, 3-4 פעמים ביום.

מינון לילדים: 1-2 טיפות לתוך האוזן, 3-4 פעמים ביום.

אין לעבור על המנה המומלצת

אם לא חל שיפור במצבך תוך- 7 ימים יש לפנות לרופא.

אופן השימוש: רחץ ידיך. שכב או הטה ראשך כך שהאוזן המטופלת תופנה כלפי מעלה. טפטף התרופה לתוך האוזן והישאר במצב זה למשך מספר דקות, כדי לאפשר לתרופה להגיע לפנים האוזן. למניעת זיהומים, הקפד שפיית הבקבוקון לא תגע בשום משטח. אל תרחץ המזלף. נגב במפית נקיה וסגור היטב המיכל.

שים לב! אין לבלוע! לשימוש חיצוני בלבד. התכשיר לא מיועד לטיפול בעיניים.

אם נטלת בטעות מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, יש לפנות מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים ולהביא את אריזת התרופה איתך. אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן הדרוש, אין ליטול מנה כפולה. קח את המנה הבאה בזמן הרגיל והיוועץ ברופא.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו לכל תרופה, השימוש בדזו קאר עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים.

אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

יש להפסיק את השימוש בתרופה ולפנות לרופא מיד אם הינך חש ב:

רגישות או תגובה אלרגית (גירוי או פריחה).

תופעות לוואי נוספות:

תחושת עקצוץ זמנית או צריבה.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא הוזכרה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות **לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול**

תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על

תופעות לוואי. או ע"י כניסה לקישור:

<https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה

מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות. על ידי כך תימנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא

אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp.date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

תנאי אחסון: במקום אפל, מתחת ל-25°C אין לאחסן במקרר.

גם לפי תנאי האריזה/אחסנה המומלצים, תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד. נא לשים לב לתאריך התפוגה של התכשיר! בכל מקרה של ספק עליך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופה. אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.

אין ליטול תרופות בחושד! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם.

ניתן להשתמש בתכשיר עד 6 חודשים מפתחת הבקבוק לראשונה ולא יאוחר מתאריך התפוגה המופיע על האריזה.

6. מידע נוסף

נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:

Sodium Metabisulfite, Sodium Citrate, Propylene Glycol, Methyl Paraben, Propyl Paraben, Purified Water, HCl
dilute

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

בקבוקון פלסטיק לבן המכיל תמיסה מימית שקופה עד צהבהבה.

בראש הבקבוקון נעוץ מטפטף, מכוסה במכסה פלסטי לבן מתברג.

יצרן ובעל הרישום: ויטאמד תעשיות פרמצבטיות בע"מ,

ת"ד 114, בנימינה 3055002 ישראל.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 1551934691

עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות ב- 12.2015

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה מנוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.