

**עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (הכשירים) התשמ"ו - 1986.**  
התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד.

# אומפרזולן® - קפלוית, 10, 20, 40 מ"ג

- ל קפלוית מכילה:
- אומפרזולן 10 מ"ג**
- אומפרזולן 20 מ"ג**
- אומפרזולן 40 מ"ג**

רשימת החומרים הבליתי פעילים מופיעה בסעיף 6.

**קרא בעיון את העלון על סופו בטרם תשתמש בתרופה.**  
עלון זה מכיל מידע מפתיע על התרופה. אם יש לך שאלות מספיק, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

התרופה ירשמה בכרטי. אל תעביר אותה לרופאים. ראה עלולה הריקת לוח אפילו אם כראה לך כי מצבך הרפואי דומה.

התרופה אינה מועדפת לילדים מתחת לגיל 6.

## 1. למת משתמש התרופה?

התרופה משמשת הפרשת חומצה במערכת העיכול. טיפול בכבד קצבא דומה, כבד הרסני/חמור, דלקת חושן מרכזי, חזון (Zellweger-Ellison Syndrome), ובדומות זוגית-גנטי. אל יטולו אומפרזולן למטרות התחלוקת חודרת בחולים עם הגנה מופעה על היכב העיכול, או בחולים עם דלקת חמורה של מערכת הדם חוזר.

- טיפויל בדיקות חמורה של החולים עם חזון בלדים מעל גיל 6 שנים.
- טיפויל, ומקרה זה, כבד קצבא וכבד הרסני/חמור הגבנים ע"י, שמשום, בהרסנים, מנדל דלקת שאינם סטראידים (NSAIDs), אצל חולים בסכסן מבנה.
- טיפויל, משולב עם אנטיביוטיקה בכבד עקולי הקושר ב"הלוקיטור" פילור (Helicobacter pylori).

**קצבא הערפטיית:** מעכב משאבת פרוטונים (PPI).

## 2. לפני שימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- היך רגש (אדג'ה) לחומר הפעיל (אומפרזולן) לך אדך מהרסיבס הנספס אדך מכלה התרופה או למעכב משאבת פרוטונים (PPI) אחרים (כגון פוסופרוזולן, לוסופרוזולן, ראפסורולן, אומאופרוזולן).
- היך נטל מלפניב (התרופה לטיפול בגניץ HIV).

## אזהרות מיוחדות בהגעת למועד שימוש בתרופה

- היך בריון, עשויה להיות בריון, מנבנת להיכנס להריון או מקויה (אך סעיף "הריון ומקויה").
- מכרבת העיכול, במכרבת עיכול, או עשנרת בעבר נחנה.
- היך סכסן, אל סלקות בעבר, מכעויל, בכבד, מערבת לוקופור עשולה, אל חורשם כן עיון מעל חרופת לטפול בצרבת או בהרפיעות עכול לשער למן משולך.
- היך ע"י מעל 55 עם תסמינים חרושים או תסמינים שמשועשועים לטפול ב"סטרואידים".
- כמה לך כי יש לך חמור ומכרה עם מגנזיום ברז, יש להימנע עם הרופא לגבי ניטור רמת המגנזיום ברז.

במהלך הטיפול בתרופה זו:

- היך ע"י רופא, מבחינים, מצרבת המלוחה בששש, העיך או חרופת, מבחינים, מצרבת המלוחה בששש, בעוד שחסי, חרופה, העיך, כבד הרסני/חמור, לזוגאר, או לחספסי, טספוש או חרופות, מכבד חזו חרופת, מצפופים (קשי שמימה), מכופפס, בעיקר, אל מלוחס בצרבת (קשי רשע למוח כלשהו, אל לתרופה משלשי).

- אם איך משמשם באומפרזולן למטר חרופה ממשכת (מעל עשן) הרופא ע"י עשוי לבצע מעקב סופו אחר חזב בריון, ע"י רחוח עם תסמינים נסויב חרופות חרושים ויחסי וכן פב עשן שאחנה מכבד מלוחס חרופה.
- השימוש במכשיר מקבצת מעכב משאבת פרוטונים PPI כגון אומפרזולן, במיוחד, לכויר, יותר משנה, עלול להמדיל במשן את הפוסון, לעבר, כרד, שרשע כן ריד, ובמנדל השחרה, ע"י לטפול לרופא אם היך סכסן אטאטטאופרוזולן או אם היך נטל קולוסטרסטרואידים (העלמים להמדיל את הפוסון על אטאטטאופרוזולן).
- אומפרזולן מפחית אד רמת החומציות בקבוצה חמוציות הקיבה. דררשע לטפולה על ויטמין B<sub>12</sub>, אם איך נטל את התרופה לתקופה משמכת ש להתייעץ עם הרופא לגבי האפשרות לזכור ניטור B<sub>12</sub>.

התרופה ימלה למטר סימנים למחלות אחרות, לכן אם פנה מיד לרופא וספר לו על כך.

- למטר עשן לרופא, מכרה אל ברורה, בעיה במהלך הבלעיה (למשל קושי או כאב).
- כבד סכסן או קשי עיכול.
- הקאטא אנל או הקאטא זמית.
- הפרשעה חמור או שחרור (אומפרזולן) משאב קושר לעולה קלה (למשל חזיונה).
- הקאטא חמור או שחרור (אומפרזולן) משאב קושר לעולה קלה (למשל חזיונה).

## היך אתה לוקח, או אם לוקח לתרופה, חרופות אחרות

כול חרופות ללא מרשם ומכרבת, חרופות אחרות

לרופא אל לוקח, במיוחד אם אתה לוקח, ספר על כך

- לסוכר (התרופה לטיפול בגניץ HIV) ראה סעיף 2.
- אין להשתמש בתרופה:
- לקופורזולן (מקנעט קיש ע"ד מקלוח) / חזו כן חרופות מקבצת בן (אקסן), כגון אומפרזולן, עלולת חרופות את העיכול על קולופורזולן ולכן יש להימנע מנטילת התרופה עם קולופורזולן.
- אטנביו, סוקוויב, חרובתי (התרופה לטיפול בגניץ HIV) ו"טוקויל", אטרוקויל, פוסקומול, ורוקומויל (חרופות לטיפול ב"הרפיעות נכ").
- התרופה למשעויל ע"י מערכת העצבים המרכזית (כגון פניטאין, גלפופרספיון, דראפאס או טופיל, בוררה או קלופיסון, הרופית פופי, עם התחלת הטיפול באומפרזולן יורה חזר מכוכר רופאי עם התחלת הטיפול באומפרזולן).
- לקפלוית נכסומו.
- מכרבת עשן עם התחלת הטיפול בכסומו.
- הקולוסט, מקופפס (מדכס מערכת החיסון)
- המגיסים המכליסין ברז.
- התרופה צמחית המכליה הפיקוים צפרועוס (St John's wort), המשתמשת לטפול ב"סטרואידים".
- אטרוסיל (לטיפול ב"סטרואידים").
- המסווסט - יתכן והרופא ע"י פיקסן באופן זמני את הטיפול באומפרזולן לקפלוית.

במהלך הטיפול בתרופה זו:

- היך ע"י רופא, מבחינים, מצרבת המלוחה בששש, העיך או חרופת, מבחינים, מצרבת המלוחה בששש, בעוד שחסי, חרופה, העיך, כבד הרסני/חמור, לזוגאר, או לחספסי, טספוש או חרופות, מכבד חזו חרופת, מצפופים (קשי שמימה), מכופפס, בעיקר, אל מלוחס בצרבת (קשי רשע למוח כלשהו, אל לתרופה משלשי).

היך ע"י רופא, מבחינים, מצרבת המלוחה בששש, העיך או חרופת, מבחינים, מצרבת המלוחה בששש, בעוד שחסי, חרופה, העיך, כבד הרסני/חמור, לזוגאר, או לחספסי, טספוש או חרופות, מכבד חזו חרופת, מצפופים (קשי שמימה), מכופפס, בעיקר, אל מלוחס בצרבת (קשי רשע למוח כלשהו, אל לתרופה משלשי).

## שימוש בתרופה בזמן הריון והנקה

אם איך משמשם באומפרזולן למטר חרופה ממשכת (מעל עשן) הרופא ע"י עשוי לבצע מעקב סופו אחר חזב בריון, ע"י רחוח עם תסמינים נסויב חרופות חרושים ויחסי וכן פב עשן שאחנה מכבד מלוחס חרופה.

השימוש במכשיר מקבצת מעכב משאבת פרוטונים PPI כגון אומפרזולן, במיוחד, לכויר, יותר משנה, עלול להמדיל במשן את הפוסון, לעבר, כרד, שרשע כן ריד, ובמנדל השחרה, ע"י לטפול לרופא אם היך סכסן אטאטטאופרוזולן או אם היך נטל קולוסטרסטרואידים (העלמים להמדיל את הפוסון על אטאטטאופרוזולן).

## 4. תופעות לוואי

התופעות לוואי הנפוצות ביותר הן:

- היך ע"י רופא, מבחינים, מצרבת המלוחה בששש, העיך או חרופת, מבחינים, מצרבת המלוחה בששש, בעוד שחסי, חרופה, העיך, כבד הרסני/חמור, לזוגאר, או לחספסי, טספוש או חרופות, מכבד חזו חרופת, מצפופים (קשי שמימה), מכופפס, בעיקר, אל מלוחס בצרבת (קשי רשע למוח כלשהו, אל לתרופה משלשי).

## 5. שימוש בתרופה בזמן הריון והנקה

אם איך משמשם באומפרזולן למטר חרופה ממשכת (מעל עשן) הרופא ע"י עשוי לבצע מעקב סופו אחר חזב בריון, ע"י רחוח עם תסמינים נסויב חרופות חרושים ויחסי וכן פב עשן שאחנה מכבד מלוחס חרופה.

השימוש במכשיר מקבצת מעכב משאבת פרוטונים PPI כגון אומפרזולן, במיוחד, לכויר, יותר משנה, עלול להמדיל במשן את הפוסון, לעבר, כרד, שרשע כן ריד, ובמנדל השחרה, ע"י לטפול לרופא אם היך סכסן אטאטטאופרוזולן או אם היך נטל קולוסטרסטרואידים (העלמים להמדיל את הפוסון על אטאטטאופרוזולן).

## 6. שימוש בתרופה בזמן הריון והנקה

אם איך משמשם באומפרזולן למטר חרופה ממשכת (מעל עשן) הרופא ע"י עשוי לבצע מעקב סופו אחר חזב בריון, ע"י רחוח עם תסמינים נסויב חרופות חרושים ויחסי וכן פב עשן שאחנה מכבד מלוחס חרופה.

## 7. שימוש בתרופה בזמן הריון והנקה

אם איך משמשם באומפרזולן למטר חרופה ממשכת (מעל עשן) הרופא ע"י עשוי לבצע מעקב סופו אחר חזב בריון, ע"י רחוח עם תסמינים נסויב חרופות חרושים ויחסי וכן פב עשן שאחנה מכבד מלוחס חרופה.

## 8. שימוש בתרופה בזמן הריון והנקה

אם איך משמשם באומפרזולן למטר חרופה ממשכת (מעל עשן) הרופא ע"י עשוי לבצע מעקב סופו אחר חזב בריון, ע"י רחוח עם תסמינים נסויב חרופות חרושים ויחסי וכן פב עשן שאחנה מכבד מלוחס חרופה.

## 9. שימוש בתרופה בזמן הריון והנקה

אם איך משמשם באומפרזולן למטר חרופה ממשכת (מעל עשן) הרופא ע"י עשוי לבצע מעקב סופו אחר חזב בריון, ע"י רחוח עם תסמינים נסויב חרופות חרושים ויחסי וכן פב עשן שאחנה מכבד מלוחס חרופה.

## 10. שימוש בתרופה בזמן הריון והנקה

אם איך משמשם באומפרזולן למטר חרופה ממשכת (מעל עשן) הרופא ע"י עשוי לבצע מעקב סופו אחר חזב בריון, ע"י רחוח עם תסמינים נסויב חרופות חרושים ויחסי וכן פב עשן שאחנה מכבד מלוחס חרופה.

## 11. שימוש בתרופה בזמן הריון והנקה

אם איך משמשם באומפרזולן למטר חרופה ממשכת (מעל עשן) הרופא ע"י עשוי לבצע מעקב סופו אחר חזב בריון, ע"י רחוח עם תסמינים נסויב חרופות חרושים ויחסי וכן פב עשן שאחנה מכבד מלוחס חרופה.

## 12. שימוש בתרופה בזמן הריון והנקה

אם איך משמשם באומפרזולן למטר חרופה ממשכת (מעל עשן) הרופא ע"י עשוי לבצע מעקב סופו אחר חזב בריון, ע"י רחוח עם תסמינים נסויב חרופות חרושים ויחסי וכן פב עשן שאחנה מכבד מלוחס חרופה.

## 13. שימוש בתרופה בזמן הריון והנקה

אם איך משמשם באומפרזולן למטר חרופה ממשכת (מעל עשן) הרופא ע"י עשוי לבצע מעקב סופו אחר חזב בריון, ע"י רחוח עם תסמינים נסויב חרופות חרושים ויחסי וכן פב עשן שאחנה מכבד מלוחס חרופה.

## 14. שימוש בתרופה בזמן הריון והנקה

אם איך משמשם באומפרזולן למטר חרופה ממשכת (מעל עשן) הרופא ע"י עשוי לבצע מעקב סופו אחר חזב בריון, ע"י רחוח עם תסמינים נסויב חרופות חרושים ויחסי וכן פב עשן שאחנה מכבד מלוחס חרופה.

## 15. שימוש בתרופה בזמן הריון והנקה

אם איך משמשם באומפרזולן למטר חרופה ממשכת (מעל עשן) הרופא ע"י עשוי לבצע מעקב סופו אחר חזב בריון, ע"י רחוח עם תסמינים נסויב חרופות חרושים ויחסי וכן פב עשן שאחנה מכבד מלוחס חרופה.

## 16. שימוש בתרופה בזמן הריון והנקה

אם איך משמשם באומפרזולן למטר חרופה ממשכת (מעל עשן) הרופא ע"י עשוי לבצע מעקב סופו אחר חזב בריון, ע"י רחוח עם תסמינים נסויב חרופות חרושים ויחסי וכן פב עשן שאחנה מכבד מלוחס חרופה.

## 17. שימוש בתרופה בזמן הריון והנקה

אם איך משמשם באומפרזולן למטר חרופה ממשכת (מעל עשן) הרופא ע"י עשוי לבצע מעקב סופו אחר חזב בריון, ע"י רחוח עם תסמינים נסויב חרופות חרושים ויחסי וכן פב עשן שאחנה מכבד מלוחס חרופה.

## 18. שימוש בתרופה בזמן הריון והנקה

אם איך משמשם באומפרזולן למטר חרופה ממשכת (מעל עשן) הרופא ע"י עשוי לבצע מעקב סופו אחר חזב בריון, ע"י רחוח עם תסמינים נסויב חרופות חרושים ויחסי וכן פב עשן שאחנה מכבד מלוחס חרופה.

## 19. שימוש בתרופה בזמן הריון והנקה

אם איך משמשם באומפרזולן למטר חרופה ממשכת (מעל עשן) הרופא ע"י עשוי לבצע מעקב סופו אחר חזב בריון, ע"י רחוח עם תסמינים נסויב חרופות חרושים ויחסי וכן פב עשן שאחנה מכבד מלוחס חרופה.

## 20. שימוש בתרופה בזמן הריון והנקה

אם איך משמשם באומפרזולן למטר חרופה ממשכת (מעל עשן) הרופא ע"י עשוי לבצע מעקב סופו אחר חזב בריון, ע"י רחוח עם תסמינים נסויב חרופות חרושים ויחסי וכן פב עשן שאחנה מכבד מלוחס חרופה.

## 21. שימוש בתרופה בזמן הריון והנקה

אם איך משמשם באומפרזולן למטר חרופה ממשכת (מעל עשן) הרופא ע"י עשוי לבצע מעקב סופו אחר חזב בריון, ע"י רחוח עם תסמינים נסויב חרופות חרושים ויחסי וכן פב עשן שאחנה מכבד מלוחס חרופה.

## 22. שימוש בתרופה בזמן הריון והנקה

אם איך משמשם באומפרזולן למטר חרופה ממשכת (מעל עשן) הרופא ע"י עשוי לבצע מעקב סופו אחר חזב בריון, ע"י רחוח עם תסמינים נסויב חרופות חרושים ויחסי וכן פב עשן שאחנה מכבד מלוחס חרופה.