

نشرة للمستهلك بموجب
أنظمة الصيدلة
مستحضرات - ١٩٨٦
يسوق الدواء بدون وصفة طبيب.

N - تسريرقت أقراص للمضغ بطعم الفواكه

كل قرص يحتوي كالسيوم Calcium Carbonate كربونات ٥٠٠ ملء.
المواد غير الفعالة: انظر الفقرة ٦ في النشرة.

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء.

تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء، إذا توفرت لديك أسلطة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي، يصرف هذا الدواء بدون حاجة لوصفة طبيب، عليك إستعماله لأطفال فوق عمر ١٢ سنة.

عليك مراجعة الطبيب إذا تفاقمت الأعراض أو لم تتحسن بعد أسبوعين، إستشر الصيدلي إذا كنت بحاجة لمعلومات إضافية.

١) لأي غرض مخصص
الدواء؟
مضاد للحموضة.
(٢) قبل إستعمال الدواء

- ١ لا يجوز إستعمال الدواء إذا:
 - كانت لديك حساسية (البريجيا) لـ كالسيوم كاربونات أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (أنظر الفقرة ٦ في النشرة).
 - كنت تعاني من فائض الكالسيوم (hypercalcemia) في الدم (البريجيا) أو فائض الكالسيوم في البول (hypercalciuria).
 - كنت تخضع لحمية فقيرة من خلل في وظيفة جهاز الهضم، أمراض الكبد، أمراض القلب / الأوعية الدموية، كسور في العظام.

٢ لا يجوز الإستعمال إذا كان السادة الداخلية تحت الغطاء ناقصة أو معطوبة.

- ٣ الإستعمال لدى الأطفال:
 - هذا الدواء غير مخصص للرضع والأطفال دون عمر ١٢ سنة.

٤ إستعمال N - تسريرقت مع الطعام:
إذا كنت حساساً لأي طعام أو لأي دواء عليك إبلاغ الطبيب عن ذلك قبل تناول الدواء، المستحضر يحتوي على سكر (دكسترون) ولذلك إذا كنت

غثيان أو تقيؤات.
٥ لا يجوز استعمال الدواء لدى أطفال دون عمر ١٢ سنة.

- ٦ قبل العلاج بالدواء N-تسريقت،
إستشر الطبيب إذا:
 - كنت حامل أو في فترة الرضاعة.
 - كنت تعاني من السكري (المستحضر يحتوي سكر).
 - كنت تعاني أو عانيت في الماضي من تراسيكلينات، سيفروفلوكساسين (فلوروكوندولونات) (مضادات حيوية)، مدرات بولية من نوع تيزيدات، كورتيكosterوئيدات، فيتامين D، بيسفوسفونات، ديجيتاليس، ميتيلamin، صوديوم بوليستيرين، سولفونات، فينيتوئين، أدوية تحوي: حديد، كالسيوم، فوسفات، مغنيزيوم، فلوريد، دواء مضاد للفطريات (كيتونازول).

٧ تحسيرات إضافية:
لا يجوز الإستعمال إذا كان السادة الداخلية تحت الغطاء ناقصة أو الكلى.

- ٨ الإستعمال لدى الأطفال:
 - هذا الدواء غير مخصص للرضع والأطفال دون عمر ١٢ سنة.

٩ إستعمال N - تسريقت مع الطعام:
إذا كنت حساساً لأي طعام أو لأي دواء عليك إبلاغ الطبيب عن ذلك قبل تناول الدواء، المستحضر يحتوي على سكر (دكسترون) ولذلك إذا كنت

تعاني من قلة تحمل لسكريات مختلفة، يجب إستشارة الطبيب قبل تناول الدواء.

- ١٠ إذا كنت تتناول أو إذا تناولت مؤخراً أدوية أخرى، بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحك للطبيب والأطفال دون عمر ١٢ سنة.

١١ الجرعة الدوائية الإعتيادية في كل دواء، إن استعمال N - تسريقت قد يسبب أعراضًا جانبية عند بعض المستعملين. لا تتدesh من قائمة الأعراض عند ظهور الأعراض أو حسب توصية الطبيب.

- ١٢ إذا لم يطرأ تحسن على الحرقان خلال أسبوعين، يجب مراجعة الطبيب.

١٣ لا يجوز إستعمال الدواء أكثر من أسبوعين، إلا بتوصية وإشراف الطبيب.

١٤ لا تتناول الأدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتتأكد من الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء، ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

- ١٥ (٣) كيفية إستعمال الدواء؟
 - عليك الاستضاضة من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن واثقاً.
 - هذا الدواء غير مخصص للرضع والأطفال دون عمر ١٢ سنة.

١٦ (٤) الأعراض الجانبية كما بكل دواء، إن استعمال N - تسريقت قد يسبب أعراضًا جانبية عند بعض المستعملين. لا تتدesh من قائمة الأعراض عند ظهور الأعراض أو حسب توصية الطبيب.

- ١٧ إذا لم يطرأ تحسن على الحرقان خلال أسبوعين، يجب مراجعة الطبيب.

١٨ لا يجوز إستعمال الدواء أكثر من أسبوعين، إلا بتوصية وإشراف الطبيب.

١٩ لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

- كانت لديك حساسية (البريجيا) لـ كالسيوم كاربونات أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (أنظر الفقرة ٦ في النشرة).
- كنت تعاني من فائض الكالسيوم (hypercalcemia) في الدم (البريجيا) أو فائض الكالسيوم في البول (hypercalciuria).
- كنت تخضع لحمية فقيرة من خلل في وظيفة جهاز الهضم، أمراض الكبد، أمراض القلب / الأوعية الدموية، كسور في العظام.

٢٠ (١) تحسيرات إضافية:
لا يجوز الإستعمال إذا كان السادة الداخلية تحت الغطاء ناقصة أو معطوبة.

- ٢١ (٢) الإستعمال لدى الأطفال:
 - هذا الدواء غير مخصص للرضع والأطفال دون عمر ١٢ سنة.

٢٢ (٣) إستعمال N - تسريقت مع الطعام:
إذا كنت حساساً لأي طعام أو لأي دواء عليك إبلاغ الطبيب عن ذلك قبل تناول الدواء، المستحضر يحتوي على سكر (دكسترون) ولذلك إذا كنت

تعاني من قلة تحمل لسكريات مختلفة، يجب إستشارة الطبيب قبل تناول الدواء.

٢٣ (٤) معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء:
القرص البرتقالي يحتوي على

- ٢٤ طريقة الإستعمال:
يجب مضغ الدواء قبل بلعه.

٢٥ (٥) معلومات إضافية:
١) يحتوي الدواء بالإضافة لل المادة الفعالة أيضاً على المواد غير الفعالة التالية:
قرص أحمر:
Dextrose, Maltodextrin, Polyethylene glycol, Talc, Adipic acid, Powdered cellulose, Art Cherry flavor, Mineral oil, Nat cream flavor, FD&C RED #40 Aluminium Lake

٢) قرص أخضر:
Dextrose, Maltodextrin, Polyethylene glycol, Talc, Adipic acid, Powdered cellulose, Nat lime flavor, Mineral oil, FD&C Yellow #5 Aluminium Lake, FD&C Blue #1 Aluminium Lake

- ٢٦ قرص برتقالي:
Dextrose, Maltodextrin, Polyethylene glycol, Talc, Adipic acid, Powdered cellulose, Nat&Art orange flavor, Mineral oil, FD&C Yellow #6 Aluminium Lake

٢٧ (٦) قرص أصفر:
Dextrose, Maltodextrin, Polyethylene glycol, Talc, Adipic acid, Powdered cellulose, Nat&Art lemon flavor, Mineral oil, FD&C Yellow #5 Aluminium Lake

٢٨ الموقع ووزارة الصحة www.health.gov.il أو عن طريق تصفح الرابط:
<https://forms.gov.il/global-data/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdvertiserEffectMedic@moh.gov.il>

٢٩ (٧) كيفية تخزين الدواء؟
٣٠ تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي و المجال روبية الأطفال و/أو الرضاع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التسمم بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

- ٣١ لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) المطبوع على القنينة.

٣٢ يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

٣٣ لا يجوز تخزين أدوية مختلفة الطبيب.

٣٤ لا تتجاوز الجرعات الموصى بها

- ٣٥ إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية، أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب. بالإمكان الإبلاغ عن الأعراض الجانبية لوزارة الصحة

٣٦ بواسطة الإستماراة المباشرة للإبلاغ عن الأعراض الجانبية، الموجودة على الصفحة الرئيسية بالإنترنت لفترة ١٢ شهراً بعد الفتح لأول مرة.

٣٧ (٨) معلومات إضافية:
٣٨ يحتوي الدواء بالإضافة لل المادة الفعالة أيضاً على المواد غير الفعالة التالية:
قرص أحمر:
Dextrose, Maltodextrin, Polyethylene glycol, Talc, Adipic acid, Powdered cellulose, Art Cherry flavor, Mineral oil, Nat cream flavor, FD&C RED #40 Aluminium Lake

٣٩ (٩) معلومات إضافية:
٤٠ يحتوي الدواء بالإضافة لل المادة الفعالة أيضاً على المواد غير الفعالة التالية:
قرص أحمر:
Dextrose, Maltodextrin, Polyethylene glycol, Talc, Adipic acid, Powdered cellulose, Nat lime flavor, Mineral oil, FD&C Yellow #5 Aluminium Lake, FD&C Blue #1 Aluminium Lake

- ٤١ قرص أخضر:
Dextrose, Maltodextrin, Polyethylene glycol, Talc, Adipic acid, Powdered cellulose, Nat&Art orange flavor, Mineral oil, FD&C Yellow #6 Aluminium Lake

٤٢ (١٠) معلومات إضافية:
٤٣ قرص برتقالي:
Dextrose, Maltodextrin, Polyethylene glycol, Talc, Adipic acid, Powdered cellulose, Nat&Art lemon flavor, Mineral oil, FD&C Yellow #5 Aluminium Lake

٤٤ (١١) معلومات إضافية:
٤٥ يحتوي الدواء بالإضافة لل المادة الفعالة أيضاً على المواد غير الفعالة التالية:
قرص أحمر:
Dextrose, Maltodextrin, Polyethylene glycol, Talc, Adipic acid, Powdered cellulose, Nat lime flavor, Mineral oil, FD&C Yellow #5 Aluminium Lake, FD&C Blue #1 Aluminium Lake

٤٦ (١٢) معلومات إضافية:
٤٧ يحتوي الدواء بالإضافة لل المادة الفعالة أيضاً على المواد غير الفعالة التالية:
قرص أحمر:
Dextrose, Maltodextrin, Polyethylene glycol, Talc, Adipic acid, Powdered cellulose, Nat lime flavor, Mineral oil, FD&C Yellow #6 Aluminium Lake

- ٤٨ قرص أخضر:
Dextrose, Maltodextrin, Polyethylene glycol, Talc, Adipic acid, Powdered cellulose, Nat&Art orange flavor, Mineral oil, FD&C Yellow #5 Aluminium Lake

٤٩ (١٣) معلومات إضافية:
٤٥ يحتوي الدواء بالإضافة لل المادة الفعالة أيضاً على المواد غير الفعالة التالية:
قرص أحمر:
Dextrose, Maltodextrin, Polyethylene glycol, Talc, Adipic acid, Powdered cellulose, Nat lime flavor, Mineral oil, FD&C Yellow #5 Aluminium Lake, FD&C Blue #1 Aluminium Lake