

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו – 1986
התרופה משווקת ללא מרשם רופא.

N – צרבת טבליות לעיסה בטעמי פירות

כל טבליה מכילה קלציום קרבונאט Calcium 500 Carbonate מ"ג. חומרים בלתי פעילים: ראה סעיף 6 בעלון.

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו ניתנת ללא צורך במרשם רופא. עליך להשתמש בה בצורה נכונה. התרופה מיועדת לילדים לפנות אל הרופא באם הסימפטומים מחמירים או אינם משתפרים לאחר שבועיים. היוועץ ברוקח אם הנך זקוק למידע נוסף.

1. למה התרופה מיועדת?
נוגד חומציות.

2. לפני השימוש בתרופה

- X אין להשתמש בתרופה אם:**
- הייתה לך רגישות (אלרגיה) לקלציום קרבונאט או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6 בעלון).
 - הנך סובל מעודף סידן בדם (היפרקלצמיה) או עודף סידן בשתן (היפרקלצוריה).
 - הנך נמצא בדיאטה דלת פוספט.
 - הנך סובל מאבנים בכליות.
 - הנך סובל מבעיות בפעילות של בלוטות יותרת-התריס.
 - הנך סובל מתסמונת זולינגר-אליסון.
 - הנך מקבל דיגוקסין למחלת לב.
 - ישנם סימנים של דלקת התוספתן או דלקת מעיים כגון: כאבי בטן,

בחילה או הקאות.
• אין להשתמש בתרופה בילדים מתחת לגיל 12.

לפני הטיפול בתרופה N- צרבת, התייעץ עם הרופא אם:

- הנך בהריון או מניקה.
- הנך סובל מסוכרת (התכשיר מכיל סוכר).
- הנך סובל או סבל בעבר מליקוי בתפקוד מערכת העיכול, מחלות כבד, מחלות לב/כלי דם, שברים בעצמות.

אזהרות נוספות:
אין להשתמש אם האטם הפנימי מתחת לפקק חסר או פגום.

שימוש בילדים:
תרופה זו אינה מיועדת לתינוקות וילדים מתחת לגיל 12 שנים.

שימוש ב-N- צרבת עם מזון:
אם הנך רגיש למזון כלשהו או לתרופה כלשהי עליך להודיע על כך לרופא לפני נטילת התרופה. התכשיר מכיל סוכר (דקסטרוז) ולכן באם הנך סובל מחוסר סבילות לסוכרים שונים, יש להיוועץ ברופא לפני

נטילת התרופה.
אם אתה לוקח או לקחת לאחרונה תרופות אחרות, כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח לפני תחילת הטיפול, במיוחד לגבי תרופות מהקבוצות הבאות:
טטראציקלינים, ציפרופלוקסצין (פלורוקינולונים) (אנטיביוטיקות), משתנים מסוג תיאזידים, קורטיקוסטרואידים, ויטמין D, ביספוספונאטים, דיגיטליס, מתנאמין, סודיום פוליסטירן, סולפונט, פניטואין, תרופות המכילות: ברזל, סידן, פוספט, מגנזיום, פלואוריד, תרופה נגד פטריות (קטוקונאזול). יש לחכות פרק זמן של 2-3 שעות בין נטילת תרופה זו לבין נטילת תרופות אחרות במתן דרך הפה.
מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה:
הטבליה הכתומה מכילה FD&C Yellow #6 Aluminium Lake אשר עלול לגרום לתגובות אלרגיות.

3. כיצד תשתמש בתרופה?
• עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח.
• תרופה זו אינה מיועדת לתינוקות וילדים מתחת לגיל 12 שנים.
המינון המקובל בדרך כלל בהעדר הוראה אחרת מרופא הוא:
להקלת צרבת: לעס 2-4 טבליות בעת הופעת הסימפטומים או לפי המלצת הרופא.
אם לא חל שיפור בצרבת תוך שבועיים, יש לפנות לרופא. אין להשתמש בתרופה יותר משבועיים, אלא בהמלצת ובפיקוח הרופא. אין לעבור על המנה המומלצת של 15 טבליות ביום.
אם את בהריון, אין לקחת יותר מ- 10 טבליות ב- 24 שעות.
אופן השימוש:
יש ללעוס את התרופה לפני בליעתה.
אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהנך נוטל תרופה.

הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם.
אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.
4. תופעות לוואי
כמו בכל תרופה, השימוש ב-N- צרבת עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן:
• עצירות
• בחילה
• גזים
• גיהוקים
אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא הזכרה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.
ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות הטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות www.health.gov.il

או ע"י כניסה לקישור: <https://forms.gov.il/global/data/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdverseEffectMedic@moh.gov.il>
5. איך לאחסן את התרופה?
• מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
• אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המוטבע על הבקבוק. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
• אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.
• אחסן באריזה המקורית.
• אחסן מתחת ל- 25°C.
• לאחר פתיחה ראשונה ניתן להשתמש במשך 12 חודשים.
6. מידע נוסף
• נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם את

החומרים הבלתי פעילים הבאים:
טבליה אדומה: Dextrose, Maltodextrin, Polyethylene glycol, Talc, Adipic acid, Powdered cellulose, Art Cherry flavor, Mineral oil, Nat cream flavor, FD&C RED #40 Aluminium Lake
טבליה ירוקה: Dextrose, Maltodextrin, Polyethylene glycol, Talc, Adipic acid, Powdered cellulose, Nat lime flavor, Mineral oil, FD&C Yellow #5 Aluminium Lake, FD&C Blue #1 Aluminium Lake
טבליה כתומה: Dextrose, Maltodextrin, Polyethylene glycol, Talc, Adipic acid, Powdered cellulose, Nat&Art orange flavor, Mineral oil, FD&C Yellow #6 Aluminium Lake
טבליה צהובה: Dextrose, Maltodextrin, Polyethylene glycol, Talc, Adipic acid, Powdered cellulose, Nat&Art lemon

flavor, Mineral oil, FD&C Yellow #5 Aluminium Lake
התכשיר מכיל סוכר! בכל טבליה כ- 510 מ"ג דקסטרוז. כל טבליה מכילה גם בין 0.226-0.392 מ"ג נתרן (תלוי בצבע הטבליה).
כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:
הטבליות ארוזות בבקבוק המכיל 150 טבליות. הטבליות מעוגלות ומוטבעות בצידן האחד ב" L478".
• בעל הרישום וכתובתו: פריגו ישראל סוכנויות בע"מ, רחוב לח"י 29, בני-ברק, 51200.
• שם היצרן וכתובתו: חברת פריגו, מישיגן, ארה"ב.
• עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות בתאריך: דצמבר 2015.
• מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 13845.31624
• לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לשני המינים.
6.12.15