

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ В  
СООТВЕТСТВИИ С  
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМИ  
СТАНДАРТАМИ (ПРЕПАРАТЫ) - 1986

Препарат отпускается без  
рецепта врача.

## **N-Царэвет** **Жевательные** **таблетки с** **фруктовым** **вкусом**

Каждая таблетка содержит  
Кальция Карбонат (Calcium  
Carbonate) 500 мг.

Неактивные вещества: см.  
раздел 6 инструкции.

**Внимательно и полностью  
прочитайте данную  
инструкцию перед  
применением препарата.**

Данная инструкция содержит  
основные сведения о  
препарате. Если у Вас имеются  
дополнительные вопросы,  
обратитесь к врачу или к  
фармацевту.

Для приема данного  
препарата нет необходимости  
в рецепте врача. Правильно  
принимайте препарат.

Препарат предназначен для  
детей старше 12 лет. Если  
симптомы усиливаются или  
нет улучшения в течение  
двух недель, обратитесь к  
врачу. Если Вы нуждаетесь  
в дополнительной  
информации, посоветуйтесь с  
фармацевтом.

### **1. ДЛЯ ЧЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ПРЕПАРАТ?**

Антацид.

### **2. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА**

**Не принимайте данный  
препарат, если:**

- У Вас имеется  
повышенная  
чувствительность  
(аллергия) к кальция  
карбонату или к любому  
другому ингредиенту,  
содержащемуся в  
препарате (см. раздел 6  
инструкции).
- Вы страдаете  
повышенным  
содержанием кальция в  
крови (гиперкальциемия)  
или в моче  
(гиперкальциурия).

- Вы соблюдаете диету  
с низким содержанием  
фосфата.
- Вы страдаете камнями  
в почках.
- Вы страдаете  
нарушениями функции  
паращитовидных  
желез.
- Вы страдаете  
синдромом Золлингера-  
Эллисона.
- Вы принимаете  
дигоксин для лечения  
заболевания сердца.
- При наличии признаков  
аппендицита или  
воспаления кишечника,  
таких, как: боли в  
животе, тошнота или  
рвоты.
- Не применять препарат  
для лечения детей  
младше 12 лет.

**Перед применением  
препарата N-Царэвет  
посоветуйтесь с врачом,  
если:**

- Вы беременны или кормите  
грудью.
- Вы страдаете сахарным  
диабетом (препарат  
содержит сахар).

- Вы страдаете или  
страдали в прошлом  
нарушением функции  
пищеварительной  
системы, заболеваниями  
печени, заболеваниями  
сердца/кровеносных  
сосудов, переломами  
костей.

**Дополнительные  
предостережения:**

Не принимайте, если  
внутренний уплотнитель  
под крышкой отсутствует  
или поврежден.

**Прием препарата  
детьми:**

- Данный препарат не  
предназначен для  
младенцев и детей  
младше 12 лет.

**Прием препарата  
N-Царэвет с пищей:**

Если у Вас имеется повышенная  
чувствительность к какому-  
либо пищевому продукту или  
к какому-либо лекарственному  
препарату, сообщите об этом  
врачу перед применением  
препарата. Препарат  
содержит сахар (декстрозу),  
и поэтому, если Вы  
страдаете непереносимостью

различных сахаров, следует  
посоветоваться с врачом перед  
применением препарата.

**Если Вы принимаете или  
недавно принимали другие  
лекарственные препараты,  
включая препараты,  
отпускаемые без рецепта  
врача, и пищевые добавки,  
сообщите об этом врачу  
или фармацевту перед  
началом приема препарата.**  
В особенности это касается  
препаратов из следующих  
групп:

Тетрациклины, ципрофлоксацин  
(фторхинолоны) (антибиотики),  
диуретики типа тиазидов,  
кортикостероиды, витамин D,  
бисфосфонаты, дигиталис,  
метенамин, натрия полистирен,  
сульфонат, фенитоин, препараты,  
содержащие: железо, кальций,  
фосфат, магний, фторид,  
противогрибковый препарат  
(кетоконазол).

Следует соблюдать интервал  
в 2-3 часа между приемом  
данного препарата и  
приемом других препаратов,  
применяемых перорально.

**Важная информация о  
некоторых ингредиентах  
препарата:**

Оранжевая таблетка содержит  
FD&C Yellow #6 Aluminium  
Lake, который может вызвать  
аллергическую реакцию.

### **3. КАК СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ ПРЕПАРАТ?**

- Если Вы не уверены,  
проконсультируйтесь с  
врачом или фармацевтом.
- Данный препарат не  
предназначен для  
младенцев и детей младше  
12 лет.

Как правило, обычная  
дозировка, при отсутствии  
других указаний врача:

Для облегчения изжоги:

Разжевывать 2-4 таблетки  
при возникновении симптомов,  
или согласно рекомендации  
врача.

**Если изжога не  
прекращается в течение  
двух недель, обратитесь  
к врачу. Не принимайте  
препарат более двух  
недель. Более длительное  
применение возможно  
по рекомендации врача и  
под его наблюдением. Не  
превышайте рекомендуемую**

**дозировку в 15 таблеток в  
день.**

Если Вы беременны, не  
принимайте более 10 таблеток  
в течение 24 часов.

**Указания к применению:**

Разжевать препарат перед  
глотанием.

Не применяйте препараты  
в темноте! Каждый раз  
при применении препарата  
проверяйте этикетку и  
дозировку. При необходимости  
пользуйтесь очками.

Если у Вас имеются  
дополнительные вопросы  
относительно применения  
препарата, посоветуйтесь с  
врачом или фармацевтом.

### **4. ПОБОЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ**

Как и при лечении любым  
препаратом, применение  
N-Царэвет может вызывать  
побочные явления у части  
пациентов. Не тревожьтесь  
при чтении списка побочных  
явлений. Возможно, Вы не  
будете страдать ни одним  
из них:

- запор
- тошнота
- метеоризм
- отрыжка

Если возникает побочное  
явление, если одно из  
побочных явлений становится  
более выраженным, или  
Вы страдаете от побочного  
явления, не упомянутого в  
данной инструкции, Вам следует  
посоветоваться с врачом.

О побочных явлениях можно  
сообщить в Министерство  
Здравоохранения,  
используя форму онлайн,  
предназначенную для  
отчета о побочных явлениях,  
на сайте Министерства  
здравоохранения [www.health.gov.il](http://www.health.gov.il), или по следующей  
ссылке:

[https://forms.gov.il/globaldata/get  
sequence/getsequence.  
aspx?formType=AdversEffect  
Medic@moh.gov.il](https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il)

### **5. КАК СЛЕДУЕТ ХРАНИТЬ ПРЕПАРАТ?**

• Избегайте отравления!  
Этот препарат, как и любой  
другой, надлежит хранить  
в закрытом, недоступном  
для детей и/или младенцев  
месте, и вне поля их зрения,  
во избежание отравления.  
Не вызывайте рвоту без  
получения точных указаний  
врача.

• Не принимайте препарат  
после истечения срока  
его годности (exp. date),  
указанного на флаконе.  
Датой истечения срока  
годности является  
последний день указанного  
месяца.

• Не храните разные  
препараты в одной  
упаковке.

• Храните в оригинальной  
упаковке

• Храните при температуре  
ниже +25°C.

• После первого открывания  
можно использовать  
препарат в течение 12  
месяцев.

### **6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

• В дополнение к активному  
ингредиенту, препарат  
также содержит следующие  
неактивные ингредиенты:  
Красная таблетка:  
Dextrose, Maltodextrin,  
Polyethylene glycol, Talc,  
Adipic acid, Powdered  
cellulose, Art Cherry flavor,  
Mineral oil, Nat cream flavor,  
FD&C RED #40 Aluminium  
Lake

Зеленая таблетка:

Dextrose, Maltodextrin, Polyethylene glycol, Talc, Adipic acid, Powdered cellulose, Nat lime flavor, Mineral oil, FD&C Yellow #5 Aluminium Lake, FD&C Blue #1 Aluminium Lake

Оранжевая таблетка:

Dextrose, Maltodextrin, Polyethylene glycol, Talc, Adipic acid, Powdered cellulose, Nat&Art orange flavor, Mineral oil, FD&C Yellow #6 Aluminium Lake

Желтая таблетка:

Dextrose, Maltodextrin, Polyethylene glycol, Talc, Adipic acid, Powdered cellulose, Nat&Art lemon flavor, Mineral oil, FD&C Yellow #5 Aluminium Lake

Препарат содержит сахар! В каждой таблетке – приб. 510 мг декстрозы.

Каждая таблетка содержит также от 0.226 до 0.392 мг натрия (в зависимости от цвета таблетки).

**Как выглядит препарат и каково содержимое упаковки:**

Таблетки упакованы во флаконе, содержащем 150 таблеток. Таблетки округлые, с вытисненной надписью "L478" на одной стороне.

- Владелец лицензии и адрес: Перриго Израиль Агенства Лтд., ул. Лехи 29, Бней-Брак, 51200.
- Производитель и адрес: Компания Перриго, Мичиган, США.
- Данная инструкция проверена и утверждена Министерством здравоохранения в Декабре 2015 года.
- Регистрационный номер препарата в Государственном Реестре лекарственных средств Министерства Здравоохранения: 13845.31624