

## עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ז - 1986

התרופה משווקת ללא מרשם רופא

# אף טיפונת

## טיפות אף

**הרכב:** החומרים הפעילים וריכוזם:

נתרן כלורי 0.9% w/v (Sodium Chloride 0.9% w/v).

**לרשימת החומרים הבלתי פעילים:** ראה סעיף 6

"מידע נוסף". קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם

תשתמש בתרופה.

עלון זה מכיל מידע מצמצית על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח. התרופה מיועדת למבוגרים, ילדים ומתבגרים. עליך להשתמש בה בצורה נכונה. היועץ ברוקח אם הנך זקוק למידע נוסף. עליך לפנות אל הרופא באם סימני המחלה (סימפטומים) מחמירים או אינם משתפרים לאחר 3 ימים.

### 1. למה מיועדת התרופה?

להקלה בגודש באף אצל תינוקות וילדים קטנים.

קבוצה תרופוטיית - תמיסת מלח

### 2. לפני שימוש בתרופה

#### אין להשתמש בתרופה:

- אם אתה או הילד שלך רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה.
- לרשימת החומרים הבלתי פעילים - ראה סעיף 6 "מידע נוסף".

#### אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

- אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול: אם הינך או ילד שלך סובל או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד: הלב ו/או כלי דם, יתר לחץ דם, הכבד
- אם הינך רגיש למזון כלשהו או לתרופה כלשהי
- אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או תקופה ממושכת בלי להיוועץ ברופא. אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול: אם הינך או ילד שלך סובל או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד:
- הלב ו/או כלי דם, יתר לחץ דם, הכבד
- אם הינך רגיש למזון כלשהו או לתרופה כלשהי
- אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או תקופה ממושכת בלי להיוועץ ברופא.

#### אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות

אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

#### מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה:

התכשיר מכיל בנזלקוניום כלוריד אשר עלול לגרום לגירוי ברירית האף.

הריון והנקה: אפשר להשתמש בתרופה בהריון או אם הינך מניקה.

#### 3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח.

**אופן השימוש:** קנה את האף בעדינות. הטה את ראש הילד לאחור תוך כדי עמידה או ישיבה, או השכב והטה את ראשו הצידה.

טפטף את הטיפות לכל אחד מהנחיריים, תוך כדי הטיית הראש אחורה למשך מספר דקות, זאת בכדי לאפשר לתרופה להתפזר בחלל האף.

• שטוף את הטפטפת בעזרת מים חמים ויבש בעזרת ממתת נייר נקיה. יש לסגור את הבקבוק היטב לאחר השימוש. בכדי להימנע מהפצת הזיהום, אין להשתמש באותו מיכל של תרופה ליותר מילד אחד.

**מינון:** מינון מקובל בהעדר הוראה אחרת מרופא: 2 טיפות בכל נחיר, 1-4 פעמים ביום.

### אין לעבור על המנה המומלצת.

אם לא חל שיפור במצב תוך 3 ימים יש לפנות לרופא. שים לב! אין לבלוע. תרופה זו מיועדת לשימוש באף. אין להשתמש בעיניים. אם נטלת בטעות מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך. אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן קצוב, יש ליטול מנה מיד כשנזכרת;

אך בשום אופן אין ליטול שתי מנות ביחד!

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהנך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם. אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

**4. תופעות לוואי:** כמו בכל תרופה, השימוש באף טיפונת עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים, כגון גירוי או צריבה זמנית באף. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

#### יש להפסיק את השימוש ולפנות לרופא:

- יתר לחץ דם (כגון אודם בפנים)
- פריחה או דלקת מקומית
- (שלא היו קיימות לפני השימוש בתכשיר) (נדיר).

#### תופעות לוואי בילדים ותינוקות:

על ההורים לדווח לרופא המטפל על כל תופעת לוואי וכן על כל תרופה נוספת הניתנת לילד. ראה לעיל תופעות לוואי מיוחדות שפורטו. אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

#### דיווח על תופעות לוואי ניתן לדווח על

תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות הטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות: [www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)

או ע"י כניסה לקישור:

<https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il>

#### 5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מוחץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה.
- תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש • אחסן במקום קריר, מתחת ל - 25°C.
- סגור היטב ומנע חדירת אוויר ורטיבות • אחסן באריזה המקורית.
- ניתן להשתמש בתכשיר עד חודש ימים מרגע פתיחתו. אין להשתמש בתרופה זו אם אתה מבחין בשינוי בצבע התמיסה או שהיא הופכת לעכורה.

#### 6. מידע נוסף: נוסף על החומרים הפעילים

התרופה מכילה גם:

Purified Water, Benzalkonium Chloride Sol

**כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:**

נוזל שקוף. **תכולה:** 10, 20 מ"ל

**היצרן ובעל הרישום:**

בן-שמעון פלוריש בע"מ,

פארק תעשייה משגב, ד.ג. משגב 2017400.

**עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד**

**הבריאות בתאריך:** 08/2015

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי

במשרד הבריאות: 1340831368

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח

בלשון זכר.

על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.